

გთვალისწინებული ნაშროვი

1. რას ნიშნავს ტერმინი “ჰომეოპათია”?

- ა) მკურნალობა საწინააღმდეგოთი;
- ბ) მკურნალობა ბალასებით;
- გ) ოფიციანტურნება;
- *დ) მკურნალობა მსგავსით;
- ე) მკურნალობა სუ-ჯოკ თერაპიით.

2. რას ნიშნავს ტერმინი “ალოპეცია”?

- *ა) მკურნალობა საწინააღმდეგოთი;
- ბ) მკურნალობა მსგავსით;
- გ) ოფიციანტურნება;
- დ) მკურნალობა ქიმიური ნივთიერებებით;
- ე) სუ-ჯოკ თერაპია.

3. ჰომეოპათიის განსაზღვრება

- ა) მკურნალობა კვების და ორგანიზმის გაწმენდის საშუალებით;
- *ბ) ინდივიდუალური მარეგულირებელი თერაპია;
- გ) დამთრგუნავი სიმპტომოთერაპია;
- დ) რეფლექსოთერაპია;
- ე) სუ-ჯოკ თერაპია.

4. ვინ არის სამუილ ჰანემანი?

- ა) გერმანელი ბირთვული ფიზიკოსი;
- ბ) მე-17 ს-ის გერმანელი ფიზიკოსი;
- გ) ჰოლანდიელი მეცნიერი.
- დ) ბრაზილიელი მეცნიერი;
- *ე) ჰომეოპათიის ფუძემდებელი.

5. რამდენი წლის არის ეს მეცნიერება?

- ა) 400 წლის;
- ბ) საუკუნებები მეტის;
- *გ) 200 წლის;
- დ) სამი საუკუნის;
- ე) ხუთი საუკუნის.

6. რამ უბიძგა ჰანემანს აღმოჩენა ჰომეოპათია?

- ა) საკუთარმა დაავადებამ;
- *ბ) იმ დროისათვის ცნობილი მკურნალობის მეთოდებით დაუკრძალულობამ;
- გ) კოლეგების რჩევამ;
- დ) მეტობლის ბავშვის ავალმყოფობამ;
- ე) ეპილემიამ.

7. რომელი წიგნი ითვლება ჰომეოპათიის კანონთა კრებულად?

- ა) რეპერტორიუმი.
- ბ) მატერია მედიკა.
- *გ) ორგანიზმი.
- დ) ჰომეოპათიური ფარმაკოპეა.
- ე) სუფთა წამალმცოდნებობა.

8. რომელმა შემთხვევამ მიიყვანა ჰანემანი ჰომეოპათიის აღმოჩენამდე?

- *ა) ექიმ კულების წიგნის “წმინდა წამალთმცოდნების” თარგმნამ;
- ბ) ნათესავის ავალმყოფობამ;
- გ) ცხოველებები ექსპერიმენტმა;
- დ) კოლეგების მსჯელობამ ზოგიერთი დაავადების ირგვლივ;
- ე) საკუთარმა ავალმყოფობამ.

9. რომელი ნივთიერება იყო მოხსენებული დოქტორ კულების წიგნში “წმინდა წამალთმცოდნების”?

- ა) კალციუმი;
- ბ) სილიცეა;
- გ) გოგირდმჟავა;
- დ) დარიშხანი;
- *ე) ქინაქინის ხის ქერქი.

10. რაში მდგომარეობდა დოქტორ კულენის წიგნში მოხსენებული შემთხვევის არსი?

- ა) დარიშხანით მოწამელისას სიმპტომების შეუძლებლივობაში
- ბ) მარილმავას ზემოქმედებისას სიმპტომების განსაკუთრებულ გავრცელებაში.
- გ) კალციუმს ზემოქმედებისას სიმპტომების განსაკუთრებულ გავრცელებაში;
- დ) სალიცეას ზემოქმედებისას სიმპტომების განსაკუთრებულ გავრცელებაში;
- *ე) მსგავსებაში ქინაქინის ხის ქერქით მკურნალობასა და მოწამვლას შორის.

11. რაში მდგომარეობს ჰომეოპათიის პრიცელი პრინციპი?

- ა) მსგავსი ინკურნება საწინააღმდეგოთი;
- ბ) სიმპტომი ითრგუნება პრეპარატების ზემოქმედებისას;
- გ) წამალი რაღიკალურად მოქმედებს ორგანოზე;
- *დ) მსგავსი ინკურნება მსგავსით
- ე) წამალი დროუბით აუმჯობესებს მდგომარეობას.

12. რომელ ობიექტებზე ტარდება ჰომეოპათიური პრეპარატების გამოცდა?

- ა) ცხოველებზე;
- *ბ) ჯანმრთელ ადამიანებზე;
- გ) მცენარეზე;
- დ) ავადმყოფებზე;
- ე) მწერებზე.

13. რაფომ არ შეიძლება ახალი მონოპრეპარატის გამოცდის ჩატარება ცხოველებზე?

- ა) ცხოველთა ორგანოები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ადამიანების ორგანოებისგან;
- ბ) ცხოველებზე წამლის ეფექტი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ადამიანებზე წამლის ეფექტისაგან;
- *გ) ცხოველებს არ შეუძლიათ სიგვაერად გაღმოსცენ თავისი განცდები;
- დ) ცხოველების დაავადების სიმპტომები განსხვავდება ადამიანისგან;
- ე) წამალი, რომელიც მოქმედებს ადამიანზე, არ მოქმედებს ცხოველზე.

14. რაში მდგომარეობს ჰომეოპათიის მეორე პრინციპი?

- *ა) ექსპერიმენტის ჩატარება ჯანმრთელ ადამიანებზე;
- ბ) ექსპერიმენტის ჩატარება ავადმყოფებზე;
- გ) ექსპერიმენტის ჩატარება ცხოველებზე;
- დ) ექსპერიმენტის ჩატარება სინჯარაში;
- ე) მწერებზე.

15. ვინ დაიწყო პირველმა ჰომეოპათიური კომპლექსური წამლის გამოყენება სიმპტომების მიხედვით?

- ა) ჰანემანმა;
- *ბ) შტან्हერმა;
- გ) კენჭმა;
- დ) შვაბერმა;
- ე) ალენმა.

16. ვინ გადაწყვიტა “გაედო ხიდი” ჰომეოპათიისა და ალოპეთიის შორის?

- ა) ჰანემანმა;
- *ბ) რეკვეერმა;
- გ) ალენმა;
- დ) კიოლერმა;
- ე) ბერიკემა.

17. რას ნიშნავს ჰომეოპათიაში წამლის პათოგენები?

- ა) ჰაციენტის ძირითადი ჩივილი;
- ბ) დაავადების განვითარების დინამიკა;
- *გ) ჯანმრთელ ადამიანზე რომელიმე ბუნებრივი ნივთიერების ზემოქმედების გამოცდით მიღებული ან ტოქსიკოლოგიიდან ნასესხები სურათი;
- დ) ერთეული სიმპტომის სურათი;
- ე) რამდენიმე სიმპტომის სურათი.

18. რას ეყრდნობა დიაგნოზი ჰომეოპათიაში?

- ა) ორგანოს პათოლოგიის კვლევას;
- ბ) ლაბორატორიული კვლევების პასექს;
- *გ) სიმპტომების ერთობლიობას;
- დ) ერთ სიმპტომს;
- ე) ამორჩევითად ზოგ სიმპტომს.

19. რომელი ნედლეული იხმარება ჰომეოპათიურ ფარმაკოლოგიაში?

- ა) ცხოველები;
- ბ) მცენარეები;
- გ) მინერალები;
- დ) მცენარეები და მედიკები;
- *ე) მთელი ბუნებრივი სამყარო და ქიმიური შენაერთები.

20. რით განსხვავდება ჰომეოპათია ფიჭოთერაპიისაგან?

- *ა) ნივთიერების ღობირებით;
- ბ) ჰომეოპათიაში მხოლოდ მინერალები იხმარება;
- გ) ჰომეოპათიაში მხოლოდ ქიმიური პრეპარატები იხმარება;
- დ) ჰომეოპათიაში მხოლოდ ბალაზები იხმარება;
- ე) ჰომეოპათიაში მხოლოდ მწერები იხმარება;

21. როდის ხდება წამლის გამოცდის შეწყვეტა?

- ა) ორგანოებისა და ქსოვილების ღრმა დაზიანებისას;
- *ბ) პირველი პათოლოგიური სუბიექტური შეგრძნებების მიღებამდე;
- გ) სისხლის სურათის შეცვლისას;
- დ) ორგანიზმის მოწამველის ნიშნებისას;
- ე) რენტგენის სურათის შეცვლისას.

22. საკმარისია თუ არა ჰომეოპათიური პრინციპით წამლის შესარჩევად მხოლოდ ერთი სიმპტომის მსგავსება?

- ა) საკმარისია;
- ბ) ბოგჯერ საკმარისია, ბოგჯერ არა;
- გ) არა აქვს მნიშვნელობა;
- *დ) არ არის საკმარისი;
- ე) გოგი დაბადების ღროვას საკმარისია.

23. რა უნდა ვიცოდეთ დამატებით გარდა მსგავსებისა წამლის შერჩევისას?

- ა) მხოლოდ ნივთიერების ღობა;
- ბ) მხოლოდ ნივთიერების ბოგენცია;
- *გ) ღობა და პოტენცია პაციენტის ინდივიდუალური მგრძნობელობის მიხედვით.
- დ) განსხვავებული სიმპტომები;
- ე) მხოლოდ წამლის მიღების სიხშირე.

24. საიდან იღებს ექიმი ჰომეოპათი დამატებით ინფორმაციას წამლის მოქმედების შესახებ?

- ა) მწერებზე ექსპერიმენტებიდან;
- ბ) ცხოველებზე ექსპერიმენტებიდან;
- გ) კლინიკური მედიცინის მონაცემების მიხედვით;
- დ) ფრინველებზე ექსპერიმენტებიდან;
- *ე) “მაგერია მედიკართ”.

25. რაში მდგომარეობს ჰომეოპათიის მესამე პრინციპი?

- *ა) რაც უფრო მაღალია პოტენცია და მცირება ნივთიერების ღობა, პრეპარატის მოქმედება უფრო ძლიერია;
- ბ) რაც უფრო დაბალია პოტენცია და მცირება ღობა, უფრო ძლიერია პრეპარატის მოქმედება;
- გ) რაც უფრო დაბალია პოტენცია და მეტია ღობა, პრეპარატის მოქმედება უფრო ძლიერია;
- დ) რაც უფრო დაბალია პოტენცია და მეტია ღობა, უფრო სუსტია პრეპარატის მოქმედება;
- ე) რაც უფრო დაბალია პოტენცია და მცირება ღობა, უფრო სუსტია პრეპარატის მოქმედება.

26. რა წარმოადგენს საწყის ნედლეულს ჰომეოპათიური წამლის წარმოებისთვის?

- ა) მხოლოდ მშრალი ნივთიერებები;
- *ბ) ესხნებიან, გინეტურები, ხსნარები, მშრალი ნივთიერებები;
- გ) მხოლოდ კრისტალები;
- დ) ფხნილები და მაღამოები;
- ე) მხოლოდ მაღამოები.

27. რა არის ესენცია?

- ა) მცენარის წვენი;
- ბ) ხსნალი მარილები;
- გ) ხსნალი მედიკები;
- *დ) მცენარის ახალი წვენი კონსერვაციისთვის 90 პროცენტიან სპირტში შერეული;
- ე) შაქარში დასრული მარილები.

28. რა არის ნაუენი?

- ა) ხსნადი მეგვები;
- ბ) ფხენილის ღონებმდე დაქუცმაცებული მცენარეები;
- * გ) ალკოჰოლით ექსტრაგირებული გამომშრალი და დაქუცმაცებული მცენარეელი და ცხოველური სუბსტანციები;
- დ) მცენარის წევნი;
- ე) ნივთიერების ნახარში.

29. რა პქვია მიმართულებას, რომელიც ალოპათიური მეთოდით იყენებს ჰომეოპათიურ კომპლექსურ მედიკამენტებს?

- ა) უნიციტეტი;
- ბ) კლინიკური ჰომეოპათია;
- გ) თერაპია;
- * დ) ჰომოფრენიკოლოგია;
- ე) სუ-ჯოკ თერაპია.

30. რა პროცესები გამოიყენება ჰომეოპათიაში პრეპარატების გასაზაფებლად?

- * ა) ალკოჰოლი, რძის შაქარი, დისტილირებული წყალი;
- ბ) რძის მეგანა, სპირტი, ლერწმის შაქარი;
- გ) ეთილის სპირტი, ლერწმის შაქარი, ტალკი;
- დ) გოგირდი;
- ე) ალკოჰოლი.

31. რომელი პოტენციის შეაღას აღნიშნავს ნიშანი LM ?

- ა) მეასე განჩავება;
- ბ) მეათასე განჩავება,
- * გ) ორმოცდამეათასე განჩავება;
- დ) მეასიათასე განჩავება;
- ე) საწყისი ნივთიერებების ურფინქტურა და ურსუბსტანცია.

32. ჰომეოპათიური პრეპარატების რა ფორმები არსებობს?

- ა) ხსოვლი ბურთულები, ხსნარები;
- * ბ) ხსნარები, ბურთულები, ფხვნილები, ტაბლეტები, სანთლები, ინექციები;
- გ) ხსოვლი ფხვნილები, სანთლები;
- დ) ხსოვლი ტაბლეტები;
- ე) კვებითი დანამატების სახით.

33. რაში მდგომარეობს პოტენციირების პრინციპი?

- * ა) ღონის შემცირება და აქტივობის გაძლიერება წამლის დამუშავებით;
- ბ) წამლების ეტაპობრივი შენჯლერევა ღონის შეუცვლელად;
- გ) ნივთიერების ღონის მომატება და შემცველი შენჯლერევა;
- დ) ნივთიერების ღონის მომატება შენჯლერევის გარეშე;
- ე) ნივთიერების ღონის შემცირება შენჯლერევის გარეშე.

34. როგორ მიიღწევა წამლის პოტენცირება?

- ა) წამლის რაოდენობის გამრდით;
- ბ) მიღების წესით;
- გ) წამლის ღონის შეცვლით;
- * დ) განჩავებითა და შენჯლერევით;
- ე) განსაკუთრებული შენახვის წესით.

35. რაში მდგომარეობს დინამიზაცია?

- ა) ალკოჰოლის დამატებაში;
- * ბ) შენჯლერევაში
- გ) შენახვის წესში;
- დ) მიღების რეჟიმში;
- ე) წამლის ღონის.

36. განჩავების როგორი შეაღები არსებობს ჰომეოპათიაში?

- ა) სამი;
- ბ) მეათე;
- გ) ერთნახევარი;
- დ) ორი;
- * ე) მეათე, მეასე, მეათასე;

37. რას ნიშნავს მეათე განჩავება?

- * ა) ნივთიერების 1 წილი ერევა 9 წილ გამხსნელს;
- ბ) ნივთიერების 1 წილი ერევა 8 წილ გამხსნელს;
- გ) ნივთიერების 1 წილი ერევა 12 წილ გამხსნელს;
- დ) ნივთიერების 1 წილი ერევა 18 წილ გამხსნელს;
- ე) ნივთიერების 1 წილი ერევა 20 წილ გამხსნელს.

38. როგორ აღინიშნება მეათე განჩავება რეცეპტზე და წამლის მშა ფორმაზე?

- ა) Q ან XX;
- ბ) B ან XX;
- * გ) D ან X;
- დ) B ან XXX;
- ე) D ან XXX.

39. რას ნიშნავს მეასე განჩავება?

- ა) მატარებელი ნივთიერების 1 წილი ერევა 200 წილ გამხსნელს;
- ბ) მატარებელი ნივთიერების 1 წილი ერევა 50 წილ გამხსნელს;
- გ) მატარებელი ნივთიერების 1 წილი ერევა 100 წილ გამხსნელს;
- დ) მატარებელი ნივთიერების 1 წილი ერევა 88 წილ გამხსნელს;
- * ე) მატარებელი ნივთიერების 1 წილი ერევა 99 წილ გამხსნელს.

40. როგორ აღინიშნება მეასე განჩავება რეცეპტზე და წამლის მშა ფორმაზე?

- ა) XX;
- * ბ) B ან უბრალოდ განჩავების მაჩვენებელი ციფრი;
- გ) D ან XX;
- დ) X;
- ე) XXX.

41. ვინ ჩაატარა პირველი "ჰომეოპათიური აცრა" ბავშვთა ინფექციური ეპიდემიის დროს?

- * ა) ჰამემანი;
- ბ) ფარინგოტონი;
- გ) კენჭი;
- დ) ბენიგაუზენი;
- ე) ბერიკე.

42. რა ხდება, როცა ორგანიზმი ერთმანეთს ხელება თრი ერთნაირი ძალის არამსგავსი დაავალება?

- ა) თრგუნავენ ერთმანეთს;
- ბ) ხდება ორგანიზმის გამოჯამრთელება;
- გ) არაფერი არ ხდება, რადგან ისინი აწონს წორებები ერთმანეთს;
- დ) ერთი არის გაბატონებული, მეორე კი მიძინებული;
- * ე) ართულებენ ერთმანეთს და მდგომარეობა მძიმდება.

43. რომელი ინფექციური დაავალების მაგალითს იყენებს ჰანემანი განკურნების პრინციპების ასახსნელად?

- ა) ჭლექი
- ბ) ჰონორეა;
- გ) მუსლის ტიფი;
- * დ) ყვავილი;
- ე) დიფტერია.

44. რას ამბობს ჰანემანი ჰომეოპათიისა და ალოპათიის ერთლროულ გამოყენებაზე?

- * ა) სრულიად შეუძლებელია;
- ბ) ეს შესაძლებელია მხოლოდ გამონაკლისების სახით;
- გ) შესაძლებელია მძიმე შემთხვევათა მკურნალობისას;
- დ) შესაძლებელია მწვავე დაავალებათა მკურნალობისას;
- ე) შესაძლებელია თანმიმდევრობით და არა ერთლროულად.

45. ჰომეოპათიური წამლების მომზადების რა მეთოდები არსებობს დღესდღეობით?

- ა) ჰანემანისა და გერინგის მიხედვით;
- * ბ) ჰანემანისა და კორსაკოვის მიხედვით;
- გ) გერინგის და კენჭის მიხედვით;
- დ) კულტერის მიხედვით;
- ე) ბერიკეს მიხედვით.

46. როგორ მზადდება წამალი ჰანემანის მეთოდის მიხედვით?

- ა) ყველა განჩავება მზადდება 10 ფლაკონში;

- ბ) ყველა განჩავება მზადდება 1 ფლაკონში;
გ) ყველა განჩავება მზადდება 3 ფლაკონში;
*დ) ყველა შემდგომი პოტენცია მზადდება ახალ ფლაკონში;
ე) ყველა განჩავება მზადდება 11 ფლაკონში;

47. როგორ მზადდება წამალი კორსაკოვის მეთოდის მიხედვით;

ა) ყველა განჩავება მზადდება სამ ფლაკონში;
ბ) ყველა შემდგომი პოტენცია მზადდება ახალ ფლაკონში;
*გ) წამლის ყველა შემდგომი განჩავება მზადდება ერთ ფლაკონში
დ) ყველა განჩავება მზადდება 10 ფლაკონში;
ე) ყველა შემდგომი განჩავება მზადდება 11 ფლაკონში.

48. რა არის ოპოდელდოკი?

- ა) 45%-იანი ღვინის სპირტი ერევა ტინქტურას;
ბ) 96%-იანი ღვინის სპირტი ერევა ტინქტურას;
გ) ფხნილი ერევა ტინქტურუბში;
*დ) საპნიანი სპირტი, წყალი, 96% ღვინის სპირტი ერევა ტინქტურუბში;
ე) წყალი ერევა ტინქტურუბში.

49. რომელ შემთხვევებში გამოიყენება ოპოდელდოკი?

- *ა) გარეგანად სახმარად;
ბ) შიგნით მისაღებად;
გ) ინექციისთვის;
დ) წვეთოვანისთვის;
ე) წვეთობით მისაღებად.

50. რას წარმოადგენს “საექიმო ხელოვნების ორგანონი”?

- ა) ჰომეოპათიურ ფარმაკოლოგიას;
ბ) ჰომეოპათიური სიმპტომების საძიებელს;
*გ) ჰანქმანის ჰომეოპათიური მკურნალობის თეორიას;
დ) ცნობარს;
ე) მატერია მედიკას.

51. ვინ არის “ორგანონის” ავტორი;

- ა) შვაბე;
ბ) კენჭი;
გ) გერინგი;
*დ) ჰანქმანი;
ე) ბერიკე.

52. “ორგანონის” რამდენი გამოცემა არსებობს?

- ა) 20;
ბ) 4;
გ) 8;
დ) 10;
*ე) 6.

53. რა ნაწილებისგან შედგება “ორგანონი”?

- ა) წამლების დამტაცება და გამოყენება;
ბ) დამხმარე ღონისძიებები;
გ) დაბადების სახეები, დაგადატებათა კლინიკის შესწავლა;
დ) წამლების გამოცდა, დაბადების განსაკუთრებული ფორმები და მათი მკურნალობა;
*ე) ძირითადი თეორიული საფუძვლები, პრაქტიკული რეკომენდაციები, დამხმარე ღონისძიებები.

54. დაგვადების არსი ჰანქმანის მიხედვით

- ა) ინფექციური გენები;
ბ) ორგანოს პათოლოგია;
*გ) სისიცოცხლო ძალების შესუსტება;
დ) ორგანოთა ჯგუფის პათოლოგია;
ე) ორგანოთა ჯგუფის ნეკროზი.

55. რას უწილებდა ჰანქმანი “სასიცოცხლო ძალა”-ს?

- *ა) ორგანიზმის თვითგანკურნების შესაძლებლობის;
ბ) პაციენტის პიროვნეულ დახასიათებას;

გ) თითოეული ორგანიზმის ინდივიდუალურ გამოვლინებებს;

დ) ორგანოს პათოლოგიას;

ე) ორგანოთა ჯგუფის პათოლოგიას.

56. რომელი ორი ინტერი გამოიყენება ჰომეოპათიური პრეპარატის მოსამებნად:

ა) ობიექტური მონაცემები;

ბ) კლინიკური გამოკვლევა;

* გ) ავალმყოფობის სიმპტომები;

დ) ლაბორატორიული მონაცემები;

ე) ექსპერიმენტული მონაცემები.

57. რითი განსხვავდება ჰომეოპათია კლინიკური მედიცინისგან?

ა) ჰომეოპათია კურნავს ცალკეულ სიმპტომს და არა წომოლოგიას;

* ბ) ჰომეოპათია კურნავს ავალმყოფს მთლიანად და არა ცალკეულ პათოლოგიას;

გ) ჰომეოპათია კურნავს ცალკეულ სიმპტომს და არა წომოლოგიას;

დ) ჰომეოპათია კურნავს სიმპტომთა გარკვეულ ჯგუფს და არა დაზღვადებას;

ე) ჰომეოპათია კურნავს წომოლოგიას.

58. რაში მდგომარეობს ჰომეოპათიის ძირითადი ამოცანა?

ა) ცალკეული სიმპტომის მოცილება;

* ბ) დაავალების მთლიანად განკურნება;

გ) მხოლოდ რამდენიმე სიმპტომის განკურნება;

დ) ორგანოს განკურნება;

ე) ორგანიზმიდან ინფექციის განდევნა.

59. რას წარმოადგენს სიმპტომები ჰომეოპათიისათვის?

ა) ადამიანის გარეგნებულ ნიშანს;

ბ) რაიმე ავალმყოფობის დამახსიათებელ გარეგნებულ ნიშანს;

გ) ჰომეოპათიაში არაფერს არ წარმოადგენს;

* დ) წამლის შერჩევის თრიენტის;

ე) მკურნალობის ძირითად ორიენტირს.

60. რას ნიშნავს სიმპტომოკომპლექსი?

ა) სიმპტომთა ჯგუფს, რომელიც იძლევა ორი ორგანოს დაზიანების სურათს

ბ) არაფერს არ ნიშნავს;

გ) სიმპტომთა ჯგუფს, რომელიც იძლევა ცველა თრგანოს დაზიანების სურათს;

დ) სიმპტომთა ჯგუფს, რომელიც ქმნის რომელიმე თრგანოს პათოლოგიის სურათს;

* ე) სიმპტომთა ერთობლიობას, რომელიც იძლევა სრულ წარმოდგენას წამლის პათოგენების შესახებ.

61. რას ნიშნავს პათოგნომური სიმპტომი?

ა) ექსპერიმენტით მიღებული სიმპტომი;

ბ) ინდივიდუალურ სიმპტომთა ჯგუფი;

* გ) სიმპტომთა ჯგუფს, რომელსაც მივყავართ კლინიკური დიაგნოზის განსაზღვრამდე;

დ) კონსტიტუციური ნიშნები;

ე) უჩვეულო სიმპტომები.

62. რას ნიშნავს ინდივიდუალური სიმპტომი?

ა) ორგანოთა ჯგუფის პათოლოგიის ობიექტური გამოვლინება;

ბ) არაფერს არ ნიშნავს;

გ) ორგანოს პათოლოგიის ობიექტური გამოვლინება;

* დ) შემთხვევის თავისებური, დამხსიათებელი გამოვლინება;

ე) სიმპტომი, რომელიც ახასიათებს კონკრეტულ პათოლოგიას.

63. რაში მდგომარეობს ინდივიდუალური სიმპტომების მნიშვნელობა?

* ა) წამლის შერჩევის ძირითადი დერმია;

ბ) მნიშვნელოვანია დაზიანების ხარისხის დასადგენად;

გ) არამნიშვნელოვანია;

დ) მნიშვნელოვანია დაზიანებული ორგანოს გამოსავლენად;

ე) მნიშვნელოვანია კლინიკური დიაგნოზის დასადგენად.

64. რას ნიშნავს “სიმპტომი-გასაღები”?

ა) მეორეხარისხოვანი სიმპტომი;

* ბ) წამლის პათოგნენების წამყვანი სიმპტომი;

გ) ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები;

დ) კლინიკური გამოკვლევის შედეგი;
ე) ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგები.

65. რას ნიშნავს თანმხლები სიმპტომი?

- ა) პათოლოგიას ძირითადი ლოკალიზაცია;
- ბ) დაავალებისთვის ტრადიციული გამოვლენებანი;
- გ) პათოლოგიასთვის დამახასიათებელ შეგრძნებათა ირადიაცია;
- * დ) ძირითადი ჩივილის თანმხლები სიმპტომები;
- ე) კლინიკური გამოკვლევის შედეგები.

66. რას ნიშნავს სუბიექტური სიმპტომი?

- ა) ინსტრუმენტული კვლევის მეთოდების მონაცემები;
- ბ) ნომინალური სიმპტომი;
- * გ) კველაფერი, რაც ექიმს ესმის ავადმყოფისგან;
- დ) ობიექტური მონაცემები;
- ე) პათოლოგიას ძირითადი ლოკალიზაცია.

67. რას ნიშნავს ობიექტური სიმპტომი?

- ა) პათოლოგიას ძირითადი ლოკალიზაცია;
- * ბ) გასინჯვის, პალპაციის, ჰერკუსიის, აგრეთვე ინსტრუმენტული გამოკვლევების მონაცემები;
- გ) პაციენტის ვერბალური მონაცემები;
- დ) წამლისათვის წამყვანი სიმპტომი;
- ე) ავადმყოფის ახლობლების ნაამბობი.

68. რა კომპონენტებისგან უნდა შედგებოდეს სრულყოფილი სიმპტომი?

- ა) უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას პაციენტის ჩივილების შესახებ;
- ბ) უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ობიექტური მდგრამარეობის შესახებ;
- გ) უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას შეგრძნებათა ხასიათის შესახებ;
- დ) უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ეტიოლოგიის შესახებ;
- * ე) უნდა მოიცავდეს მონაცემებს ეტიოლოგიისა და ლოკალიზაციის შესახებ, შეგრძნებათა ხასიათის და მათი წარმოშობის პირობების (მოდალობების) შესახებ;

69. ეტიოლოგიის როლი ჰომეოთერაპიაში;

- * ა) შეიძლება წარმოადგენდეს პირდაპირ ჩვენებას საჭირო წამლის შერჩევისთვის;
- ბ) გვეხმარება დაზიანებული ორგანოს გამოვლენაში;
- გ) არა აქვს მნიშვნელობა;
- დ) იძლევა ინფორმაციას ნომილოგიის შესახებ;
- ე) გვეხმარება ლოკალური სიმპტომის გამოვლენაში.

70. რაში მდგომარეობს ჰომეოპათიის მეთოხე პრინციპი?

- ა) მკერნალობა პაციენტის ხასიათის შესაბამისად
- * ბ) მთლიანი ორგანიზმის და არა ერთი ორგანოს განკურნება;
- გ) მკერნალობა ხომილოგიის მიხედვით;
- დ) ინფექციასთან ბრძოლა;
- ე) ცალკე თრგანოს განკურნება.

71. რაში მდგომარეობს ფიზიკური სიმპტომების როლი?

- ა) გვეხმარება ადამიანის ხასიათის განსაზღვრაში;
- * ბ) გვეხმარება დაზიანებული ორგანოს განსაზღვრაში;
- გ) გვეხმარება შიშების დადგენაში;
- დ) არაფითარი მნიშვნელობა არა აქვს;
- ე) ერთადერთი საჭირო სიმპტომია.

72. რას ნიშნავს ლოკალური სიმპტომების ძიება?

- ა) ბიოგრაფიული ანამნეზის გამოვლენა;
- ბ) ადამიანის სიმმრების ანალიზი;
- გ) ადამიანის შიშების გამოვლენა;
- * დ) ძირითადი ჩივილის გამოვლენება ექიმის სპეციალობის შესაბამისად;
- ე) ახლობლებთან და მეგობრებთან ურთიერთობის ხასიათის გამოვლინება.

73. რას ნიშნავს ზოგადი სიმპტომი?

- ა) რეაქცია საკვების შილებაზე;
- ბ) ფანგაზიები;
- * გ) მთელი ორგანიზმისათვის დამახასიათებელი სიმპტომი;

დ) დამატებითი ინფორმაცია დაავალებაზე;
ე) შიშები.

74. რა არის მოღალობები?

- ა) თანმხლები სიმპტომი;
 - ბ) სრულყოფილი სიმპტომი;
 - გ) ლოკალურ სიმპტომია ჯგუფი;
- *დ) ამა თუ იმ სიმპტომის გამოვლინების და განვითარების პირობები;
- ე) რეაქცია ამინდის ცელილებაზე.

75. რაში მდგომარეობს მოღალობების როლი პრეპარატის შერჩევაში?

- ა) არანაირ როლს არ თამაშოს პრეპარატის შერჩევაში;
 - ბ) განსაზღვრავს ნივთიერების ორგანოფრონულობას;
 - გ) განსაზღვრავს წამლის ღობას;
- *დ) იძლევა შესაძლებლობას ბუსტად მოიძებნოს ავადმყოფისათვის შესაფერისი წამალი;
- ე) განსაზღვრავს წამლის პოტენციას.

76. რაში მდგომარეობს სიზმრების როლი წამლის შერჩევაში?

- ა) გვეხმარება წამლის ღობის შერჩევაში;
 - ბ) არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს წამლის შერჩევაში;
 - გ) გვეხმარება პრეპარატის ბიორიტმის გამოვლენაში;
 - დ) გვეხმარება დაბიანებული ორგანოს ფუნქციის დადგენაში;
- *ე) იძლევა ფსიქიკის აშკარა და ფარული მხარეების შესახებ მონაცემების, რაც გვეხმარება სამკურნალო საშუალებების შერჩევაში.

77. რას ნიშნავს “მატერია მედიკა”?

- *ა) ჰომეოპათიურ წამალთა მოქმედების აღწერა;
- ბ) ნივთიერების მატერიალური ღობა;
- გ) ნოზოლოგიური ცნობარი;
- დ) წამლის დამზადების წესები;
- ე) მისაღები წამლის ღობა.

78. რას ნიშნავს სიმპტომების “რანჟირება”?

- ა) დაბიანებული ორგანოს გამოვლენა;
- ბ) სიმპტომების შეცვლა;

 - *გ) სიმპტომების გარკვეული თანმიმდევრობით განლაგება ცნობარისათვის;
 - დ) “წამლის პორტრეტის” წარმოდგენა;
 - ე) სიმპტომების იერარქიულობა.

79. უჩვეულო, განსაკუთრებული სიმპტომების როლი;

- *ა) მნიშვნელოვანია ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალებების შერჩევისას
- ბ) გვეხმარება წამლის ღობის შერჩევაში;
- გ) არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა;
- დ) გვეხმარება ნოზოლოგიის განსაზღვრაში;
- ე) შეცდომაში შეყვას ექიმი წამლის შერჩევის ღროს.

80. რის საფუძველზე ხდება დაავადების ამოცნობა?

- *ა) სიმპტომთა ერთობლიობის საფუძველზე;
- ბ) ლოკალური სიმპტომების საფუძველზე;
- გ) ბიოგრაფიული ანამნეზის საფუძველზე;
- დ) გადატანილ დაავადებათა მიხედვით;
- ე) შიშებისა და სიმრების მიხედვით.

81. როგორ ამოვიცნოთ სიმპტომი?

- ა) მხოლოდ კლინიკური გამოკვლევის მიხედვით;
- ბ) მხოლოდ შიშების მიხედვით;
- გ) მხოლოდ დაბორაფორმული გამოკვლევის მიხედვით;
- დ) მხოლოდ თიაექტური გასინჯვის დამარტებით;
- *ე) ანამნეზის ბუსტი ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე.

82. რომელი სიმპტომებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი?

- ა) კლინიკური;
- *ბ) უჩვეულო;
- გ) სომატური;

- დ) თანმხლები;
ე) დამატებითი.

83. რა ურთიერთდამოკიდებულებაში უნდა იმყოფებოდნენ ხელოვნური წამლისმიერი დაავალება და ნატურალური დაავალება?
ა) მსგავსი ორი ჟუნქის მიხედვით
ბ) მსგავსი სიმრების მიხედვით
გ) საწინააღმდეგო;
*დ) მსგავსი ყველანაირად;
ე) მსგავსი მხოლოდ ადგილობრივი ორგანული სიმპტომების მიხედვით.

84. რა არის წამყვანი ჰომეოპათიურ გამოკვლევაში?
ა) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
ბ) ექსკომიტური გამოკვლევა;
გ) აუსკელაცია, კლინიკური დიაგნოზი;
*დ) სრული ანამნეზი, კონსტიტუციის განსაზღვრა;
ე) პერკუსია, კლინიკური დიაგნოზი.

85. რითი უნდა დაიწყოს ავადმყოფის გამოკითხვა?
ა) ობიექტური გამოკვლევის მონაცემთა შესწავლით;
*ბ) ავადმყოფის სპონტანური მონათხრობით;
გ) მოდალობების განსაზღვრით;
დ) ინსტრუმენტალური გამოკვლევით;
ე) ექსკომიტური გამოკვლევით.

86. რა არის ავადმყოფის სპონტანური მონაყოლი?
ა) რენტგენოლოგიური გამოკვლევის პასუხი;
*ბ) ავადმყოფის ძირითადი ჩივილები, საერთო ანამნეზური მონაცემები, ინდივიდუალური სიმპტომები;
გ) ექსკომიტური გამოკვლევის შედეგი;
დ) ექიმის მითითებით ავადმყოფის ნაამბობი ტკივილის ლოკალიზაციის შესახებ;
ე) ავადმყოფის ნაამბობი კლინიკური გამოკვლევების შედეგების შესახებ.

87. რაფომ არის მნიშვნელოვანი ავადმყოფის სპონტანური მონაყოლი?
ა) ეხმარება ექიმს კლინიკური დიაგნოზის დადგენაში;
ბ) არა აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა;
გ) ექიმის მიერ არ არის გათვალისწინებული წამლის შერჩევისას;
*დ) შეიცავს ყველაზე მეტ ინფორმაციას მსგავსი წამლის შესარჩევად
ე) იძლევა თბიექტურ სურათს.

88. რას ნიშნავს მიანმიმართული გამოკითხვა?
ა) ეს არის კითხვები მხოლოდ შიშების შესახებ;
ბ) ეს არის კითხვები მხოლოდ სიმრების შესახებ;
*გ) ბუსფლება ავადმყოფის სპონტანური მონაყოლიდან შერჩეული მნიშვნელოვანი საკითხები;
დ) კითხვები ფსიქოლიგიური მდგომარეობის შესახებ;
ე) ეს არის კითხვები სოციალური მდგომარეობის შესახებ.

89. რაში მდგომარეობს პირდაპირი გამოკითხვის მიზანი?
ა) აფასებს კლინიკურ სიმპტომს;
ბ) აფასებს ორგანოს დაზიანების ხარისხს;
გ) აფასებს თბიექტურ სიმპტომს;
დ) გამოავლენს ბოგადადამიანური მორალის საკითხებს;
*ე) აღვენს სრულყოფილ სიმპტომს.

90. რას ნიშნავს არაპირდაპირი გამოკითხვა?
ა) აფასებს მისაღები წამლის დოზას;
ბ) აღვენს კლინიკურ დიაგნოზს;
გ) იწყება საერთო სიმპტომებიდან;
დ) აფასებს თბიექტურ სიმპტომს;
*ე) ფარლება სქემით 'თავი-ფეხები'".

91. რისთვის არის საჭირო არაპირდაპირი გამოკითხვა?
ა) გვეხმარება ავადმყოფის შიშების გამოვლენაში;
ბ) გვეხმარება დაზიანებული ორგანოს გამოვლენაში;
*გ) განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქრონიკულ შემთხვევებში;
დ) აუცილებელია მწვავე დაავალებისას;

ე) გვეხმარება ფსიქიური სიმპტომების გამოვლენაში.

92. რისგან ადგენს ექიმი დაავადების ნიშნების ერთობლიობას?

- ა) ამ შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ფსიქიური პრობლემები;
- ბ) მხოლოდ ადგილობრივი სიმპტომისაგან ავადმყოფის ინტელექტის გათვალისწინებით;
- * გ) ცველა სიმპტომის ერთობლიობისაგან (გამონაკლისის გარეშე) ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში;
- დ) მხოლოდ მოძალობების მიხედვით;
- ე) მხოლოდ დაბორადგორიული გამოკვლევის მიხედვით.

93. რაში მდგომარეობს ბიოგრაფიული ანამნეზი?

- ა) შიშების ხასიათი;
- * ბ) ავადმყოფის ცხოვრების ანამნეზი;
- გ) შეგრძებათა ხასიათი;
- დ) ფუნქციური პათოლოგიები;
- ე) ორგანული პათოლოგია.

94. რისთვის არის აუცილებელი ბიოგრაფიული ანამნეზის შეკრება?

- * ა) საშუალების იძლევა დადგინდეს დაავადების განვითარების თანმიმდევრული სურათი
- ბ) არ არის აუცილებელი;
- გ) რათა შეაფასოთ ობიექტური სიმპტომები;
- დ) საშუალების იძლევა დადგინდეს ბოგადი მოდალობები;
- ე) აფასებს ლოკალურ სიმპტომებს.

95. რაში მდგომარეობს ექიმის მიზანი ანამნეზის შეკრების დროს?

- * ა) დიაგნოზის დადგენა, პროგნოზირება;
- ბ) შიშების ხასიათის დადგენა;
- გ) დაავადებული ორგანოს დადგენა;
- დ) ლოკალური სიმპტომების დადგენა;
- ე) ბოგადი სიმპტომების დადგენა.

96. რა შეკითხვებს უნდა კერიდოთ ავადმყოფის გამოკითხვის დროს?

- ა) ბიოგრაფიულს;
- ბ) ბოგაძლი;
- გ) ბოგადი მოდალობების დამდგენს;
- * დ) სუეპსიტურს, რომელიც ჩააგონებს ავადმყოფს კონკრეტულ ამრის;
- ე) საერთოდ არ უნდა დავუსცათ შეკითხვები.

97. რა დრო სჭირდება პირველ კონსულტაციას?

- * ა) შეზღუდვის გარეშე;
- ბ) 3 საათი;
- გ) 1 საათი;
- დ) 10-15 წუთი;
- ე) 30-45 წუთი.

98. რა დრო სჭირდება მეორე კონსულტაციას?

- ა) 1 საათი;
- ბ) 2 საათი;
- გ) 10-15 წუთი;
- * დ) რამდენიმე საჭიროა;
- ე) საშუალოდ 20 წუთი.

99. როგორი წინაპირობა არსებობს წამლის ზუსტად შესარჩევად?

- ა) ლაბორატორიული მონაცემები;
- ბ) რენტგენოლოგიური მონაცემები;
- გ) პაციენტის მიმართ წინასწარ შექმნილი ცუდი ამრი;
- დ) ექიმის განწყობილება;
- * ე) ავადმყოფობის კლინიკის ბედმიწევნით შესწავლა და დაავადების ზუსტი შეცნობა.

100. რაში მდგომარეობს წამლის შერჩევის მოკლე ვგზა?

- * ა) წამყვანი, სრულყოფილი და შემოწებული სიმპტომების მიხედვით;
- ბ) ნომილიგოური პრინციპის მიხედვით;
- გ) ლოკალური, ადგილობრივი სიმპტომების მიხედვით;
- დ) მხოლოდ ობიექტური მონაცემებით;
- ე) ექსკორპიური მონაცემებით.

101. რაში მდგომარეობს წამლის შერჩევის გრძელი გზა?

- ა) ლოკალური სიმპტომების მიხედვით;
- ბ) ექისერიური მონაცემებით;
- * გ) ანალიტიკური მიღების ცნობარის გამოყენებით;
- დ) ბოგადი სიმპტომების და ნომინაციების გამოყენება;
- ე) ახლობელთა გამოკითხვა.

102. ინტეიციის როლი წამლის შერჩევისას

- ა) ებმარება ექიმს წამლის დოზის შერჩევაში;
- * ბ) ებმარება ექიმს წამლის განსაზღვრაში;
- გ) არა აქვს მნიშვნელობა;
- დ) ხელს უშლის ექიმს წამლის შერჩევაში;
- ე) ებმარება ადგილობრივი სიმპტომების განსაზღვრაში.

103. როგორ ხდება სიმპტომების შერჩევა და შეფასება ანამნეზის შეკრების დროს?

- ა) მხოლოდ დაბორადგორიული მონაცემების მიხედვით;
- * ბ) სიმპტომთა იერარქიული თანმიმდევრობით დაწყობა;
- გ) ყველა სიმპტომის გათვალისწინება თანაბრად ხდება;
- დ) მხოლოდ ინტეიციურად;
- ე) მხოლოდ დოკალური სიმპტომების გამორჩევა.

104. შეიძლება თუ არა შევარჩიოთ წამალი კლინიკური დიაგნოზის მიხედვით?

- ა) შეიძლება ავალმყოფის ნათეავების თხოვნით;
- ბ) ექიმის სურვილის მიხედვით;
- გ) არა;
- * დ) არა;
- ე) ავალმყოფის დაუინებული თხოვნით.

105. რას გვაძლევს ექიმის ერთი პრეპარატით გატაცება?

- ა) არა აქვს მნიშვნელობა;
- ბ) პაციენტის უკმაყოფილებას;
- * გ) დაავალების სურათის თანაეჭვურობის დაკარგვას;
- დ) მკერნალობის კარგ შედეგს;
- ე) გამორიცხავს შეცდომას მკერნალობისას.

106. რა მოცულობით უნდა ვიცოდეთ წამლის პათოგენეზი?

- ა) მხოლოდ ფსიქიური სიმპტომები;
- ბ) ნაწილობრივ;
- * გ) სრულად;
- დ) მხოლოდ დოკალური სიმპტომები;
- ე) მხოლოდ ორგანიზმულობა.

107. რა შემთხვევაში შეუძლია ექიმს ნაჩქარევად დანიშნოს წამალი?

- ა) თუ ამორჩევს მისივის სასურველ სიმპტომს;
- ბ) პაციენტის დაუინებული მოთხოვნით;
- * გ) თუ დაინახავს ერთ მკეთრ სიმპტომს;
- დ) თუ გულდასმით გაანალიზებს სიტუაციას;
- ე) თუ ინტეიციას თან დაურთავს რაციონალურად შესწავლილ მკეთრი სიმპტომების ანალიზს.

108. რას გვაძლევს ლოკალური სიმპტომებისთვის ზედმეტი მნიშვნელობის მინიჭება?

- ა) გვაძლევს კარგ ეფექტს;
- ბ) იძლევა ზუსტი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას;
- გ) გვაძლევს დაავალების სურათის სწორ შეფასებას;
- * დ) შეიძლება მიგვიყვანოს მცდარი პრეპარატის შერჩევამდე;
- ე) გვაძლევს სწრაფ და კარგ ეფექტს.

109. რას წარმოადგენს რეპერტორიუმი?

- ა) წამლების დოზის შერჩევის ცნობარის;
- * ბ) სიმპტომთა ცნობარის;
- გ) პრეპარატების პათოგენეზის აღწერას;
- დ) უფრო ხშირად ხმარებული პრეპარატების კრებულს;
- ე) პრეპარატების დამზადების წესების ცნობარის.

110. რა ფენტეიას ასრულებს რეპერტორიუმი ექიმის მუშაობაში?

- * ა) სიმპტომთა კომპლექსის და წამლის პათოგენეზის ანალიზი შედარება;
- ბ) დამხმარე ინსტრუმენტი წამლის შერჩევისას;
- გ) მხოლოდ აბნეფს ექიმს და ხელს უშლის მუშაობაში;
- დ) აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია ექიმის მუშაობაში წამლის შერჩევისას;
- ე) არანაირი ფუნქცია არ აქვს.

111. რომელ ძირითად რეპერტორიუმს იყენებენ დღეს ექიმები?

- * ა) კენტის, ფატაკის, ბერიკეს, გერინგის, ალენის;
- ბ) ლისტის, კუპერის, გიტრაუსის, მინინის;
- გ) პარაცელსის;
- დ) ჰანემანის;
- ე) მინინის.

112. ვინ არის ყველაზე პოპულარული რეპერტორიუმის ავტორი?

- ა) მინინი;
- * ბ) კენტი;
- გ) ლისტი;
- დ) პარაცელსი;
- ე) ჰანემანი.

113. როგორია კენტის რეპერტორიუმის შინაარსი?

- ა) ნომინოლოგიუმის მიხედვით;
- ბ) პრინციპით “თავი-ფეხები”;
- გ) პათოლოგიის განლაგების მხარის მიხედვით;
- * დ) ცნობარი აგებულია სიმპტომთა დირექტულებისა და სიმუსტის პრინციპის მიხედვით;
- ე) დაავალებული ორგანოების განლაგების მიხედვით.

114. როგორ არჩევენ წამლებს რეპერტორიუმის დახმარებით?

- ა) შიშების ხასიათის მიხედვით;
- ბ) არანაირად;
- * გ) სიმპტომთა ჯგუფის შედარების გბით;
- დ) მხოლოდ ღოკალური სიმპტომების შერჩევის გბით;
- ე) ნომინოლოგიის მიხედვით.

115. ვინ არის რეპერტორიზაციის ტექნიკის ფუძემდებელი?

- ა) მინინი;
- ბ) კენტი;
- * გ) ბენნიპაუზენი;
- დ) პარაცელსი;
- ე) ჰანემანი.

116. როგორ წარმოებს სიმპტომების შერჩევა და შეფასება რეპერტორიუმის მიხედვით?

- ა) მხოლოდ შიშების ხასიათის მიხედვით;
- ბ) ნომინოლოგიის მიხედვით;
- გ) მხოლოდ ღოკალური სიმპტომების მიხედვით;
- დ) მხოლოდ დაბიანების მხარის გათვალისწინებით;
- * ე) ირჩევა სიმპტომები, რომლებიც ახასიათებს ადამიანს ერთიანად. ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მკვეთრი, განსაკუთრებული, უზვეულო სიმპტომები.

117. როგორ მოგახდინოთ სიმპტომების რანჟირება რეპერტორიუმის მიხედვით?

- ა) შიშების ხასიათის მიხედვით;
- ბ) თავის ტკიფილის მიხედვით;
- * გ) უფრო მეტად მეტად მეტად და სრულყოფილი ღოკალური სიმპტომების გამოყოფით.
- დ) ნომინოლოგიის მიხედვით;
- ე) ბიოგრაფიული ანამნეზის მიხედვით.

118. რას ნიშნავს ელიმინაციური სიმპტომი და როდის გამოიყენება იგი?

- * ა) გამომრიცხავი საწინააღმდეგო სიმპტომი;
- ბ) ნომინოლოგიის დამადასტურებელი;
- გ) ღოკალური სიმპტომის დამადასტურებელი;
- დ) დაბიანების მხარის დამადასტურებელი;
- ე) შიშების ხასიათის დამადასტურებელი.

119. როგორ ადგენენ რეპერტორიბაციის რექტას წამლის შესარჩევად?

- ა) უპირატესობა ეძღვევა შიშების ხასიათს;
- ბ) ადგილობრივი სიმპტომების მიხედვით;
- გ) უპირატესობა ეძღვევა დაბიანების მხარეს;
- *დ) სიმპტომები დაგდება პრინციპით: სიტუაცია, რანგი, ხარისხი;
- ე) გრაფები დგება ნოზოლოგის მიხედვით.

120. რაში მდგომარეობს რეპერტორიუმით გედმეტად გატაცების საშიშროება?

- ა) იკარგება შიშების ხასიათი;
- ბ) იკარგება სიგმრების ხასიათი;
- *გ) იკარგება მთელი წამლისმიერი სურათი;
- დ) არაბაირ საშიშროებას არ წარმოადგენს;
- ე) იკარგება მნიშვნელოვანი სიმპტომები.

121. რა პრინციპები არსებობს შერჩეული წამლის პოტენციის არჩევაში?

- ა) ყოველთვის ინიშნება მხოლოდ მაღალი განჩავებები;
- ბ) ყოველთვის ინიშნება მხოლოდ დაბალი განჩავებები;
- *გ) დაბალი განჩავება ორგანული ცვლილებების დროს, საშუალო - ფუნქციონალური ცვლილებისას;
- დ) დაბალი განჩავება ფსიქიური ცვლილებებისას, მაღალი კი ორგანული და ფუნქციონალური ცვლილებების დროს;
- ე) პოტენციის შერჩევას არ აქვთ მნიშვნელობა.

122. რა დაკაირვებები არსებობს დოზის შერჩევისათვის?

- ა) არსებობს ტრაფარეტი: 2 წვ. 3-ჯერ;
- *ბ) ინდივიდუალურად;
- გ) საერთო წესით: 5 წვ. 3-ჯერ დღეში;
- დ) არა უმეტეს თრიჯერ დღეში;
- ე) არსებობს ტრაფარეტი: 8 წვ. 3-ჯერ დღეში;

123. რა უნდა გავაკეთოთ პომეოპათიური საწყისი გაუარესების დროს?

- ა) არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ;
- *ბ) შეწყდეს წამლის მდებარებები და დაველოლოთ გაუმჯობესებას;
- გ) გაიმარტინოს პოტენცია;
- დ) შეიცვალოს პრეპარატი;
- ე) გაიმარტინოს დოზა.

124. რას ნიშნავს შემდგომი გაუარესება?

- ა) საგანგამო სიმპტომია;
- *ბ) პაციენტის მდგომარეობის დამბიმებას;
- გ) პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესებას;
- დ) არაფინალურ საშიშროებას არ წარმოადგენს;
- ე) გამოავლენს დაბიანების მხარეს.

125. რა უნდა გავაკეთოთ შემდგომი გაუარესების დროს?

- ა) არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ;
- ბ) გაიმარტინოს დოზა;
- გ) გაგრძელდეს მიღება გაუმჯობესების დადგომამდე;
- *დ) სასწრაფოდ შევწყვიტოთ წამლის მიღება, მიუცეთ ანტიდოტი, გადაიხედოს დანიშნულება;
- ე) გაიმარტინოს დოზა და პოტენცია.

126. როდის ჩნდება ახალი სიმპტომები როგორც წამლის გვერდითი მოვლენა?

- ა) პოტენცია არ არის საკმარისი;
- ბ) მიღების სიხშირე არ არის საკმარისი;
- *გ) როგორ ტუსტად არ არის დაცული მსგავსების წესი;
- დ) სწორად შერჩეული წამლის დანიშვნისას;
- ე) დოზა არ არის საკმარისი.

127. რა არის პანემანის მიხედვით ბუნებრივი ქრონიკული დაავალება?

- ა) ალოპათიური წამლების ჭარბი მიღებით გამოწვეული დაავალება;
- *ბ) ქრონიკული მიამიდოთ განპირობებული დაავალება;
- გ) პომეოპათიური წამლების ჭარბი რაოდენობით მიღების გამოწვეული დაავალება;
- დ) მწვავე ინფექციის შედეგად აღმოცენებული დაავალება;
- ე) სტრესის შედეგად გამოწვეული დაავალება.

128. რას თელის ჰანემანი ყველა დაავალების ფუნდამენტალურ მიზეზად?

- ა) სტრესებს;
- ბ) ბავშვთა ინფექციებს;
- გ) ხანგრძლივ ყოფნას არასასურველ კლიმატში;
- * დ) ფსონის;
- ე) სიფილის გენეტიკურ ანამნეზში.

129. ვის ეკუთვნის პირველს იდეა იმის შესახებ, რომ წამალი ჯერ ჯანმრთელ აღამიანებზე უნდა იყოს გამოცდილი და შემდეგ მიეცეს ავადმყოფს?

- ა) ჰიპოერატენსია;
- ბ) ჰანემანი;
- * გ) ფონ გალლერნის;
- დ) პარაცელს;
- ე) გერპარდს.

130. გაუარესების რა ვარიანტი შეიძლება წარმოიშვას მკურნალობის პროცესში?

- * ა) ძირითადი დაავალების სიმპტომების გაძლიერება;
- ბ) ძველი, მივიწყებული სიმპტომების გამოვლენა;
- გ) ახალი, პაციენტისათვის უცნობი სიმპტომების გამოვლენა;
- დ) გაუარესებას არასოდეს არა აქვს აღვიდა;
- ე) ჯანმრთელი ორგანოს დაზიანება.

131. რა საპასუხო რეაქციას იძლევა ადამიანის ორგანიზმი მიღებულ პრეპარატზე მწვავე დაავალების შემთხვევაში?

- ა) საერთოდ არ ვლინდება;
- * ბ) მწვავე შემთხვევებში საპასუხო რეაქცია ვლინდება მაშინვე;
- გ) მწვავე შემთხვევებში საპასუხო რეაქციას ადგილი არა აქვს;
- დ) მწვავე შემთხვევებში ყოველთვის საჭიროა ანტიდოტის ხმარება;
- ე) მწვავე შემთხვევებში საპასუხო რეაქცია დიდხანს არ ვლინდება.

132. რას ნიშნავს პალიატიური ეფექტი?

- ა) ეფექტი მხოლოდ ორგანოს დონეზე;
- ბ) ეფექტი მხოლოდ თავის დონეზე;
- * გ) წამალი შერჩევებით თრგანოს დონეზე, მისი მოქმედების ძალა არ არის საკმარისი მთელ თრგანიზმზე სამოქმედოდ;
- დ) წამლის მოქმედება ღრმაა, თრგანიზმის ყველა დონეზე მოქმედებს;
- ე) მხოლოდ კანის დონეზე მოქმედებს.

133. როგორ უნდა მოვიქცეთ პალიატიური ეფექტის მიღებისას?

- ა) ყერადღება არ მივაქციოთ;
- ბ) შევამციროთ წამლის დოზა;
- * გ) განვახლოთ მიღება, ან გავგარდოთ პოტენცია;
- დ) შეწყდეს ჰომეოპათიური მკურნალობა და დაენიშნოს სხვა საშუალებები;
- ე) გაგრძელდეს იგივე მკურნალობა.

134. როგორი პაციენტი ითვლება ზემგრმნობიარედ?

- * ა) რომელსაც აქვს მწვავე რეაქცია მის კონსტიტუციურ პრეპარატზე;
- ბ) პაციენტი, რომელიც არ იძლევა არანაირ ინფორმაციას თავისი მდგრმარეობის შესახებ;
- გ) პაციენტი, რომელიც იძლევა არასწორ ინფორმაციას;
- დ) აგადმყოფს, რომელსაც არა აქვს რეაქცია არანაირ პრეპარატზე;
- ე) ასეთი პაციენტი არ არსებობს.

135. როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, როცა პაციენტი ზემგრმნობიარეა?

- ა) დაინიშნოს პრედინიტოლონი;
- ბ) ყერადღება არ მივაქციოთ მის მგრძნობელობის;
- გ) მეტანდობას დაემატოს ანტიბიოტიკები;
- დ) გაიგარდოს მიღების სიხშირე;
- * ე) შეწყდეს წამლის მიღება, გადაიხედოს დანიშნულების დოზა და პოტენცია.

136. რას ნიშნავს დათრგვენის ეფექტი?

- ა) თავის ტკივილის გაქრობას;
- * ბ) საერთო მდგრმარეობის გაუარესებას;
- გ) საგანგაშო სიმპტომების გაქრობას;
- დ) თვითგრძნობის გაუმჯობესებას;
- ე) თვითგანკურნებას.

137. როგორ უნდა მოვიქსეთ დათრგუნვის ეფექტის შემთხვევაში?

- * ა) შევარჩიოთ მეტად მსგავსი წამალი;
- ბ) გაიბარღოს პრეპარატის დოზა;
- გ) გამოყენებულ იქნას დამხმარედ ანტილოტი და გაგრძელდეს იგივე მკურნალობა;
- დ) გაგრძელდეს იგივე მკურნალობა;
- ე) ყერალღება არ მივაქციოთ.

138. რას წარმოადგენს ანტილოტი?

- ა) წამლის მოქმედების გამაძლიერებელი საშუალება;
- ბ) წამლის განსაკუთრებული პოტენცია;
- გ) წამლის დოზა;
- * დ) წამლის მოქმედების შემაჩერებელი საშუალება;
- ე) მიღების სიხშირე

139. უნივერსალური ანტილოტი;

- ა) ვერცხლისწყვილი;
- * ბ) ქაფური;
- გ) ლაპისი, დარიშხანი;
- დ) გოგირდი;
- ე) ჰალოიდი.

140. რა შემთხვევაში იხმარება უნივერსალური ანტილოტები?

- ა) თუ წამალი არ იძლევა არანაირ გვერდით სიმპტომებს;
- * ბ) აფალტიფის მდგრმარეობის აშკარა გაუარესების დროს წამლის მიღების შემდეგ;
- გ) თუ წამალი არ იძლევა პირველად გაუარესებას;
- დ) თუ წამლის დოზა საქმარისი არ არის;
- ე) თუ წამლის მიღების სიხშირე საქმარისი არ არის.

141. რას წარმოადგენს მაპროცეცირებელი ანუ რეაქტიული საშუალებები?

- ა) არაფერნი;
- ბ) დაავალებული ორგანოს გამომავლინებელი საშუალება;
- * გ) პრეპარატის მოქმედების მასფიმულირებელი საშუალება;
- დ) დაავალების სურათის დამტრგუნვით საშუალება;
- ე) გვერდითი მოვლენების მომხსხელი საშუალება (მკურნალობის ფონზე).

142. როგორი რეაქტიული საშუალებები არსებობს?

- ა) კოფეინი;
- * ბ) სულფური;
- გ) ქაფური;
- დ) მარილი, მმარი;
- ე) სპირტი.

143. რა შემთხვევაში გამოიყენება რეაქტიული საშუალება?

- ა) ორგანიზმის გადაჭარბებული რეაქციისას;
- ბ) თავის ტკიფილის გაჩენისას;
- * გ) ორგანიზმის არასაკემარისი რეაქციისას სწორ ჰომეოპათიურ წამალზე;
- დ) როდესაც თრგანიზმს აქვს აღექვატური რეაქცია წამალზე;
- ე) ჰომეოპათიაზი არ იხმარება.

144. რა შეიძლება მოხდეს, თუ წამლის პოტენცია მეტად საჭირობენ?

- * ა) წამალმა შეიძლება გამოიწვიოს სასიცოცხლო ძალის დაუძლეურება;
- ბ) წამალი სწრაფად ახდენს ყველა სიმპტომის კუპირებას;
- გ) არ ავლენს არანაირ გვერდით ეფექტს;
- დ) არანაირად არ იმოქმედებს ორგანიზმზე;
- ე) გამოიწვევს თავის ტკიფილს.

145. რა შეიძლება მოხდეს, თუ პრეპარატის პოტენცია ძალიან დაბალია?

- ა) გამოიწვიოს ახალი, აქმდე არარსებული დაბალება;
- ბ) დააბიანოს ჯანმრთელი ორგანო;
- გ) არასასურველი რეაქცია ნერვული სისტემის მხრივ;
- * დ) მდგრმარეობის არასასურველი გამწვავება;
- ე) არასოდეს არ იძლევა გამწვავებას.

146. რა უნდა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, როცა პრეპარატის პოტენცია ძალიან დაბალია?

- ა) მოვუმატოთ მიღების სიხშირეს;
- ბ) არაფერი;
- * გ) მივცევთ უფრო მაღალი პოტენციას;
- დ) მოვუმატოთ ლობა;
- ე) დავუმატოთ რეაქტიული საშუალება.

147. რას წარმოადგენს გიბსონის სქემა?

- * ა) სამკურნალო საშუალებათა ურთიერთქმედების სქემა;
- ბ) პოტენციების გრაფიკი;
- გ) ნოტოდების ჩამონათვალი;
- დ) წამლების ბიორიომები;
- ე) წამლის მიღების სიხშირის ჩამონათვალი.

148. რისთვის უნდა გამოვიყენოთ გიბსონის სქემა?

- ა) რომ დამტესტდეს წამლის მიღების ლობა;
- * ბ) შემოწმდეს წამლების კომპლექტურობა და თანმიმდევრობა;
- გ) განისაზღვროს ყველა წამლის მოქმედება პოტენციების გრაფიკით;
- დ) რომ შემოწმდეს ნოტოდების ჩამონათვალი;
- ე) რომ დამტესტდეს წამლის მოქმედების ბიორიომი.

149. რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება კონსტიტუცია?

- * ა) ფიზიკური, ფსიქიური და სულიერი მდგრმარეობის ერთიანობით;
- ბ) ლოკალური სიმპლომების მიხედვით;
- გ) გარეგნები ნიშნებით;
- დ) სამკურნალო რეექტის მიხედვით (ან დანიშნულების გარკვეული წესით);
- ე) ორგანული დაბიანებით.

150. რა როლი ენიჭება ბიოგრაფიას კონსტიტუციის შერჩევაში?

- ა) გამოავლენს დაზიანებულ ორგანოს;
- ბ) გამოავლენს შიშების ხასიათს;
- * გ) გვაძლევს წარმოადგენას პროცესის მიმდინარეობის, წარსულის, დაავალების განვითარების შესახებ;
- დ) არ არის მთიშვნელოვანი;
- ე) გამოავლენს ნოტოლოგიას.

151. ქრონიკული დაავალებების ეფიოლოგია;

- * ა) ქრონიკული მიაბმი;
- ბ) ახალი სტრესი;
- გ) ახალი ტრავმა;
- დ) მწვავე ინფექციური დაავალება;
- ე) მწვავე ტკინის შერყევა.

152. როგორ ითარგმნება სიტყვა “მიაჩმი” ბერძნულიდან?

- ა) ადამიანი;
- * ბ) დაბინძურება;
- გ) განკურნება;
- დ) დაავალება;
- ე) გაცივება.

153. რა ურთიერთკავშირია ინფექციასა და კონსტიტუციას შორის?

- ა) კონსტიტუციი კონსტიტუციის ტიპს შეიძლება დაემართოს მხოლოდ ერთი გარკვეული ინფექციური დაავალება;
- ბ) ერთ გარკვეულ კონსტიტუციას არ შეიძლება ჰქონდეს არანაირი ინფექცია;
- * გ) კონსტიტუციური მბალყოფნა და გამომწვევის ვირულენტობა პირდაპირ კავშირშია;
- დ) არ არის არანაირი კავშირი;
- ე) კონკრეტული კონსტიტუცია რეაგირებს მხოლოდ ერთ მიკრობზე.

154. რა ძირითად ორ ტიპად იყოფა მიაბმები?

- * ა) მწვავე და ქრონიკული;
- ბ) გარეგანი და შინაგანი;
- გ) მიკრობები და ვირუსები;
- დ) ფსიქიური და სომატური;
- ე) ფიზიკური და სულიერი.

155. დღესდღეობით მიაბმის რა თოხ ძირითად სახეობას გამოვყოფ?

- ა) დარიშხანი, გოგირდი, ცინა;

- ბ) აბსინთი, კალკარება, ფოსფორი, ცინქი;
* გ) ფსორა, სიკობი, სიფილისური; ტუბერკულოზური
დ) მწვავე, ქრონიკული, ბიოგრაფიული, კონსტიტუციური;
ე) 1, 2, 3, 4;

156. რომ განსხვავდება მწვავე მიამმი ქრონიკულისგან?
ა) მწვავეს ახასიათებს გამონალენი, ქრონიკულს - არა;
ბ) მწვავეს ახასიათებს წყლული, ქრონიკულს - ქავილი;
* გ) მწვავე- სწრაფად წარმოქმნილი ინფექციები, რომლებიც სწრაფადვე ინკურნება, ქრონიკული- წლების მანძილზე ვითარდება
და სულ უფრო მძიმდება;
დ) მწვავე- ინკურნება ანგიბიოტიკებით, ქრონიკული- ჰომეოპათიის და ალოპათიის კომბინაციით;
ე) მწვავეს- ახასიათებს ქავილი, ქრონიკულს- ახასიათებს წყლული.

157. რას ნიშნავს ფსორა?

- ა) კანის სიმშრალე;
* ბ) “ქავილიანი შინაგანი დაავალებული კანზე გამონაყარით ან მის გარეშე”;
გ) წყლულოვანი წარმონაქმნი;
დ) ძლიერი თფლიანობა;
ე) მეჭეჭების გაჩენა.

158. რა ახასიათებს ფსორას?

- ა) კანის სიმშრალე;
ბ) მეჭეჭები, კონდილომატოზი, თფლიანობა;
გ) წყლულოვანი წარმონაქმნი;
* დ) მშრალი გამონაყარი ქავილი;
ე) სუფთა კანი.

159. რა მიგვითითებს სიფილისურ მიაგმზე?

- * ა) სიფილის გენეტიკურ ან ცხოვრების ანამნეზში;
ბ) სიმსიცეების წარმოქმნის ტენდენცია;
გ) კანის ქავილი, პეტექიები;
დ) კანზე ჰერპესული გამონაყარი;
ე) კანის კონდილომები.

160. რა მიგვანიშნებს ტუბერკულინურ მიაგმზე?

- ა) კანის სიმშრალე;
* ბ) ტუბერკულოზი გენეტიკურ ან ცხოვრების ანამნეზში;
გ) მუნი;
დ) კანისა და ლორწოფნის წყლულოვანი დაზიანებული;
ე) წყლულისაკენ მიღრეკილება და შაკიკი.

161. რა არის ნოზოდი?

- * ა) ცოცხალი ორგანიზმის პათოლოგიური გამონაყოფილი დამზადებული წამალი;
ბ) ადამიანის თრაგბოთა ქსოვილებისგან დამზადებული წამალი;
გ) ქიმიური პრეპარაციის მიღებული ჰომეოპათიური საშეალება;
დ) მცენარეული საშეალებები;
ე) სულფანილამილები.

162. დღესდღეობით ცნობილი ძირითადი ნოზოდები.

- ა) ლიკოპოლიტი, ბრიონია, რუს-ფოქსი;
ბ) მერკერი, არსენიკი, სულფური;
გ) ალრენალინი, თირეოიდინი, ნუქს-ვომიკა;
* დ) ფსორინი, მეფორინი, ლუებინი, ტუბერკულინი, კარცინომინი
ე) დარიშხანი, სეპია, ფილფორი.

163. რისგან კეთდება ფსორული ნოზოდი?

- ა) ჭლექიანი პაციენტის ნახველისაგან;
ბ) ლოკოენას ნიჟარისაგან;
გ) ვეშაპის დვიძლის უჯრედებისგან;
* დ) მუნის ბუშტუკებისა და მიღებული სეკრეტისაგან;
ე) ტუბერკულოზის ჩხირისაგან.

164. სიკოზური კონსტიტუციის ნოზოდი.

- ა) დარიშხანი;

- *ბ) მედორინი;
- გ) ლუებინი;
- დ) მერკურიუმ კოროზივუს;
- ე) მერკურიუმ სოლუბილისი.

165. რისგან კეთლება სიკოტური ნომრიდ?

- ა) კაფის ბრჭყალისგან;
- *ბ) გონიორენის დროს ურეთრალური სეკრეტისგან;
- გ) გოგრის თესლისგან;
- დ) ეგზემატოზური გამონალენისგან;
- ე) სიფილისური შანკრის გამონალენისგან.

166. სიფილისური კონსტიტუციის ნომრი

- *ა) ლუებინი;
- ბ) მედორინი;
- გ) მერკური სოლუბილისი;
- დ) ტუა;
- ე) გოგირდი.

167. რისგან კეთლება ტუბერკულოზური ნომრიდ?

- ა) ვერცხლისწყლის სრესვით მიღებული წამალი;
- ბ) არყის ხის ჩაგასგან;
- გ) გოგირდისა და ქვიშის ნარევისაგან;
- დ) ლოკოკინის ნიჟარისაგან;
- *ე) ტუბერკულოზიანი ავალმყოფის გამონაყოფის სუფთა კულტურისგან.

168. რა არის კარცინოზინი?

- *ა) მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნისაგან დამბალებული წამალი;
- ბ) დაავალებული ცხოველის ნერწყვისაგან დამბალებული წამალი;
- გ) ნახშირმებავა კალცისა და ქვიშის ნარევი;
- დ) კალციუმის და გოგირდის ნარევისაგან მომბალებული წამალი;
- ე) ვერცხლისწყლის მარილისგან მიღებული წამალი.

169. რა სახის დიათებები არსებობს?

- *ა) სკროფულობი, შარლმჟავა, დისკრაზიული;
- ბ) სიკოტური, ფსორული, სიფილისური;
- გ) სომატური;
- დ) ნომრლოგიური, სუბიექტური;
- ე) ობიექტური.

170. რას ნიშნავს ლიმფატიკური დიათები პომეოპათიაში?

- ა) კანის სიმშრალე;
- *ბ) იგივეა, რაც ექსედაციური;
- გ) ლიმფური ქსოვილის ჰიპერტონია;
- დ) დაზიანება შემდეგი მიმართულებით: ლორწოვანი-შინაგანი ორგანოები-კანი;
- ე) ოფლიანობა.

171. რომელი მიამმი იწვევს ლიმფატიკური დიათების განვითარებას?

- *ა) ფსორა;
- ბ) სიკოზი;
- გ) სიფილისი;
- დ) ტებერკულოზი;
- ე) დარიშხანი.

172. ლიმფატიკური დიათების ძირითადი კლინიკური ნიშნები;

- ა) თაფის ტკიფილი;
- ბ) დამბლა;
- *გ) შეფერხება, რაქიფი, ლიმფური ქსოვილის ჰიპერტონია;
- დ) დერმატოული გამოვლინებანი;
- ე) სახსრების რევმატული დაზიანება.

173. რას ნიშნავს სკროფულობი?

- ა) ალერგია;
- ბ) რაქიტი;

- * გ) ტუბერკულოზის ერთ-ერთი ძველი დასახელება;
დ) დლიერი მიღრეკიდება ტუბერკულოზისადმი;
ე) რეპრენატიული გამოვლინებები.

174. რომელი მიამი იწვევს სკროფულობის განვითარებას?

- ა) სიფილის;
ბ) დარიშხანი;
* გ) ტუბერკულოზური;
დ) ფსორა;
ე) სიკოზი;

175. სკროფულოზის ძირითადი კლინიკური ნიშნები;

- ა) ალერგიული გამონაყარი;
ბ) თაფის ტკიფილი;
გ) ბავშვები ხშირად ავადმყოფობების პილების შემდეგ;
* დ) ბოვადი დამფაგიზმი, შეშუპება, ანემია;
ე) კანის პათოლოგია.

176. რას ნიშნავს შარლმჟავა დიათეზი?

- * ა) რევმაზოფილი - ძოლაგრული;
ბ) ტუბერკულოზური პროცესი;
გ) დამბლა;
დ) ალერგიული რეაქციები;
ე) შარლფის ფუნქციის მოშლა.

177. შარლმჟავა დიათეზის ძირითადი კლინიკური ნიშნები;

- ა) თაფის ტკიფილი;
* ბ) ზიანდება სახსრები, კუნთები, მყესები, ნერვები;
გ) ჰიპერქოლესტერინუმია, კეთილთვისებიანი სიმსივნე, დიაბეტი;
დ) გამონაყარი ტანტე;
ე) ავთვისებიანი სიმსივნე შეტასტიტებით.

178. რას ნიშნავს დისკრაზიული დიათეზი?

- ა) ალერგიული რეაქცია;
ბ) საჭმლის მომნებელებელი ტრაქტის ფუნქციური მოშლილობა;
* გ) ყველა სხვა დიათეზის შედეგი;
დ) ხერხემლის გამრულება;
ე) მინერალური ცვლის მოშლა.

179. რომელ მიამს განეკუთვნება დისკრაზიული დიათეზი?

- ა) სიკოზი;
ბ) მწვავე მიამზი;
* გ) სიფილისერი;
დ) ტუბერკულოზური;
ე) ფსორა.

180. დისკრაზიული დიათეზის ძირითადი კლინიკური ნიშნები;

- ა) თაფის ტკიფილი;
ბ) რაქიფი;
* გ) ავთვისებიანი სიმსივნეები, ჰემობლასტოზები;
დ) ოფლაბითბა, ქავილი;
ე) ალერგია.

181. ჩამოთვალეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული პრეპარატები დისკრაზიული დიათეზის დროს;

- ა) კალკარეა კარბონიკა, კალცი ფოსფორ, კოფება, ბარიტ კარბონიკა, სილიცეა, ჰეპარ სულფურის, ფსორინუმ;
ბ) მერკური, ტუბერკულინი, მაგნეზია ფოსფორიკა, მერკურ ბიიოლ;
გ) ტუია, აცილუმ ნიტრიკუმ, ლელკამარა, მედორინუმ;
* დ) არსენ იოდ, კალი ბიქრომ, კრეოსოფუმ, სილიცეა, კალი იოდ, ალუმბუმ, აურუმ, მერკურ;
ე) კრეოსოფუმ, ტუია, აურუმ.

182. ჩამოთვალეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული პრეპარატები სკროფულოზის დროს;

- ა) კალკარეა კარბონიკა, კალცი ფოსფორ, კოფება, ბარიტ კარბონიკა, სილიცეა, ჰეპარ სულფურის, ფსორინუმ;
* ბ) მერკური, ტუბერკულინი, მაგნეზია ფოსფორიკა, მერკურ ბიიოლ;
გ) ტუია, აცილუმ ნიტრიკუმ, ლელკამარა, მედორინუმ;

დ) არსები ითდ, კალი ბიქრომ, კრეოსოფუმ, სილიცეა, კალი ითდ, პლუმბუმ, აურუმ, მერკურ;
ე) კრეოსოფუმ, ტუია, აურუმ.

183. ჩამოთვალეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული პრეპარატები შარლმევავა დიათების დროს;
- ა) კალკარი კარბონიკა, კალცი ფოსფორ, კოფეა, ბარიტა კარბონიკა, სილიცეა, ჰეპარ სულფურის, ფსორინუმ;
- ბ) მერკური, ტებერკელინი, მაგნეზია ფოსფორიკა, მერკურ ბიიოლ;
- * გ) ტუია, აცილუმ ნიფრიკუმ, დულკამარა, მედორინუმ;
- დ) არსები ითდ, კალი ბიქრომ, კრეოსოფუმ, სილიცეა, კალი ითდ, პლუმბუმ, აურუმ, მერკურ;
- ე) კრეოსოფუმ, ტუია, აურუმ.

184. ჩამოთვალეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული პრეპარატები დისკრამიული დიათების დროს.

- ა) კალკარი კარბონიკა, კალცი ფოსფორ, კოფეა, ბარიტა კარბონიკა, სილიცეა, ჰეპარ სულფურის, ფსორინუმ;
- ბ) მერკური, ტებერკელინი, მაგნეზია ფოსფორიკა, მერკურ ბიიოლ;
- გ) ტუია, აცილუმ ნიფრიკუმ, დულკამარა, მედორინუმ;
- * დ) არსები ითდ, კალი ბიქრომ, კრეოსოფუმ, სილიცეა, კალი ითდ, პლუმბუმ, აურუმ, მერკურ.
- ე) კრეოსოფუმ, ტუია, აურუმ.

185. ფსორული ავადმყოფის ძირითადი ფსიქიური რეაქციები.

- * ა) არასრულფასოვნების კომპლექსი, სიმხდალე, მომავლის შიში, უიმედობა, ეჭვიანობა;
- ბ) გაღიმინებადობა, მოუსვეენობა, ტირის თავისი უბედურების მოყოლისას, დაბწეულობა, არათანმიმდევრულობა საუბრისას, ფანგიზიორობა;
- გ) მეხსიერების დაქვეითება, ყურადღების გაფანტვა, მოუსვეენობა შიშით, დეპრესია სუიციდალური აბრებით;
- დ) ყოველგვარი სიახლის შიში, ცხოველების შიში, დაღლილობა;
- ე) ეჭვიანობა, წესრიგის სიყვარული.

186. სიკოზური ავადმყოფის ძირითადი ფსიქიური რეაქციები.

- ა) არასრულფასოვნების კომპლექსი, სიმხდალე, მომავლის შიში, უიმედობა, ეჭვიანობა;
- * ბ) გაღიმინებადობა, მოუსვეენობა, ტირის თავისი უბედურების მოყოლისას, დაბწეულობა, არათანმიმდევრულობა საუბრისას, ფანგიზიორობა;
- გ) მეხსიერების დაქვეითება, ყურადღების გაფანტვა, მოუსვეენობა შიშით, დეპრესია სუიციდალური აბრებით;
- დ) ყოველგვარი სიახლის შიში, ცხოველების შიში, დაღლილობა;
- ე) ეჭვიანობა, წესრიგის სიყვარული.

187. სიფილისური ავადმყოფის ძირითადი ფსიქიური რეაქციები.

- ა) არასრულფასოვნების კომპლექსი, სიმხდალე, მომავლის შიში, უიმედობა, ეჭვიანობა;
- ბ) გაღიმინებადობა, მოუსვეენობა, ტირის თავისი უბედურების მოყოლისას, დაბწეულობა, არათანმიმდევრულობა საუბრისას, ფანგიზიორობა;
- * გ) მეხსიერების დაქვეითება, ყურადღების გაფანტვა, მოუსვეენობა შიშით, დეპრესია სუიციდალური აბრებით;
- დ) ყოველგვარი სიახლის შიში, ცხოველების შიში, დაღლილობა;
- ე) ეჭვიანობა, წესრიგის სიყვარული.

188. ტებერკელოზური ავადმყოფის ძირითადი ფსიქიური რეაქციები

- ა) არასრულფასოვნების კომპლექსი, სიმხდალე, მომავლის შიში, უიმედობა, ეჭვიანობა;
- ბ) გაღიმინებადობა, მოუსვეენობა, ტირის თავისი უბედურების მოყოლისას, დაბწეულობა, არათანმიმდევრულობა საუბრისას, ფანგიზიორობა;
- გ) მეხსიერების დაქვეითება, ყურადღების გაფანტვა, მოუსვეენობა შიშით, დეპრესია სუიციდალური აბრებით;
- * დ) ყოველგვარი სიახლის შიში, ცხოველების შიში, დაღლილობა;
- ე) ეჭვიანობა, წესრიგის სიყვარული.

189. ფსორის ძირითადი სომატური გამოვლინებები

- * ა) მინერალური ცელის მოშლით გამოწვეული დეფიციტი / ჰიპოფუნქცია, ჰიპოტონია, ჰიპოთორენტია/;
- ბ) ჰემორალური დარღვევებით გამოწვეული სიჭარე / ჰიპერფუნქცია, ჰიპერტონია, ჰიპერონია, ჰიპერთორენტია/;
- გ) ექსუდაციური ლიმფატური კომპონენტი და დამანგრეველი მოქმედება / კავერნა/;
- დ) ლეიფრუქცია / დისფუნქცია, ლისტროფია, დისტონია/;
- ე) თავის ტკივილი.

190. სიკოზის ძირითადი სომატური გამოვლინებები

- ა) მინერალური ცელის დარღვევებით გამოწვეული დეფიციტი / ჰიპოფუნქცია, ჰიპოტონია, ჰიპოთორენტია/;
- * ბ) ჰემორალური დარღვევებით გამოწვეული სიჭარე / ჰიპერფუნქცია, ჰიპერტონია, ჰიპერონია, ჰიპერთორენტია/;
- გ) ექსუდაციური ლიმფატური კომპონენტი და დამანგრეველი მოქმედება / კავერნა/;
- დ) ლეიფრუქცია / დისფუნქცია, ლისტროფია, დისტონია/;
- ე) თავის ტკივილი.

191. სიფილისის ძირითადი სომატური გამოვლინებები

- ა) მინერალური ცელის დარღვევებით გამოწვეული დეფიციტი / ჰიპოფუნქცია, ჰიპოფროფია, ჰიპოთორეოზი/;
ბ) ჰემორალური დარღვევებით გამოწვეული სიჭარბე / ჰიპერფუნქცია, ჰიპერტოფია, ჰიპერონია, ჰიპერთირეოზი/;
გ) ექსუდაციური ლიმფატური კომპონენტი და დამანგრეველი მოქმედება / კავერნა/;
*დ) დესტრუქცია / დისფუნქცია, დისტროფია. დისტრონია/;
ე) თავის ტკივილი.

192. ტუბერკულოზის ძირითადი სომატური გამოვლინებები

- ა) მინერალური ცელის დარღვევებით გამოწვეული დეფიციტი / ჰიპოფუნქცია, ჰიპოფროფია, ჰიპოთორეოზი/;
ბ) ჰემორალური დარღვევებით გამოწვეული სიჭარბე / ჰიპერფუნქცია, ჰიპერტოფია, ჰიპერონია, ჰიპერთირეოზი/;
*გ) ექსუდაციური ლიმფატური კომპონენტი და დამანგრეველი მოქმედება / კავერნა/;
დ) დესტრუქცია / დისფუნქცია, დისტროფია, დისტრონია/;
ე) თავის ტკივილი.

193. ქრონიკული დაბვადებების მკურნალობის ძირითადი სქემა

- ა) მხოლოდ დაბიანებული ორგანის მკურნალობა;
*ბ) დამაზანებული კერების დიკვიდცია, ალოპათიური მკურნალობის შედეგების გათვალისწინება, წამლის შერჩევისას არ დავეყრდნოთ მხოლოდ ახლანდელ მონაცემებს, მნიშვნელოვანია აგრეთვე ბიოგრაფიული ანამნეზი;
გ) იწყება ნობოლოგიის მკურნალობით, შემდეგ ფუნქციური მოშლილობის, ბოლოს პაციენტის ფსიქოლოგიური პრობლემების;
დ) ერთი ან ორი სიმპტომის კეპირება;
ე) მხოლოდ ნობოლოგიის მკურნალობა.

194. ფსორის ტიპოლოგიური მახასიათებლები

- ა) მორიდებულობა, აგრესია, მიბანდასახულობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, ექსტრავაგანტულობა;
ბ) აგრესიული დიქტატორი, მშიშარა, ძველმოლური, მკრძნობიარე;
*გ) მორცხვობა, სულმოკლეობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, სუსტი, მშიშარა, მეწვრილმანე, პედანტური, ძველმოლური, მოსაწყები, მკრძნობიარე;
დ) მომთხოვნი, ტრაბახა, თვითდაჯერებული, დინამიური, ყოჩაღი, თავს გახვევს იღებს, ეჭვიანი, ნეკროტული, ზემოდერი;
ე) აგრესიული, ნეკროტული, მიღრეეკილებით ნგრევისაკენ, თვითმკვლელობისაკენ, დანაშაულის გრძნობა, ექსტრავაგანტურად ჩატული, რევოლუციური.

195. სიკონის ტიპოლოგიური მახასიათებლები

- ა) მორიდებულობა, აგრესია, მიბანდასახულობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, ექსტრავაგანტულობა;
ბ) აგრესიული დიქტატორი, მშიშარა, ძველმოლური, მკრძნობიარე;
გ) მორცხვობა, სულმოკლეობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, სუსტი, მშიშარა, მეწვრილმანე, პედანტური, ძველმოლური, მოსაწყები, მკრძნობიარე;
*დ) მომთხოვნი, ტრაბახა, თვითდაჯერებული, დინამიური, ყოჩაღი, თავს გახვევს იღებს, ეჭვიანი, ნეკროტული, ზემოდერი;
ე) აგრესიული, ნეკროტული, ნგრევისაკენ მიღრეეკილებით, თვითმკვლელობისაკენ, ექსტრავაგანტურად ჩატული, რევოლუციური.

196. სიფილისის ტიპოლოგიური მახასიათებლები

- ა) მორიდებულობა, აგრესია, მიბანდასახულობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, ექსტრავაგანტულობა;
ბ) აგრესიული დიქტატორი, მშიშარა, ძველმოლური, მკრძნობიარე;
გ) მორცხვობა, სულმოკლეობა, არასრულფასოვნების კომპლექსი, სუსტი, მშიშარა, მეწვრილმანე, პედანტური, ძველმოლური, მოსაწყები, მკრძნობიარე;
*დ) მომთხოვნი, ტრაბახა, თვითდაჯერებული, დინამიური, ყოჩაღი, თავს გახვევს იღებს, ეჭვიანი, ნეკროტული, ზემოდერი;
ე) აგრესიული, ნეკროტული, ნგრევისაკენ მიღრეეკილებით, თვითმკვლელობისაკენ, ექსტრავაგანტურად ჩატული, რევოლუციური.

197. რას ნიშნავს ევგენიკური მკურნალობა?

- *ა) ბავშვის ნორმალური განვითარებისათვის პროფილაქტიკური ღონისძიებანი;
ბ) ბალანსირებული კვება;
გ) ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკა;
დ) მოხუცების მკურნალობა;
ე) ჰიპერფორმანებული დაბაგდების პროფილაქტიკა.

198. რისი დათრგუნვა ახასიათებს ფსორას?

- *ა) კანგე გამონაყარის, შარდის, განავლის, მენტესის;
ბ) ქალის სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის, ნახველის, ყურიდნ გამონადენის, პაპილომების და ფიბრომების;
გ) წყლელიდნ, ჩირქებროვილი, ფსიტელიდნ გამონადენის;
დ) კანის გამონაყარის, ფიბროლოგიური და პათოლოგიური გამონაყოფების, განსაკუთრებით ფეხის ოფლის;
ე) თავის ტკივილი.

199. რისი დათრგუნვა ახასიათებს სიკომს?

- ა) კანგე გამონაყარის, შარდის, განავლის, მენტესის;

- *ბ) ქალის სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის, ნახეველის, ყურიდან გამონადენის, პაპილომების და ფიბრომების;
გ) წყლელიდან, ჩირქებროვიდან, ფისტულიდან გამონადენის;
დ) კანის გამონაყარის, ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური გამონაყოფების, განსაკუთრებით ფეხის ოფლის;
ე) თავის ტკიფილის.

200. რისი დათრგუნვა ახასიათებს სიფილინუმს?

- ა) კანბე გამონაყარის, შარლის, განავლის, მენბესის;
ბ) ქალის სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის, ნახეველის, ყურიდან გამონადენის, პაპილომების, ფიბრომების;
*გ) წყლელიდან, ჩირქებროვიდან, ფისტულიდან გამონადენის;
დ) კანის გამონაყარის, ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური გამონაყოფების, განსაკუთრებით ფეხის ოფლის;
ე) თავის ტკიფილის.

201. რისი დათრგუნვა ახასიათებს ტებერ-ფულინუმს?

- ა) კანბე გამონაყარის, შარლის, განავლის, მენბესის;
ბ) ქალის სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის, ნახეველის, ყურიდან გამონადენის, პაპილომების, ფიბრომების;
გ) წყლელიდან, ჩირქებროვიდან, ფისტულიდან გამონადენის;
*დ) კანის გამონაყარის, ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური გამონაყოფების, განსაკუთრებით ფეხის ოფლის;
ე) თავის ტკიფილის.

202. ფსორის დათრგუნვის შედეგები

- *ა) ნერვულ ფსიქიური სიმპტომები;
ბ) შარლ-სასქესო სისტემის დაავალებები, ჰიპერტონია, კისტები, თავის ტკიფილი, მორალურ-ფსიქიური დარღვევები;
გ) ტვინისა და თვალის გარსების, ძვლების, ხახის დაავალებები;
დ) თავის ტკიფილი, აგზება, დაზირქება, კავერნა;
ე) რაქიტი.

203. სიკობის დათრგუნვის შედეგები

- ა) ნერვულ ფსიქიური სიმპტომები;
*ბ) შარლ-სასქესო სისტემის დაავალებები, ჰიპერტონია, კისტები, თავის ტკიფილი, მორალურ-ფსიქიური დარღვევები;
გ) ტვინისა და თვალის გარსების, ძვლების, ხახის დაავალებები;
დ) თავის ტკიფილი, აგზება, დაზირქება, კავერნა;
ე) რაქიტი.

204. სიფილინუმის დათრგუნვის შედეგები

- ა) ნერვულ ფსიქიური სიმპტომები;
ბ) შარლ-სასქესო სისტემის დაავალებები, ჰიპერტონია, კისტები, თავის ტკიფილი, მორალურ-ფსიქიური დარღვევები;
*გ) ტვინისა და თვალის გარსების, ძვლების, ხახის დაავალებები;
დ) თავის ტკიფილი, აგზება, დაზირქება, კავერნა;
ე) რაქიტი.

205. ტებერ-ფულინუმის დათრგუნვის შედეგები

- ა) ნერვულ ფსიქიური სიმპტომები;
ბ) შარლ-სასქესო სისტემის დაავალებები, ჰიპერტონია, კისტები, თავის ტკიფილი, მორალურ-ფსიქიური დარღვევები;
გ) ტვინისა და თვალის გარსების, ძვლების, ხახის დაავალებები;
*დ) თავის ტკიფილი, აგზება, დაზირქება, კავერნა;
ე) რაქიტი.

206. პათოლოგიის დინამიკა ფსორის დროს

- *ა) სიმპტომების სწრაფი შეცვლა;
ბ) ნელი რეკონვალებებისა, რეციდივები, ფარული მიმდინარეობა;
გ) გამოჯამრთოელების ტენდენციის არქონა, სწრაფი გამოფიტვა;
დ) ფიზიკური და ფსიქიური სიმპტომების სწრაფი ცვლა;
ე) ახალი დაავალების გაჩენა.

207. პათოლოგიის დინამიკა სიკობის დროს

- ა) სიმპტომების სწრაფი შეცვლა;
*ბ) ნელი რეკონვალებებისა, რეციდივები, ფარული მიმდინარეობა;
გ) გამოჯამრთოელების ტენდენციის არქონა, სწრაფი დაუძლებელი;
დ) ფიზიკური და ფსიქიური სიმპტომების სწრაფი ცვლა;
ე) ახალი დაავალების გაჩენა.

208. პათოლოგიის დინამიკა სიფილინური მიაბმის გააქტიურებისას

- ა) სიმპტომების სწრაფი შეცვლა;
ბ) ნელი რეკონვალებებისა, რეციდივები, ფარული მიმდინარეობა;

- * გ) გამოჯანმრთელების ტენდენციის არქონა, სწრაფი გამოფიტვა;
დ) ფიზიკური და ფიქტური სიმპტომების სწრაფი ცვლა;
ე) ახალი დაავალების გაჩენა.

209. პათოლოგიის დინამიკა ტებერკულინური მიამმის გააქტიურებისას

ა) სიმპტომების სწრაფი შეცვლა;
ბ) ნელი რეკონვალეციენცია, რეციდივები, ფარელი მიმდინარეობა;
გ) გამოჯანმრთელების ტენდენციის არქონა, სწრაფი გამოფიტვა;
*დ) ფიზიკური და ფიქტური სიმპტომების სწრაფი ცვლა;
ე) ახალი დაავალების გაჩენა.

210. ფსორისათვის დამახასიათებელი კანის პრობლემები

- *ა) მშრალი, „ჭუჭყაინი“, ხაოვბიანი;
ბ) ქონიანი, ცხიმიანი, ლაქებიანი, მეჭეჭებით, ხალები, სტრიები, ფიბრომები;
გ) სპილენბის ფერი გამონაყარი სასახსრე ბედაპირებზე;
დ) თხელი, ნაზი, გამჭვირვალე, ნამიანი, ჭორფლიანი;
ე) პორფირინის დაგროვება.

211. სიკოზისათვის დამახასიათებელი კანის პრობლემები

- ა) მშრალი, „ჭუჭყაინი“, ხაოვბიანი;
*ბ) ქონიანი, ცხიმიანი, ლაქებიანი, მეჭეჭებით, ხალები, სტრიები, ფიბრომები;
გ) სპილენბის ფერი გამონაყარი სასახსრე ბედაპირებზე;
დ) თხელი, ნაზი, გამჭვირვალე, ნამიანი, ჭორფლიანი;
ე) პორფირინის დაგროვება.

212. სიფილინური მიამმის დამახასიათებელი კანის პრობლემები

- ა) მშრალი, „ჭუჭყაინი“, ხაოვბიანი;
ბ) ქონიანი, ცხიმიანი, ლაქებიანი, მეჭეჭებით, ხალები, სტრიები, ფიბრომები;
*გ) სპილენბის ფერი გამონაყარი სასახსრე ბედაპირებზე;
დ) თხელი, ნაზი, გამჭვირვალე, ნამიანი, ჭორფლიანი;
ე) პორფირინის დაგროვება.

213. ტებერკულინომური მიამმის დამახასიათებელი კანის პრობლემები

- ა) მშრალი, „ჭუჭყაინი“, ხაოვბიანი;
ბ) ცხიმიანი, ლაქებიანი, მეჭეჭებით, ხალები, სტრიები, ფიბრომები;
გ) სპილენბის ფერი გამონაყარი სასახსრე ბედაპირებზე;
*დ) თხელი, ნაზი, გამჭვირვალე, ნამიანი, ჭორფლიანი;
ე) პორფირინის დაგროვება.

214. ფსორის ძირითადი მოდალობები

- *ა) გაუმჯობესება-მოსვენებულ მდგომარეობაში, სითბოში, ბაფტულში, გაუარესება-დილით, აგზებისგან, სუნებისგან, ხმაურისგან, მენსტრუაციის წინ;
ბ) გაუმჯობესება-მუეცლებელ წოლისას, ნელი მოძრაობისგან, მშრალი ამინდის ღროს, გამონაყარის ღროს. გაუარესება-მოსვენებულ მდგომარეობაში, გაბრაზებისას, ამინდის შეცვლისას, ოფლისგან, დეფეკაციის შემდეგ, შეაღამის შემდეგ;
გ) გაუმჯობესება-მოძრაობისგან, სიცივისგან, წყლულის გამწვავებისას. გაუარესება- გაბრაზებისგან, მზის ჩასელიდან ამოსვლამდე, ქარისგან, გამთარში, ამინდის უცაბედი შეცვლისას;
დ) გაუმჯობესება-ყურადღების გადართვისგან, ადგილობრივი სითბოსგან, ოფლიანობისგან. გაუარ- მკეთრი მოძრაობებისგან, ფიზიკური და გონებრივი დაძაბვისგან, დამკ, ხელოვნური განათებისგან;
ე) არა აქვს მოდალობები.

215. სიკოზის ძირითადი მოდალობები

- ა) გაუმჯ-მოსვენებულ მდგომარეობაში, სითბოში, ბაფტულში, გაუარ-დილით, აგზებისას, სუნებისგან, ხმაურისგან, მენსტრუაციის წინ;
*ბ) გაუმჯ-მუეცლებელ წოლისას, ნელი მოძრაობისგან, მშრალ ამინდში, გამონაყარის ღროს. გაუარ- მოსვენებულ მდგომარეობაში, გაბრაზებისას, ამინდის შეცვლისას, ოფლისგან, დეფეკაციის შემდეგ, შეაღამის შემდეგ;
გ) გაუმჯ-მოძრაობისგან, სიცივისგან, წყლულის გამწვავებისას. გაუარ-გაბრაზებისას, მზის ჩასელიდან ამოსვლამდე, ქარისგან, გამთარში, ამინდის უცაბედი შეცვლისას;
დ) გაუმჯ-ყურადღების გადართვისგან, ადგილობრივი სითბოსგან, ოფლიანობისგან. გაუარ- მკეთრი მოძრაობებისგან, ფიზიკური და გონებრივი დაძაბვისგან, დამკ, ხელოვნური განათებისგან;
ე) არა აქვს მოდალობები.

216. სიფილინუმის ძირითადი მოდალობები

- ა) გაუმჯ-მოსვენებულ მდგომარეობაში, ბაფტულში, სითბოში, გაუარ-დილით, აგზებისგან, სუნებისგან, ხმაურისგან, მენსტრუაციის წინ;

ბ) გაუმჯ-მუცელბეგ წოლისას, ნელი მოძრაობისგან, მშრალ ამინდში, გამონაყარის დროს. გაუარ- მოსცენებულ მდგომარეობაში, გაბრაზებისას, ამინდის შეცვლისგან, ოფლისგან, დეფეკციის შემდეგ, შეაღამის შემდეგ;
* გ) გაუმჯ-მოძრაობისგან, სიცივისგან, წყლელის გამწვავების დროს. გაუარ- გაბრაზებისას, მშის ჩასვლიდან ამოსვლამდე, ქარისგან, ბამთარში, ამინდის უცარი შეცვლისას;
დ) გაუმჯ- ჭურალების გადარიცისგან, ალგილობრივი სითბოსგან, ოფლიანთბისგან. გაუარ-მკვეთრი მოძრაობებისგან, ფიზიკური და გონებრივი დაძაბვისგან, დამე, ხელოვნური შუქისგან;
ე) არა აქვს მოდალობები.

217. ტუბერკულინის მირითადი მოდალობები;

ა) გაუმჯ- მოსცენებულ მდგომარეობაში, ბაფხულში, სითბოში, გაუარ- დილით, აგზებისგან, სუნებისგან, ხმაურისგან, მენსტრუაციის წინ;
ბ) გაუმჯ- მუცელბეგ წოლისას, ნელი მოძრაობისგან, მშრალ ამინდში, პათოლოგიური გამონაყოფებისა და გამონაყარის დროს. გაუარ- მოსცენებულ მდგომარეობაში, გაბრაზებისას, ამინდის შეცვლისას, ოფლისგან, დეფეკციის შემდეგ, შეაღამის შემდეგ;
გ) გაუმჯ-მოძრაობისგან, სიცივისგან, წყლელის გამწვავების დროს. გაუარ- გაბრაზებისას, მშის ჩასვლიდან ამოსვლამდე, ქარისგან, ბამთარში, კილური ტემპერატურებისგან;
* დ) გაუმჯ-ჭურალების გადარიცისგან, ალგილობრივი სითბოსგან, ოფლიანთბისგან. გაუარ-მკვეთრი მოძრაობებისგან, ფიზიკური და გონებრივი დაძაბვისგან, დამე, ხელოვნური განათებისგან;
ე) არა აქვს მოდალობები.

218. რა გავდენს ახდენის თრგანიზმშე ალოპათიური მედიკამენტები?

ა) იწვევს მხოლოდ თავის ტკიფილს;
ბ) იწვევს მხოლოდ გამონაყარის კანგე;
* გ) იწვევს წამლისმიერ დაავალებას და თრგუნავს მირითად დაავალებას;
დ) არ იწვევს არანაირ რეაქციას;
ე) დადებითად მოქმედებს თრგანიზმში.

219. რას ნიშნავს თრმაგი დაავალება ჰანემანის მიხედვით?

ა) ერთი აუცილებლად კოლიფი, მეორე-ქოლეცისტიფი;
ბ) ერთი აუცილებლად შეკრულობა, მეორე-ფალარათი;
* გ) გართულებული სხვა დაავალებით;
დ) შემდგომი დაავალების განმურნებელი;
ე) თრო დაავალება კურნავს ურთიერთის.

220. რა შემთხვევაში წარმოიშობა ახალი ხელოვნური დაავალება, რომელიც ამძიმებს აფალმყოფის მდგომარეობას ჰანემანის მიხედვით?

* ა) უვარვისი წამლების ხანგრძლივი ხმარებისგან;
ბ) პირველი დაავალების განკურნებისას;
გ) მეორე დაავალების განკურნებისას;
დ) სწორად შერჩეული პრეპარატის დროს;
ე) არასოდეს არ წარმოიშობა.

221. რა ადგილი უჭირავს ორ არამსგავს დაავალებას თრგანიზმში ჰანემანის მიხედვით?

ა) ძლიერი კურნავს სუსტს;
ბ) ასეთი არ შეიძლება იყოს;
* გ) ორგანიზმში თანაარსებობისას იყოფენ თრგანიზმს, თითოეული მათგანი განაგებს მისთვის დამახასიათებელ ნაწილს;
დ) სუსტი კურნავს ძლიერს;
ე) კურნავებ ერთმანეთს.

222. რა ემართება ძველ დაავალებას ახალი, მსგავსი უფრო ძლიერი დაავალების გაჩენის შემდეგ?

ა) კურნავებ ერთმანეთს;
ბ) არაფერი არ ემართება;
* გ) ძლიერი ორგუნავს სუსტს;
დ) სუსტი კურნავს ძლიერს;
ე) არასოდებ ერთმანეთის.

223. რა მიიჩნევა პომეოპათიაში სულიერი დაავალების საფუძვლად?

ა) გადატანილი ინფექცია;
ბ) არასწორი შკურნალობა;
გ) ჭარბად მიღებული ანგიბიოტიკები;
* დ) გადატანილი სტრესი;
ე) არასწორი კვება.

224. როგორ ვუმკურნალოთ სულიერ დაავალებას?

* ა) კონსტიტუციური პრეპარატით;

- ბ) მხოლოდ ქიმითპრეპარაციით;
- გ) მხოლოდ ფიზიკურაპიით;
- დ) მხოლოდ ანტისიფილისური პრეპარაციით;
- ე) მხოლოდ ანტიბიოტიკებით.

225. რას მიიჩნევს ჰანგმანი წამლის შერჩევისას ძირითად კრიტერიუმად?

- ა) დაბავალების განვითარების ხელშემწყობი პირობები;
- ბ) დაბავალების დაწყების მიზეზი და პირობები;
- გ) გენეტიკური განწყობა;
- *დ) არსებულ სიმპტომთა ერთობლივი სურათი;
- ე) სიმპტომი, რომელიც მოცემულ მომენტში ყველაზე უფრო აწესებს ავალმყოფს.

226. როგორ ხსნის ჰანგმანი პომეოპათიური განკურნების არსებობა?

- *ა) უფრო სუსტი დინამიური დამიანება სამუდამოდ ნაღვურდება ცოცხალ თრგანიზმში უფრო ძლიერის მიერ, თუ მათ შორის სრული მსგავსება აღინიშნება;
- ბ) პომეოპათიური წამალი ანგითარებს ცოცხალ თრგანიზმში ისეთ ხელოვნურ დაავალებას, რომელიც თრგუნაფს უკვე არსებულს;
- გ) პროცესი, რომელსაც იწვევს პომეოპათიური წამალი ცოცხალ თრგანიზმში იმდენად ძლიერია, რომ არ აძლევს ძველ დაავალებას საშუალების იზინოს თავი;
- დ) პომეოპათიური წამლის მოუწევდება ასესტებს გარედან შექრიც რეაქტიულ აგენტს;
- ე) პომეოპათიური წამლის მიერ გამოწვეული დინამიური პროცესები მით უფრო ეფექტურია, რაც უფრო განსხვავდება თვისონივად იმ პათოლოგიისაგან, რომელთან ბრძოლისათვისაც იქნა შევანილი წამალი თრგანიზმში.

227. რა ხდება, როცეა ჰანგმანი პომეოპათიური წამლისმიერი დაბავალება უფრო სუსტია თრგანიზმში არსებულ დაბავალებაზე, თუ მათ შორის მსგავსება არ არის?

- *ა) არსებული დაავალება არ აძლევს ახალს განვითარების საშუალებას;
- ბ) ახალი დაავალება აძლიერებს უკვე არსებულს;
- გ) ახალი დაავალება თრგუნაც უკვე არსებულის სიმპტომებს;
- დ) ახალი დაავალება განკურნაც ძველს.

228. რა ხდება, როცა ახალი პომეოპათიური წამლით გამოწვეული დაავალება უფრო ძლიერია, ვიდრე თრგანიზმში უკვე არსებული, თუკა არ არის დაცული მსგავსების პრინციპი?

- ა) ძველი დაავალება სრულად ინკურნება ახლით;
- ბ) ძველი დაავალება ნაწილობრივ ინკურნება ახლით;
- გ) თრგანიზმი არაანარიად არ რეაგირებს შეყვანილ წამლისმიერ დაავალებაზე;
- *დ) ძველი ითრგუნება მანამ, სანამ ახალი დაავალება არ გაივლის, მერე კი ისევ წამოყოფს თავს;
- ე) ახალი დაავალება სამუდამოდ აღმოფხვრის ძველს.

229. როგორია თრი მსგავსი დაავალების თანაარსებობის კანონი თრგანიზმში?

- ა) თრივე ვითარდება თავისი საკუთარი კანონების მიხედვით;
- *ბ) უფრო ძლიერი თრგუნაც მაგრამ არ კურნაც უფრო სუსტს;
- გ) სუსტი თანდათან ძლიერდება და კურნაც თავდაპირველად უფრო ძლიერს;
- დ) ებრძვიან ერთმანეთს და ხდება ხაწილობრივი განკურნება;
- ე) თრგუნავენ ერთმანეთს და ხდება თრგანიზმის სრული განკურნება.

230. რა ხდება, როცა თრგანიზმში ერთმანეთს ხდება თრი ურთიერთმსგავსი დაავალება?

- ა) თრგუნავენ ერთმანეთს;
- ბ) ართულებენ ერთმანეთის კლინიკურ სურათს;
- გ) თანაარსებობენ ერთ თრგანიზმში;
- *დ) ხდება განკურნება;
- ე) დროებით შეაჩერებენ ერთმანეთს.

231. რა შემთხვევაში შესაძლებელი თრი დაავალების თანაარსებობა?

- ა) თუ ეს დაავალებები ურთიერთმსგავსია;
- *ბ) თუ ეს დაავალებები არ არის ურთიერთმსგავსი;
- გ) თუ თრივე ქრონიკულია;
- დ) თუ ისინი არათანაბარი ძალისაა;
- ე) თუ თრივე არამიამზატურია.

232. რა მოსდევს ანტიპათიური წამლის შედეგად მიღებულ თავდაპირველ გაუმჯობესებას?

- *ა) გაუარასება;
- ბ) ხანძოებენ გაუარესება;
- გ) გამწვავება;
- დ) გამოჯანმრთელება;

ე) სიმპტომთა გაქრობა.

233. რა იგულისხმება მკურნალობის იზოპათიურ მეთოდში?

- ა) ანფიპათიური წამლით მკურნალობა;
- ბ) მსგავსების პრინციპით შერჩეული წამლით მკურნალობა;
- *გ) მკურნალობა იგუვე პათოგენური აგენტით, რამაც გამოიწვია აფალმყოფობა;
- დ) ჰომეოპათიისა და ძველი ინდური შეთოლების ერთობლიობა;
- ე) პათოლოგიური ქსოვილებისაგან დამზადებული წამლებით მკურნალობა.

234. რა ემართება დაავალების სიმპტომებს პალიატიური მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ?

- ა) სამუდამოდ ქრებიან;
- *ბ) განახლებიან ახალი ძალით;
- გ) სუსტდებიან;
- დ) ხან იზენებ თავს, ხან ქრებიან;
- ე) კანონმდებლობა არ არის ცნობილი.

235. რა სახით გამოიყენება ნივთიერება წამლის გამოცდის /პრუვინგის/ დროს?

- ა) სუბსტანციის სახით;
- ბ) ტოქსიური დოზებით;
- გ) ბუნებაში არსებული დაუმუშავებული სახით;
- დ) ალოპათიური წამლის სახით;
- *ე) ჰომეოპათიური წესით მომზადებული.

236. როგორ დაავალებებს უწოდებს ჰანემანი ცალმხნივს?

- *ა) რომელთაც აქვთ სულ 1 ან 2 ძირითადი სიმპტომი;
- ბ) ისეთს, რომელიც გათარღება მხოლოდ პათოლოგიისკენ და შეუქსევადია;
- გ) ისეთს, რომელსაც ახასიათებს ორგანიზმის გადაგვარება;
- დ) ისეთს, რომელიც აბიანებს მხოლოდ ცალ მხარეს;
- ე) ისეთს, რომელიც გამოწვეულია ქრონიკულ დაავალებაზე ინფექციის გედებით.

237. როგორ იქცევა ჰომეოპათი, როგა ხედავს, რომ მოცემულმა წამალმა ამოწურა თავისი შესაძლებლობები?

- ა) იწყებს ახალი წამლის ძებნის ყველა ძველი ჩივილის გათვალისწინებით;
- *ბ) არჩევს ახალ წამალს მოცემულ მომენტში არსებული სიმპტომების მიხედვით;
- გ) აძლევს ანტილოგს;
- დ) გადახედვებს ანამნეზს და იწყებს მკურნალობას თავიდან;
- ე) არაფერი აღარ უნდა მისცეს.

238. რას უწოდებს ჰანემანი აღვილობრივ დაავალებას?

- ა) შინაგან ორგანოში დესტრუქციულ პროცესებს;
- ბ) ყველა სომატურ გამოვლინებას;
- გ) ლოკალურ ტკივილებს;
- დ) ერთი, ყველაზე მეტად დაინტერესებული ორგანიზმის პათოლოგიას;
- *ე) პათოლოგიის გარეგან გამოვლინებებს.

239. რა ტაქტიკა დასაშვები ჰანემანის მიხედვით “აღვილობრივი დაავალების” სამკურნალოდ?

- ა) იმოპათიური მკურნალობა;
- ბ) მაღამოებით მკურნალობა;
- *გ) ჰომეოპათიური წამლის მიღება;
- დ) ჰომეოპათიური წამლის აღვილობრივი გამოყენება;
- ე) ალოპათიური მკურნალობა.

240. რა ემართება სომატურ სიმპტომებს ფსიქიური ან სულიერი სიმპტომების აღმოცენებისას?

- ა) ძლიერდება ფსიქიურის გაძლიერების პარალელურად;
- *ბ) სუსტდები;
- გ) უცვლელი რჩება;
- დ) არ არსებობს კანონმდებლობა;
- ე) გადადის სიმსივნურ პროცესში.

241. როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ წარმოიქმნა კონდილომები?

- ა) მოვწერ მეტვებით ან სხვა მეთოდით;
- ბ) მოვაცილოთ ქირურგიულად;
- გ) ვუმკურნალოთ ბალახეული საფენებით;
- *დ) დავნიშნოთ ჰომეოპათიური მკურნალობა;
- ე) ვუმკურნალოთ მაღამოებით.

242. როგორია პომეოპათის ტაქტიკა თუ პომეოპათიური წამლის მიღების შემდეგ წარმოიშვა კანის პრობლემები?

- ა) პორმონშემცველი მაღამოს დანიშვნა;
 - ბ) ბალაზეულისაგან დამზადებული მაღამოს დანიშვნა;
 - გ) იმუნოდემურესანგის დანიშვნა;
- *დ) მოცდა, სანამ თვითონ არ ჩატრება;
- ე) კანის პრობლემების მოსახსნელი პომეოპათიური წამლის დანიშვნა.

243. რა უნდა დაინიშნოს, თუ პომეოპათიური წამლის მიცემის შედეგად ტკიფილი ძალები გაძლიერდა?

- *ა) მივცეთ ტკიფილგამაყებულები;
 - ბ) მივცეთ სხვა პომეოპათიური წამლი;
 - გ) მივცეთ ანტიდოზი;
- დ) არ მივცეთ არაფერი;
- ე) დაფუნიშნოთ დიეტა.

244. როგორ შეფასდება პომეოპათიური მკურნალობის შედეგი, თუ გამონაყარის გაქრობასთან ერთად გაუარესდა ძილი?

- ა) როგორც კანის დაგვალების მორჩენა;
 - ბ) კარგი შედეგი;
- *გ) დაავალების გაღრმავება;
- დ) თვითგანკურნების მექანიზმების ჩართვა;
- ე) დადებითი დინამიკა.

245. როგორ შეფასდება მკურნალობის მიმდინარეობა თუ გაქრა სიკვდილის შიში, მაგრამ წარმოიშვა კანის ერითემა?

- *ა) ჰერინგის კანონის მიხედვით მკურნალობა სწორად მიღის;
 - ბ) ჰერინგის კანონის მიხედვით მკურნალობა არასწორად მიღის;
 - გ) საქმე გვაქვს გართულებასთან;
- დ) ადგილი აქვს გაუარესებას;
- ე) საწყისი დაგვალება პომეოპათიურ მკურნალობას არ ექვემდებარება.

246. როგორ შეფასდება სიტუაცია, როცა დეპრესია მოიხსნა, მაგრამ გაჩნდა გასტრიტის ნიშნები?

- ა) მკურნალობა არასწორი იყო;
 - ბ) საქმე გვაქვს გართულებასთან;
 - გ) ადგილი აქვს გაუარესებას;
- *დ) მკურნალობა სწორად მიღის;
- ე) დახვალება პომეოპათიურ მკურნალობას არ ექვემდებარება.

247. როგორ შეფასდება სიტუაცია, როცა მკურნალობის შედეგად გაქრა გამონაყარი, მაგრამ ცოტა ხანში გაჩნდა ქრონიკული ბრონქიტი?

- ა) არაკვითარი კავშირი ამ ორ სიმპტომს მორის არ არის;
- *ბ) საქმე გვაქვს “ანტიჰერინგთან” - ე.ო. დავთრგუნეთ დაგვალება;
- გ) მკურნალობა სწორი იყო;

 - დ) მკურნალობა არასაკმარისი იყო და უნდა გაგრძელდეს;
 - ე) ქრონიკული ბრონქიტი ხშირი გაცივების ბრალია.

248. რაში მდგომარეობს ჰერინგის კანონი?

- ა) მსგავსი ინკურნება მსგავსით;
- *ბ) დაავალება ინკურნება შიგნიდან გარეთ და ზევიდან ქვევით;
- გ) განკურნება იწყება გარედან, მიღის შიგნით;
- დ) განკურნება იწყება ქვევიდან და ადის ზევით;
- ე) განკურნება იწყება ცენტრიდან და მიღის ჰერიფერიებზე.

249. ვინ შეადგინა პირველი ყველაზე დიდი პომეოპათიური ცნობარი?

- ა) ჰანემანბა;
 - ბ) ბერიკემ;
 - გ) შარეტმა;
- *დ) კენტმა;
- ე) ფარინგოტონბა.

250. რომელია სწორი ტაქტიკა პომეოპათიური გადატანილი პაციენტის მკურნალობისას?

- ა) რამდენიმე წამლის მიცემა;
- ბ) ძველი კონსტიტუციური წამლის ძებნა;
- გ) ლოქალურ სიმპტომებზე ბემოქმედება;
- დ) ძველი მიაგმის გატაქიურება;
- *ე) ახალი კონსტიტუციური პრეპარატის შერჩევა.

251. როგორია მკურნალობის ტაქტიკა სიფილის გადატანილი პაციენტის მკურნალობისას?

- ა) სიფილიზმით მკურნალობა;
- ბ) ლოკალური სიმპტომების აღმოფხვრა;
- გ) ძველი მიამის გააქტიურება;
- დ) სომატური სიმპტომების მიხედვით წამლის შერჩევა;
- ე) ახალი კონსტიტუციური სიმპტომებით წამლის შერჩევა.

252. რას უნდა ველოდოთ ტებერკულობგადატანილი პაციენტისათვის ტებერკულინუმის დანიშვნის შემდეგ?

- * ა) ტებერკულობის გააქტიურებას;
- ბ) სრულ გამოჯანმრთელებას;
- გ) აღერგოულ რეაქციას;
- დ) ქრონიკულ რინიტს;
- ე) ფსიქიკის მოშლას.

253. როგორი ტაქტიკაა სწორი ქრონიკული დაავალებების მკურნალობის დროს?

- ა) რამდენიმე მონოპრეპარატის ერთდროულად მიცემა;
- * ბ) რამდენიმე მონოპრეპარატის თანმიმდევრობით მიცემა;
- გ) კომპლექსური პრეპარატის დანიშვნა;
- დ) ალოპათიასა და ჰომეოპათიის ერთდროული მიცემა;
- ე) ალოპათიური მკურნალობა.

254. მკურნალობის რომელი ტაქტიკაა სწორი დასუსტებული პაციენტის მკურნალობისას?

- ა) მაღალი პოტენციის კონსტიტუციური პრეპარატის დანიშვნა;
- ბ) საშუალო პოტენციის პრეპარატის დანიშვნა ხშირი მიღებებით;
- * გ) დაბალი პოტენციის პრეპარატის დანიშვნა პოტენციის შემდგომი მომატებით;
- დ) კომპლექსური პრეპარატის დანიშვნა;
- ე) ალოპათიური პრინციპით მკურნალობა.

255. მკურნალობის რომელი ტაქტიკაა სწორი ავთვისებიანი სიმსივნის მკურნალობისას?

- ა) მაღალი განჩავებების ხშირი მიცემა;
- ბ) მაღალი განჩავებების იშვიათი მიცემა;
- გ) საშუალო განჩავებების ხშირი მიცემა;
- * დ) დაბალი განჩავებების ხშირი მიცემა;
- ე) მიამიატური ნომილის დანიშვნა.

256. რომელი ტაქტიკაა სწორი მწვავე ჰომორეის მკურნალობისას?

- * ა) კონსტიტუციური საშუალებების შერჩევა;
- ბ) მედორინუმის მიცემა;
- გ) ქრონიკული მიამის სამკურნალოდ ნომილის შერჩევა;
- დ) ლოკალური სიმპტომის მკურნალობა;
- ე) მოცდა, სანამ ქრონიკულში გადავა.

257. რა შემთხვევაში გვაქვს “ანტიპერინგი”?

- ა) მოწესრიგდა ძილი, მაგრამ გაჩნდა ერითემა;
- ბ) გაიარა დეპრესიამ, მაგრამ გაჩნდა ბეჟსილი;
- * გ) გაქრა მეჭეჭები, მაგრამ იმატა აგრესიულობამ;
- დ) გაჩნდა სურდო, მაგრამ იყლო თავის ტყივილებმა;
- ე) გაჩნდა გამონაყარი, მაგრამ გაქრა ქოშინი.

258. რომელ შემთხვევაში მიღის პროცესი პერინგის კანონის მიხედვით?

- * ა) გაქრა ასთმური სუნთქვა, მაგრამ გაჩნდა გამონაყარი ხელებზე;
- ბ) პაციენტის ელვიძებოლად დამის სამ საათზე, ეხლა ელვიძება 5-ზე;
- გ) მორჩა ანგინა, მაგრამ გაჩნდა სიბნელის შიში;
- დ) აღრე არ უყვარდა მზე, ეხლა უნდა მზეზე ყოფნა;
- ე) არ უყვარდა მოძრაობა, ეხლა მოთხოვნილება აქვს ირბინოს.

259. რას ამბობს პანემანი წამლის ნაოდენობის შესახებ?

- * ა) დაუშვებელია ერთდროულად თუნდაც ორი ჰომეოპათიური წამლის დანიშვნა;
- ბ) უნდა მიეცეს ორი პრეპარატი ერთდროულად;
- გ) შეიძლება დაინიშნოს იმდენი წამალი, რამდენსაც ჩათვლით საჭიროდ;
- დ) განუსაზღვრელი რაოდენობით;
- ე) არა უმეტეს სამისა.

260. რომელ სფეროზე მოქმედებენ უფრო ძლიერად დაბალი პოტენციები?

- ა) ფსიქიკაზე;
- *ბ) ორგანოთა ქსოვილებზე;
- გ) საჭმლის მომნელებელ ტრაქტზე;
- ღ) ორგანოთა ფუნქციაზე;
- ჟ) სულიერ პროცესებზე.

261. რომელ სფეროზე მოქმედებენ უკეთ საშუალო პოტენციები?

- ა) ფსიქიკაზე;
- ბ) ორგანოთა ქსოვილებზე;
- გ) საჭმლის მომნელებელ ტრაქტზე;
- *ღ) ორგანოთა ფუნქციაზე;
- ჟ) სულიერ პროცესებზე.

262. რომელ სფეროზე მოქმედებენ უკეთ მაღალი პოტენციები?

- *ა) ფსიქიკაზე;
- ბ) ორგანოთა ქსოვილებზე;
- გ) საჭმლის მომნელებელ ტრაქტზე;
- ღ) ორგანოთა ფუნქციაზე;
- ჟ) სულიერ პროცესებზე.

263. რას უწოდა ჰანგმანმა პირველადი რეაქცია პომეოპათიური წამლის მიღებაზე?

- *ა) სასიცოცხლო ძალაზე წამლის ბემოქმედებას;
- ბ) სასიცოცხლო ძალის რეაგირებას წამალზე;
- გ) კანის მხრიდან რეაქციას წამალზე;
- ღ) ფსიქიკის მხრიდან პირველ რეაგირებას;
- ჟ) წამლის მიღების მერე ძილიანობის განვითარებას.

264. რას უწოდა ჰანგმანმა მეორადი რეაქცია?

- ა) სასიცოცხლო ძალაზე წამლის ბემოქმედებას;
- ბ) კანის მხრიდან რეაქციას წამალზე;
- *გ) წამალზე სასიცოცხლო ძალის რეაქციას;
- ღ) ფსიქიკური მხრიდან პირველ რეაგირებას;
- ჟ) წამლის მიღების მერე ძილიანობის განვითარებას.

265. რას იწვევს სასიცოცხლო ძალაში რამდენიმე პომეოპათიური წამლის ერთდროული მიცემა?

- ა) არანაირი რეაქცია არ არის სასიცოცხლო ძალის მხრიდან;
- ბ) რეაგირებს რიგრიგობით ყველა წამალზე;
- გ) ბოგზე რეაგირებს, ბოგზე არა;
- *ღ) მის დაბაბუნებას;
- ჟ) მის გაძლიერებას.

266. რა არის ძირითადი კრიტერიუმი პოტენციის შერჩევისას?

- ა) პაციენტის ასაკი;
- ბ) სიმპტომთა რაოდენობა;
- გ) სიმპტომთა სიმძაფრე;
- *ღ) სასიცოცხლო ძალის მდგომარეობა;
- ჟ) დაავალების ხნოვანება.

267. როგორ ხდება მეორედ წამლის მიცემა?

- ა) აუცილებლად მეორედება იგივე პოტენცია;
- ბ) აუცილებლად უნდა დაინიშნოს უფრო მაღალი პოტენცია;
- გ) აუცილებლად უნდა დაინიშნოს უფრო ღბბალი პოტენცია;
- ღ) არ აქვს მნიშვნელობა;
- *ჟ) გააჩნია მჯერნალობის მიმდინარეობას.

268. რაზე მეტყველებს დაავალების ძლიერი გამწვავება?

- ა) პოტენცია იყო საჭიროებები დაბალი;
- *ბ) წამლის რაოდენობა იყო დიდი;
- გ) წამალი იყო სწორად შერჩეული;
- ღ) წამლის მიღების დრო იყო არასწორად არჩეული;
- ჟ) პაციენტი არ ექვემდებარება პომეოპათიურ მეურნალობას.

269. რას ნიშნავს დაავალების მცირე გამწვავება?

- ა) წამალი არასწორად იყო შერჩეული;
*ბ) წამალი სწორად იყო შერჩეული;
გ) დაავადება ინკურაბელურია;
დ) მივიღეთ არასასურველი შედეგი;
ე) პაციენტი ბელმეტად მგრიმობიარე აღმოჩნდა.

270. რას ნიშნავს პომეოპათიაში კანის დაავადება?
- ა) პათოლოგიის ძირითადი ღორებადის ადგილი;
ბ) პრაქტიკულად არაფერს;
*გ) სერიოზული შინაგანი პროცესების გარეგან გამოვლინებას;
დ) მხოლოდ ღორებულ უმნიშვნელო სიმპტომს;
ე) წამლის არჩევის ძირითად ორიენტირს.

271. რაზე მიგვითითებს კონდილომები და კანის წანაბარღები?
- ა) ფებერკულომებურ მიაბმბებ;
*ბ) სიკოტურ მიაბმბებ;
გ) ღვიძლის ფუნქციის მოშლაბებ;
დ) ნივთიერებათა ცვლის მოშლაბებ;
ე) პანკრეასის ღისფუნქციაბებ.

272. რას ნიშნავს პომეოპათიაში სიტყვა კონსტიტუცია?
- *ა) პიროვნების თანადაყოლილ და შეძენილ ფსიქიურ და სომატურ თავისებურებებს;
ბ) ავადმყოფობის ობიექტურ და სუბიექტურ გამოვლინებათა ერთობლიობას;
გ) ავადმყოფის ფსიქოლოგიურ სერატს;
დ) გენეტიკურ განწყობას ამა თუ იმ დაავადებისადმი;
ე) ინდივიდის მიღრეებილებებს.

273. რას ნიშნავს სიტყვა დიათეზი?
- ა) კანის დაავადებას;
ბ) ალერგიულ მდგრმარეობას, რომელიც გამოიხატება კანის პათოლოგიაში;
*გ) ორგანოთა და სისტემათა მიღრეკილება დაავადებისადმი, რომელიც განსაზღვრავს მის მიმდინარეობას;
დ) დაავადების წინა პერიოდი;
ე) ბავშვის დაავადება, რომელიც გამოიხატება მის შენელებულ განვითარებაში.

274. რა იგულისხმება პომეოპათიურ გამწვავებაში?
- ა) ახალი სიმპტომის გაჩენა;
ბ) ჩივილების თვისცობრივი შეცვლა;
*გ) ძველი სიმპტომების წარმოჩენა;
დ) ჩივილების ლოკალიზაციის შეცვლა;
ე) ახალი დაავადების გაჩენა.

275. რა იგულისხმება წამლისმიერ გაუარესებაში?
- ა) ძველი სიმპტომების გააქტიურება;
ბ) დავიწყებული ჩივილების განახლება;
გ) ჩივილების ხასიათის შეცვლა;
*დ) ახალი ჩივილების გაჩენა;
ე) ჩივილების მოდალობათა შეცვლა.

276. როგორ იქცევა პომეოპათი წამლისმიერი გაუარესების შემთხვევაში?
- ა) იმეორებს იგივე დანიშნულებას;
ბ) ბრდის წამლის დობას;
გ) გადადის ალოპათიურ მკურნალობაზე;
დ) ნიშნავს დიეტას;
*ე) ეძებს უფრო ბუსტ წამალს.

277. რა შეიძლება იყოს წამლისმიერი გაუარესების მიზეზი?
- ა) სწორად შერჩეული წამლის ბელმეტი ღორბა;
*ბ) არასწორად შერჩეული წამლის ბელმეტი ღორბა;
გ) ორგანიზმის ბოგადი სისუსტე;
დ) ჭარბად მიღებული ქიმიური წამლები;
ე) არასწორი ცხოვრების წესი.

278. რა შეიძლება იყოს წამლის მიცემის შემდგომი ძლიერი გამწვავების მიზეზი?
- ა) ინტელექტუალური გადაღლა;

- ბ) არასწორად შერჩეული წამალი;
- * გ) სწორად შერჩეული გელმეტი ღოზბ;
- დ) ფიტიქური გადაღლა;
- ე) ამინდის უცაბელი ცვლილება.

279. რას ნიშნავს წამლის მიცემის შემდეგ გამონაყარის გაჩენა?

- ა) დაავალების პროგრესირებას;
- ბ) ალერგიულ რეაქციას ამ პრეპარატზე;
- გ) მდგომარეობის გაუარესებას;
- * დ) თვითგანტკურნების მექანიზმების გააქციურებას;
- ე) კანის დაავალებების წარმოქმნას.

280. ვის ეკუთვნის აზრი: პომეოპათია და ალოპათია უერასოდეს შეერწყმიან ერთმანეთს?

- ა) რეკვექს;
- * ბ) ჰიერანს;
- გ) კონტს;
- დ) ბერიკეს;
- ე) ვიტულკასს.

281. რა არის იტოპათია?

- ა) მსგავსის მსგავსით მკურნალობა;
- ბ) ალოპათიური მეთოდის შემადგენელი ნაწილია;
- * გ) ტოქსიური აგენტით მკურნალობა, რამაც გამოიწვია სიმპტომატიკა;
- დ) დაავალების საწინააღმდეგოთი მკურნალობა;
- ე) ტრადიციული მეთოდი.

282. რას თველის ჰანემანი ყველა დაავალების ძირითად რეალურ ფუნდამენტალურ მიზეზია?

- * ა) ფსორინულ მიაზმა;
- ბ) გადატანილ სტრესს;
- გ) ინფექციის შედეგებს;
- დ) ანგიბიოტიკებს;
- ე) წამლების ჭარბად მიღებას.

283. როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ წამლის მიღების შემდეგ ვხედავთ თანდათანობით გაუმჯობესებას?

- ა) მივცეთ ოგივე წამალი;
- ბ) მივცეთ სხვა წამალი;
- გ) დაგემატოთ ალოპათიური მკურნალობა;
- დ) მივცეთ სიმპტომატური წამალი;
- * ე) არ მივცეთ არაფერი.

284. როგორ იქცევა პომეოპათი, თუ წამლის მიღების შემდეგ ადგილი აქვს დაავალების გამწვავებას?

- ა) აძლევს ანტილოფს;
- ბ) გადაღის ალოპათიურ წამალზე;
- გ) აძლევს კომპლექსურ პომეოპათიურ წამალს;
- * დ) ელოდება რეაქციის ჩაწყნარებას;
- ე) იგივეს აძლევს.

285. რომელ მიაზმს ახასიათებს კონდილომა და კანზე სხვა წანაბარდები?

- ა) სიფილიზმის;
- ბ) ტუბერკულინურს;
- გ) კარცინოზებს;
- დ) ფსორულს;
- * ე) სიკოზებს.

286. რომელ მიაზმს ახასიათებს თევზის ფხის მსგავსი აქერცვლა?

- ა) კარცინოზინულს;
- ბ) ტუბერკულომურს;
- * გ) ფსორულს;
- დ) სიფილისერს;
- ე) სიკოზებს.

287. რომელი მიაზმი უვითარდება პაციენტს პონორეის გადატანის შემდეგ?

- * ა) სიკოზი;
- ბ) ტუბერკულომური;

- გ) სიფილინური;
- დ) კარცინოზინური;
- ე) ფსორული.

288. რომელი ნობთლია სიკოზური მიაშმისათვის “გასაღები” პრეპარატი?

- ა) თირეოიდინური;
- *ბ) მედორინური;
- გ) კარცინოზინური;
- დ) სიფილინური;
- ე) ტებერჯულინური.

289. რა ითვლება წამყვან ფსორულ პრეპარატიდ?

- ა) სტრამონური;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- *გ) სულფური;
- დ) მერკურ სოლუბილისი;
- ე) ლიკოპონიური.

290. რომელი პრეპარატი უნდა დაინიშნოს მკურნალობის დასაწყისში, როცა სახეზეა ფსორული მიაშმი?

- ა) სულფური;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) ფსორინური;
- *დ) კონსტიტუციური;
- ე) მედორინური.

291. რა იგულისხმება მცნებაში “სასიცოცხლო ძალა”?

- ა) ადამიანის ფიზიკური მომზადების დონე;
- ბ) ინდივიდის ხასიათის თავისებურებები;
- *გ) თანადაყოლილი ენერგეტიკული პოტენციალი;
- დ) კვების შედეგად გამომუშავებული ენერგია;
- ე) სპეციალური ვარჯიშებით მიღებული ძალა.

292. რომელ დონეებად ჰყოფს პომეოპათია ადამიანს?

- *ა) ფიზიკურ, მენტალურ, ემოციურ;
- ბ) ნერვულ, საჭმლის მომნელებელ, ფსიქიკურ, შარდ-სასქესო სისტემებად;
- გ) განიხილავს ორგანოების მიხედვით;
- დ) თავი, სხეული, კილურები;
- ე) თავი, გულმკერდი, მუცელი, ფსიქიკა.

293. რა მიზანს ისახავს პომეოპათია ნევრომების მკურნალობისას?

- ა) დამაწყნარებელი ეფექტი;
- *ბ) აღაპტაციის უნარის გაზრდა;
- გ) ნევრომის გამომწვევი მიზეზების მოცილება;
- დ) გადატანილი უსიამოვნებების დავიწყება;
- ე) მოგონებათა დათრგუნვა.

294. როგორ უნდა შეფასდეს წამლის მიღების შემდგომი რეაქცია, თუ ძირითადი სიმპტომები გაუარესდა, ხოლო საერთო მდგომარეობა გაუმჯობესდა?

- ა) როგორც გამწვავება;
- ბ) როგორც გაუარესება;
- *გ) კარგი შედეგი;
- დ) როგორც უიმედო შემთხვევა;
- ე) როგორც ექიმის შეცლომა.

295. რა შეფასება მიეცემა სიტუაციას, თუ წამლის მიღების შემდეგ პაციენტს მოემაგა სხვადასხვა სახის გამონადენები?

- ა) როგორც მკურნალობის გართულება;
- ბ) როგორც პომეოპათიური ინტენსივური;
- გ) კავშირში არ არის პომეოპათიურ მკურნალობასთან;
- *დ) როგორც დრენაჟირება სწორად შერჩეული წამლით;
- ე) როგორც თანდართული ინფექცია.

296. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც წამალი არასწორადაა შერჩეული?

- ა) არაფერი არ ხდება;
- ბ) პაციენტი კვლება;

- * გ) ხდება წამლის გამოცდა;
დ) პაციენტი უარს ამბობს მკურნალობის გაგრძელებაზე;
ე) მკურნალობა მაინც სწორად მიღის.

297. რა ხდება თუ დანიშნული წამლი ანგიპათიური აღმოჩნდა?

- ა) ორგანიზმი მასშე არ რეაგირებს;
ბ) ორგანიზმის რეაქცია სესტია;
გ) ორგანიზმი ახდენს ზედმეტად ძლიერ რეაგირებას;
* დ) ხდება გაუმჯობესება, რომელსაც მოჰყვება გაუარესება;
ე) ირლვევა პაციენტის ფსიქიკა.

298. რაგომ არ შეიძლება პანემინის ამრით ერთდროულად თრი ჰომეოპათიური წამლის მიცემა?

- ა) ისინი სულ არ იმოქმედებენ პაციენტზე;
ბ) ისინი ძალიან ძლიერად იმოქმედებენ პაციენტზე;
გ) ისინი ძნელად გამოიყვანება ორგანიზმიდან თირკმელების მიერ;
დ) ზედმეტად გადაიფინანსირება დაიძლება;
* ე) შეუძლებელია გათვალი მათი ურთიერთქმედება და ზემოქმედება პაციენტზე.

299. ვის ეკუთვნის ამრი :ერთ მიღებაზე ყოვლად დაუშვებელია თრი ჰომეოპარატის დანიშვნა?

- ა) კენტი;
* ბ) პანემანი;
გ) ბერიკე;
დ) ვიტულკასი;
ე) ჰერინგი.

300. როგორ ნიშნავს ექიმი პლერალისტი წამლებს?

- ა) ერთ წამალს სიმპტომთა შეჯერების მიხედვით;
* ბ) ნიშნავს რამდენიმე წამალს ერთდროულად ან თანმიმდევრობით;
გ) ნიშნავს ჰომეოპათიურ და ალთაპათიურ წამლებს ერთად;
დ) ნიშნავს ერთ მცენარეულ და ერთ მინერალურ საშუალებას;
ე) ნიშნავს ერთ მონოპრეპარატს და ერთ კომპლექსურს.

301. პაციენტი უჩივის მადის დაკარგვას, მუცელის ძლიერ შებერილობას ტენებმებითა და კელესმაგვარი ლორწოს გამოყოფით. გაელისრეგას ჭამაზე ფიქრის დროსაც კი. მოუღლონელი სისუსტის შეტევები ცივი თფლით შებლის არეში. სახე შეშუპებულია, სალივაცია გაძლიერებული. პაციენტი მცირანა. მდგომარეობა უმჯობესდება მოსუენებულ მდგომარეობაში, სითბოში. ძილში ხშირი წამოხტომა.

- * ა) კოლხიკემი
ბ) არსენიკუმ ალბუმ
გ) კერატინუმ ვირიდე
დ) სეინა

302. პაციენტი უჩივის ტეხვადი ხასიათის ტკივილებს კიდევრების არეში თბილ ამინდში, და ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილებს – ცივ ამინდში. ტკივილი მარცხენა მუხლში ძლიერდება ცივი ნესტის, შეხებისა და მოძრაობისგან. სისუსტე და გამოფიტვა დამის სამუშაოსა და უძილობისგან. ძლიერი ზიზვი საკვების მიმართ. ენაზე – ყავისფერი ნადები.

- ა) ბრიონია
* ბ) კოლხიკემი
გ) ნექს ვომიკა
დ) კოკულესი

303. პაციენტი უჩივის უმაღლემას, ზიზვს საკვების მიმართ. ყინულოვანი სიცივე კუჭისა და მუცელის არეში. პერიოდული ფადარათი ძლიერი ტენებმებითა და ლორწოს გამოყოფით. გაუარესება მოძრაობის, შეხებისას, გაუმჯობესება სითბოსგან, დახრისას. უეცარი სისუსტის შეტევები შებლზე ცივი თფლით. გაუმჯობესება დეფეკაციის შემდეგ. სალივცია გაძლიერებულია.

- ა) ვერატრუმ ვირიდე
ბ) ქინა
* გ) კოლხიკემი
დ) მერკურ სოლუბილისი
ე) კამფორა

304. პაციენტი უჩივის ტკივილსა და შეშუპების მუხლების არეში, მდგომარეობის გაუარესებას მოძრაობისას, სიცივისა და მცირედი შეხებისგანაც კი. ჯერ ტკივილი შეინიშნებოდა მარცხენა მუხლში, შემდეგ მარჯვენაშიც. ხშირი თავის ტკივილები, თუმცა ტკივილი ვრცელდება მარჯვნიდან მარცხნივ, ზოგჯერ კეფის არეში. სისტი, მოსუენენარი და ძალიან მცირანა პაციენტი. დიარეა ყოველ შემოღომაზე.

- * ა) კოლხიკემი
ბ) არსენიკუმ ალბუმ

გ) ნაცრიუმ სულფარიკუმ
დ) ქინა

305. 12 წლის გოგონა მოწყენილია, ხშირად ტირის მარტო გამოკვეთილი, თვლის, რომ მშობლები მისი ცუდი საქციელის გამო გაიყინება. ცუდად იტანს ტრანსპორტს. გულისრევა ღორის ხორცისა და ცხიმიანი საკვებისგან. წყურვილი არ აწებებს.

მდგომარეობის გაუმჯობესება მოძრაობის, სიარულისას, მაგრამ ვერ იტანს დია ჰაერს.

* ა) ციკლამენი

ბ) ჸელსატილა

გ) ნუქს მოშაგა

დ) აურუმი

306. სევდიანი, თავის თავში ჩაკეტილი პაციენტი ქალი უჩივის ზიზლს საკვების მიმართ მას შემდეგ რაც ცოტის შეჭამს. მეავე ბოყინი ყავის დალევის შემდეგ, სლოვინი ჭამის ღროს, დისპესია ღროს ხორცის ჭამის შემდეგ. გულისრევა ტრანსპორტით მგბავრობისას. მარცხენამხრივი თავის ტკივილი ნაპერწყლებით თვალების წინ. მდგომარეობის გაუარესება ჯდომისა და დგომის ღროს, გაუმჯობესება მოძრაობისას.

ა) ჸელსატილა

ბ) კოკელუსი

გ) იგნაცია

* დ) ციკლამენი

307. მტირალა, გაღიბიანებულ, თავის თავში ჩაკეტილი გოგონა უჩივის უხვ მენტეს შავი ნაფლეთებით. მდგომარეობა უმჯობესდება ციკლის ღროს. გახშირებული გულისცემა საღამოს. ცუდად იტანს ქონიანს, განსაკუთრებით ღორის ხორცებს. უყვარს მარტო ყოფნა, ვერ იტანს სუფთა ჰაერს.

ა) ჸელსატილა

ბ) კოკელუსი

გ) იგნაცია

* დ) ციკლამენი

308. პაციენტი ქალი უჩივის სურდოს სქელი გამონადენით, გემოსა და ყნოსვის დაკარგვას. ხშირ ცემინებას. პაციენტი ანემიურია, აწებებს თავის ტკივილი თვალების წინ ნაპერწყლების ციმციმით. წყურვილი არ აღინისნება. ვერ იტანს სუფთა ჰაერს.

* ა) ციკლამენი

ბ) ჸელსატილა

გ) არსენიკუმ ალბუმ

დ) ამონიუმ მურიატიკუმ

309. მოზარდი უჩივის მუდმის მოღიგინე ხველას, როგორც კი თავი ეხება ბალიშს. მკერდის შებოჭვის შეგრძნებას. პაციენტი მკერდს ხელით იჭერს. მუდმივი შემცირება. დაწოლითი თავის ტკივილი საფეთქლების არეში გულისრევით დილაბით. მდგომარეობა უარესდება წინ გადახრისა და სითბოსგან, უმჯობესდება მოძრაობისა და ცივი ჰაერისგან.

ა) ჰიოსციამუსი

* ბ) ღრომერა

გ) არსენიკუმ ალბუმ

დ) კაპტესი

მკურნალობა ნოზოლოგიის მიხედვით

310. შაკიე. პაციენტს, რომელიც გაუჩერებდივ დაპარაკობს, აწებებს თავის ტკივილი შებლის არეში და მარჯვენა თვალს გემოთ. ტკივილი ვრცელდება თხემშე, კეფაზე, საფეთქელში; ტკივილი იწყება მენსტრუაციის წინ ან მენსტრუაციის ღროს. მენსტრუაცია უხვი, რომელსაც თან სდევს ტკივილი საშვილოსნოში. გადაეცემა მუცელის არეში ერთი მხრიდან მეორე მხარეს. საერთო მდგომარეობა და გუნებაგზიწყობილება უმჯობესდება სუფთა ჰაერზე. გასინჯვისას აღენიშნება გულმკერდის 4,5 და 8 მაღვების ჰიპერ მგრძნობელობა. ანამნეზში არის რევმატიზმი;

ა) ლილიუმ ტიგრინუმ;

ბ) იგნაცია;

* გ) აქტეა რაცემობა;

დ) ალუმინია;

ე) სტაფიბგრია.

311. ბუასილი. ავადმყოფს აწებებს ძლიერი ტკივილი წელის და კუდესუნის არეში, რომელიც ვრცელდება ბარძაყბე. ტკივილი ძლიერდება მოხრის და სიარულის ღროს. აწებებს შეკრულობა, კეჭში გასცელის ღროს ძლიერდება ტკივილი გავა-წყლის არეში. ყაბბითა; გასინჯვით: გარეთა ჰემოროიდელი კვანძები მუქი წითელი ფერის, ძლიერი მტკიფეული ჸელსაციით, იშვიათად სისხლმდება. პირის ღრეული და ხახის ღორწივის შესივებული, მხერვალე. ყელის სიმპტომები ქრება, როცა მწვავდება სწორი ნაწლავის პრობლემები

ა) კოლოციანგი;

* ბ) ესკელუსი;

გ) იპეკაკუანა;

დ) ირისი;

ე) როლოდენდრონი.

312. დისტექსია.ავადმყოფს აწებებს ფადარათი, რომელიც აიძულებს ადგეს ლოგინიდან 200 - 1000 სი-მდე, ასევე ჭამის და სმის შემდეგ, კუჭმი გასვლის წინ მუკელში ისმის ხმაური, სტავა ქვედა მუსლის და ჭიათ არე. ეს ტკივილი გრძელდება კუჭმი გასვლის ღროსაც, განავალი მოყვითალოა, ხშირად ღორწოვანი, როგორც ჟელე, ხან სისხლიანი, ხან გამჭირვალე, ზოგჯერ ღორწოვანი გამოიყოფა დიდი რაოდენობით უკანა ტანიდან, რასაც ავადმყოფი ვერ ამჩნევს, რაც ძლიერ აწებებს ავადმყოფი თავს უკეთ გრძნობს ცივ ამინდში, მიუხსადავად იმისა რომ იაღერებში აქცის მუშაოვი სიცივის შეგრძნება, ცივი ტეროვები

ა) არსენიკუმ ალბ;

ბ) კალცი ფლუორიკა;

გ) კამფორა;

*დ) ალოე;

ე) ვერატრუმ ალბუმ.

313. ქორნიკული კოლოფი.ავადმყოფს აწებებს შეკრულობა კუჭმი გასვლის მოთხოვნილების გარეშე. განავალი მშრალია, მყარი, ბოგჯერ წვრილი, მაგრამ გამოიყოფა ძლიერი ჭინთვების შელეგად. აღნიშნება ტკივილი ხერხემლის არეში, ირადიაციით წლელიდნ ეკეფიში. ავადმყოფი გამხდარია, ძლიერ მშრალი კანით, გაუკულმართებული მაღის: უყვარს ნახშირის, მიხაკის, ყავის მარცვლების, მშრალი ჩაის ჭამა. აქცის ზიზღი კარტოფილის მიმართ. სუიციდლური ამრები ჩნდება უმიზებოდ;

ა) ფურქუსი;

ბ) ფისფორი;

გ) არსენიკი;

დ) მერკურიუს სოლუბილის;

*ე) ალუმინა.

314. ავადმყოფს აწებებს ტკივილი მუხლის არეში. ტკივილს აქცის მწველი ჩხვლეფითი ხასიათი. ტკივილი ძლიერდება სითბოში, მოძრაობის შემდეგ 1600 - 1800 სი-მდე და უმჯობესდება ცივი აპლიკაციებით. გასინჯვით კანი შეშეუძლებულია, ვარდისფერი, შეხებით მხერვალე, ძლიერ მგრძნობიარე შეხებაბებე;

ა) რუს ტოქსიკოლენდრონი;

*ბ) აპისი;

გ) კამფორა;

დ) ბარიტა კარბონიკა;

ე) აცილეუმ ბენზოიკემი.

315. ნერვული ფადარათი.ავადმყოფს აწებებს ტკივილი ყელის არეში - თითქოს ყელში აქცის ხიწვი, თავის ტკივილი - თითქოს თავი გაუდიდდა და გაეზარდა. თავის ტკივილი ძლიერდება სიცხეში, შაქრის ან ტკბილეულის მიღების შემდეგ. ავადმყოფის მდგომარეობა უმჯობესდება სუფთა ჰაერშე, განსაკუთრებით როცხ სახეში ქარი ხვლება. ბუნებით ძლიერ ემთციურია, ჩქარი. აწებებს ფადარათი საპასუხისმგებლო საქმეზე წასვლის წინ. აღნიშნება: სიმაღლის, ბევრი ხალხის შიში, ეშინია, რომ სახლის კუთხე თავზე დაეცემა

*ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი;

ბ) ჰეპარ სულფურისი;

გ) გრაფიტი;

დ) არსენიკუმ ალბუმ;

ე) კალი კარბონიკი.

316. შარდის ბუშტის ანთება. ავადმყოფი უჩივის: მწველ ტკივილს შარდის ბუშტში, საწვეთურში, შარდსადენ მიღები, ხშირი შარდვის მოთხოვნილებას. შარდი გამოდის წვეთ-წვეთობით და იწვევს წვით ტკივილს. შარდის ანალიზში დიდი რაოდენობით ლეიკოციტებია;

ა) კარბო ვეგეტაბილისი;

*ბ) კანტარისი;

გ) იგნაცია;

დ) კამფორა;

ე) არსენიკი.

317. მენისტრუალური ტკივილი. პაციენტი უჩივის მტკიენეულ მენისტრუას. ტკივილს გონების დაკარგებამდე მიპყავს, რასაც წინ უსწრებს დებინება, შემცინება, ბოგჯერ ფადარათი. ამ ღროს ერთი ღორება წითელია. ძლიერი გაღიბიანება, ტირიდი.

მენისტრუაცია უხვია, მუქი ფერის კოლეგებით. დამით ძილის ღროს ფეხებს ყოფს საბნიდან, რადგან აწებებს სიმხურვალის შეგრძნება;

ა) ბრიონია;

ბ) კალცი კარბონიკი;

გ) ლიკოპოდიუმი;

*დ) ხამომილა;

ე) არსენიკი.

318. ქრონიკული ქოლეცისტიტი. ავადმყოფს აწებებს ძლიერი ტკივილი მარჯვენა ბეჭის ქვედა კუთხის არეში, გულისრევის

შეგრძნება, რომელიც უმჯობესდება ცხელი სასმელის მიღების შემდეგ. ყველა საგანი, ასევე საკუთარ სხეულს აქვს განაცლის სენი. დათვალიერებით: კანი ყვითელი ფერის, ენაზე მოყვითალო სქელი ნადები, ენა წითელი კილებით და კბილის ანაბეჭდებით.

- მარჯვენა ფეხი ცივია, მარცხენა ნორმალური
- * ა) ხელიდონიუმი;
 - ბ) ლაბების;
 - გ) ლიკოპოდიუმი;
 - დ) კონიუმი;
 - ე) სეპია.

319. ანგინა. ბავშვი 11 წლის ავად გახდა ცივ ჰაერზე გაოფლიანებულ მდგომარეობაში გასვლის შემდეგ. ავადმყოფობა განვითარდა უცებ საღამოს 1100 საათზე. აღნიშნებოდა ყელის სიმშრალე, ძლიერი ჩხვდეტითი ტკივილი მარჯვნივ ყლაპვის დროს, ტემპერატურის მომატება 390. ძლიერი თავის ტკივილი. ბავშვი აგზნებულია, ვერ იტანს სინათლეს, ხმაურს. შეხებას, მცირედ შერყევასაც კი. დათვალიერებით: სახე წითელია, თვალები ჩასისხლიანებულია, ხახა ალისფერი, ნუშურა ჯირკვლები გადიდებული;

- ა) აკონიფი;
- ბ) ბრიონია;
- * გ) ბელადონა;
- დ) კარბო ვეგეტაბილისი;
- ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმი.

320. ქოშინა. ავადმყოფი უზივის ძლიერ საერთო და გულის სისუსტეს, ქვედა კილერების ვენების შესივებას, მტკიცნეულობას და სიცივის შეგრძნებას. არ შეუძლია დრმა სუნთქვა, აქვს ქოშინი. მუცლის ბედა ნაწილში გამოწვეული ტკივილი. მეტეროიმი უარესდება წოლისას. დათვალიერებით: კანი ფერმკრთალია, მოლურჯო ელფერით, ცივი. კილურები ყინულივით ცივი. ცხვირი გაყინული

- ა) ჰელსატილა;
- ბ) ფოსფორი;
- * გ) კარბო ვეგეტაბილისი;
- დ) ქინა;
- ე) კალი კარბონიკა.

321. სახის ნერვის დამბლა. პაციენტი დიდხანს იყო მშრალ ცივ ქარში, რის შემდეგაც განუვითარდა მარჯვენამხრივი სახის ნერვის დამბლა მწვავე ტკივილით, მარჯვენა თვალის ფტომით. ერთი თვეთ ადრე ავადმყოფი აღნიშნავდა კისრის, კეფის და წელის კუნთების რიგილელობას, ხმის ჩახლეჩვას დილათით. ტკივილები სახის ნერვის ყველა განმტოვებაში, ძლიერი ინტენსივობისას, მწველი ხასიათის. ავადმყოფს გულთხი ახლოს მიაქვს გარშემო მყოფთა პრობლემები, უთანაგრძობას ყველას

- * ა) კაუსტიკუმი;
- ბ) რეს ტოქსი;
- გ) როლოდენდრონი;
- დ) დედკამარა;
- ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმი.

322. ყაბბობა. ავადმყოფი გარებრელად დაუძლეურებულია. მოყვითალო-ჭუჭყიანი სახის ფერით, მოუსვენარია, არ შეუძლია დამჭარ მდგომარეობაში კუჭმი გასვლა, რასაც უკეთ ახერხებს მხოლოდ დამდგარ მდგომარეობაში. შეკრულობა ფანქარივით წვრილი განხავლით

- * ა) კაუსტიკუმი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) კოფეა;
- დ) აციდებ ნიტრიკუმი;
- ე) კოლხიკუმი.

323. ასთენია. ავადმყოფს აწეხებს უხვი სისხლდენა საშვილოსნოდან, რომელიც გრძელდება 2-3 კვირა. პაციენტი ანემიურია, აქვს შეკრულობა თერმიც ხილის მიღების შემდეგ ეწყება უმტკივნეული ფალარათი, უხვი გამტებით. გარდა ამისა, უზივის პელიოდებად თავის ტკივილს, დამით თვლიანობას, თვლიანობას მცირე ფიტიკური დატერიტვის დროსაც. ავადმყოფი მგრძნობიარეა სიცივისა და ორბირი ქარის მიმართ. სახე ფერმკრთალი, მოყვითალი ელფერით, თვალები ჩაცვენილი

- ა) ჰელსატილა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) ალემენი;
- დ) გრაფიცი;
- ე) ხინა.

324. ასთენია. ავადმყოფი დიდი ხნის განმავლობაში უვლიდა ავადმყოფს, რის გამოც არ ეძინა. აწეხებს თავბრუსხვევა დოგინიდნ ადგომის დროს ან ბალიშიდნ თავის აწევის მცდელობისას. აღნიშნება გულისრევის შეგრძნება დებინების მოთხოვნილებით, განსაკუთრებით ტრანსპორტში მგბავრობისას, ზოგჯერ გულის წასვლა და საერთო სისუსტე

- ა) გრაფიცი;
- * ბ) კოკულერისი;

- გ) კოლოცინტი;
- დ) კუპრუმ მეტალიკუმი;
- ე) კალკარუმ კარბონიკა.

325. თავის ტკიფილი. ავადმყოფს აწუხებს უძილობა, ფიქრების, იღებების მობლავების გამო, ჩარჭობილი ლურსმნის მსგავსი თავის ტკიფილი მარცხენა წარის ბეჭით. შეგრძნება, თითქოს გვინი დაყოფილია ნაწილებად. აღენიშნება კბილის ტკიფილი რომელიც უჯრობესლება ცივი წყლის დაგუბებით ჰირში

- ა) ოპიტმიტი;
- *ბ) კოფეა;
- გ) სტაფიბაგრია;
- დ) მედეტია;
- ე) მანგანუმი.

326. რევმატიზმი. ავადმყოფს 5 წელია აწუხებს მარჯვენა ფეხის დიდი თითის უჩვეულო ტკიფილი. ბოლო ერთი წელია ტკიფილმა მიიღო მგლეჯავი ხასიათი როგორც წვრილ ასევე მსხვილ სახსრებში. სახსრები შესივებულია წვითი ხასიათის ტკიფილი. ანთირეტმატელი საშუალებები მდგომარეობას აუმჯობესებენ დროებით. სიმპტომები უარესება მზის ჩასვლიდნ მზის ამოსვლამდე. საჭმლის სუნი იწვევს გელისრევის შეგრძნებას. კუჭმი აქვს სიცივის შეგრძნება

- ა) ტუაბ;
- ბ) ბერბერისი;
- გ) სელფური;
- *დ) კოლხიკუმი;
- ე) გრაფიტი.

327. ბრონქიული ასომა. ავადმყოფს აწუხებს საპამური ასომური შეტევები, რომლებსაც თან სდევს კრუნჩხვები. ამ დროს ხელის დიდი თითი მუშტშია მოქცეული. შეტევების აქტს პერიოდული ხასიათი. ავადმყოფი გრძნობს საერთო სისუსტეს მთელ სხეულში და თავზე ცივი წყლის დასხმის შეგრძნებას. ავადმყოფობას შემინებას უკავშირებს;

- ა) იპეკაკუანა;
- *ბ) კუპრუმ მეტალიკუმი;
- გ) ფერუმ ფოსფორიკუმ;
- დ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- ე) ბრომი.

328. ათეროსკლეროზი. ავადმყოფს აღენიშნება არტ. წნევის მომაფება, თავის ტკიფილი, ყურებში შეილი, მეხსიერების დაქვეითება. ძლიერ მგრძნობარეა სიცივისაღმი, ტემპერატურის მცირედი დაწევაც კა იწვევს ხველებს, სურდოს და უფრო ხშირად ანგინას. კუჭმი შეკრულია, სახეზე აქტს აბლაბულის შეგრძნება. გასინჯვით კისრის და კეფის ჯირკვლები გადიდებულია და გამკვრივებული;

- ა) ხამომიღადა;
- *ბ) ბარიტა კარბონიკა;
- გ) ფერუმ ფოსფორიკა;
- დ) სელფური;
- ე) კაფსიკუმ.

329. თავის ტკიფილი. სკოლის მოსწავლე უჩივის თავის ტკიფილს გონების გადაძაბვის დროს. ბიჭი ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გაიზარდა. მცივნაა (განსაკუთრებით კილურები) ხშირად აწუხებს დაბუქების და ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება კილურებში. ანამნეზში აღინიშნება მცენის მოფეხილობა, ძნელი შეხორცებით. უყვარს შებოლილი ხორცი და ტებილეული;

- ა) სელფური;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- *გ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- დ) ხამომიღადა;
- ე) სანგვინორია.

330. ტრავმა. ავადმყოფი უჩივის ტკიფილს კუდესუნის არეში ირალირებით გემოთ ხერხემალში და ქვემოთ კილურების გასწვრივ. ტკიფილი ძლიერდება სიცივით, ხესტით, შეხებით. გაუმჯობესება თავის უკან გადაწევის დროს. ანამნეზში - კუდესუნის ტრავმა მიღებული დაცემის შედეგიდ.

- ა) იპეკაკუანა;
- ბ) კობალტი;
- გ) ნექს მოშაგდა;
- *დ) ჰიპერიკუმი;
- ე) ჰელსატილა.

331. ასთენია. ავადმყოფი უჩივის ხმის ჩახლეჩვას, მშრალ ხველას, გულმკერდში სისუსტის შეგრძნებას ლაპარაკის დროს, უხვ თფლიანობის დამით. შეკითხვებშე პაციენტის დაგვიანებით: უჭირს აბრების მოკრება და საჭირო სიტყვების მოძებნა. ღრმილები ფაშარია, სისხლმდენი. ავადმყოფობას უკავშირებს ხანგრძლივ დაფარულ დარღს;

- *ა) ცცილუმ ფოსფორიკუმი;

- ბ) აკონიტი;
- გ) იოდი;
- დ) ამბრა გრიზეა;
- ე) ფოსფორი.

332. მაღალი სიცხე. ავალმყოფს აქვს მაღალი სიცხე ძლიერი სიკვდილის შიშით, რომელიც უცებ ეწყება, შფოთავს და მოუსვენაროს. საერთოდ არ შეუძლია ხალხმრავალ აღგილებში ყოფნა, გადასასვლელებზე გადასცლა. შიში მატელობს დამით 1200 სთ. განსაკუთრებით ლოგიოში წოლისას. დაწმუნებულია რომ ჩქრია მოკვდება, სიკვდილის დროს ასახელებს.

ავალმყოფბას უპავშირებს ცივ ქარში ყოფნას;

- ა) გელტემინი;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- * გ) აკონიტი;
- დ) ლრომერა;
- ე) ბელადონა.

333. სახის ნერვის ანთება. ავალმყოფი უჩივის კუნთების ქაჩვის შეგრძნებას სახეში, თითქოს სახის ნერვის გაყოლებაზე ჩხვლეტებ ყინულოვანი ხემსებით. ავალმყოფი მოუსვენარია, ბევრს ლაპარაკობს, ბოგჯერ საუბრისას წაიმდერებს ხოლმე. მდგომარეობა უმჯობესდება ცივ ამინდში, ჭამის მერე და ჭექა-ჭეხილის წინ. წელის მაღებზე ბეწოლა იწვევს უნებლივ სიცილს

- * ა) აგარიკესი;
- ბ) აცილებ ფოსფორიკებ;
- გ) კოკულეს;
- დ) კოლოცინგი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

334. არითმია. ავალმყოფი უჩივის საერთო სისუსტეს გულმკერდის არეში, ქოშინს, უცაბედად წარმოქმნილ გულის გაჩერების შეგრძნებას, რომლის დროსაც ეშინია განძრევის. მტკივნეულობის დვიძლის არეში. ობიექტურად სახე შეშეპებულია, ციანიზერი, ქედა კიდურები შეშეპებულია. ჟელი ნელი, ინგერმიგირებული, სუსტი. გული ჰიპერტონიურებული, დვიძლი გადიდებული

- ა) კარდუს მარიანუსი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) ლრომერა;
- დ) ჰიპერიუმი;
- * ე) დიგიფალისი.

335. წყლელოვანი კოლიფი. პაციენტი უჩივის სისუსტეს, უხასიათობას, წვის შეგრძნებას ნებისმიერი ტკივილის დროს - თითქოს წიწაკით დაწეწვაო. ეწვის ენის წერი. განაგალი სისხლით და ლორწოთია საფსე. კუჭში გასულისას აწუხებს წვა, მის შემდეგ კი შემცირების გრძნება და წყურვილი. ალენიშნება წიწაკიანი და მასტიმულირებელი საკვების ძლიერი სურვილი, მიუხედავად იმისა, რომ აწუხებს გულმარვა

- * ა) კაფსიკები;
- ბ) ესკულეპი;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- ე) ნუქს ვომიკა.

336. ასთმური სინდრომი. პაციენტს აწუხებს ასთმური ხეელა უხვი ლორწოთი. ასთმური შეტევების განვითარებამდე აღენიშხებოდა ჭინჭრისმაგვარი გამონაყარი კანბე, რომელიც თაქს იხეს და ძლიერდება სიცივებზე. აღნიშხავს საინგერესო ფაქტს, რომ გამონაყარი ხესტში მონაცვლეობს ფარარათონ და პირიქით. ვერ იტანს ნესტიან ადგილებს

- ა) არსენიკებ;
- * ბ) დულკამარა;
- გ) იგნაცია;
- დ) აკონიტუმ;
- ე) გლონომინი.

337. კარდიონეცეპოზი. ავალმყოფი რიგი სტრესული მდგომარეობის შემდეგ: შეშინება, უცაბედი ნერვული სტრესი, აღნიშნავს ქედა კიდურებში კანკალს, სისუსტეს, ფეხების მოკეთის შეგრძნებას ნერვიულობის დროს. დამით იღიძებს შეგრძნებით თითქოს გული გაუხერდა თუ არ იმოძრავებას. აქვს შფოთვის შეგრძნება კიბეებზე ჩასვლის დროს. ობიექტურად: სახე წითელი, სახის გამომეტყველება გამოშტერებული, მეტყველება შენელებული;

- * ა) გელტემინუმ;
- ბ) აგნუს კაპტი;
- გ) კოკეს კაპტი;
- დ) გრაფიგი;
- ე) კაპტუსი.

338. ეგზემა. მსუქანი, მცივანა ქალი უჩივის ყერების უკან სველ გამონაყარს. მენსტრუაცია იშვიათი, მკრთალი, უხვი თეთრად შლა, თითქოს ნაკადად. ობიექტურად: ყურების უკან გამონაყარი სქელი ფუფხით, ადგილ-ადგილ კანი გამსკდარია, ნახეთქებიდან

გამოდის წებოვანი სითხე. ურჩხილები გასქელებული, ნახეთქებით. ავადმყოფი ძლიერ მორცხვია, სეღდიანი. დაბნეულია მეტყველების, წერის დროს;

- ა) დახების;
- ბ) სელფურ;
- გ) ფოსფორი;
- *დ) გრაფიტი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

339. ძლიერ გაღიაბიანებული მცირანა, მგრძნობიარე ავადმყოფი უჩივის მიღრეკილების დაზირქებისადმი. უჩირქება მცირე ჭრილობა, ნაკაწრიც კი. შეხორცება ხდება ხელა ხელა. წარმოქმნილი ჩირქი მწვანეა, ბლანტი. ოფლი უხვი, უსიამოვნო სუნით. უყვარს ცხარე საკვები, ალკოჰოლი, საქმაზები.

- *ა) ჰეპარ სელფური;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) იგნაცია;
- დ) ჰელსატილი;
- ე) აკონიფი;

340. ნეკროზი. ბავშვს აწესებს შეგევითი ხასიათის მშრალი ხელა, ყელში ფხაჭნის შეგრძნებით, რომელიც იწყება ლოგინში დაწოლისთანავე. ხელა აიძულებს წამოჯდეს, შეტევა მთავრდება ძლიერ თხიერი ნახველის ამოღებით. წყლის და საკვების მიღება ხველას აძლიერებს. დედა აღნიშნავს რომ ხელების დაწყებამდე ბავშვს ცედად ეძინა: ძიღის დროს აღნიშნებოდა კუნთების კრომა, ბოგჯერ წამოყვირება ძიღის. დედის თქმით ბავშვს ეშინია წყლის ხმაურის;

- ა) კოლოცინტი;
- ბ) ბარიტა იოდატა;
- გ) იპეკაკუანა;
- დ) სეპია;
- *ე) ჰიოსციამუსი.

341. ნეკროზი. შეა ხნის ქალს საყვარელი ქმრის დაკარგვის შემდეგ დაეწყო შეერელობა, ტკივილი სწორ ნაწლავში, რაც უძრობესდება სიარულით. აღინიშნება ყურებში წკარუნის შეგრძნება, რომელიც მცირდება ხმაურისას. ჩქარი საუბრისა და საქმის კეთების დროს. ხასიათის მკეთრი ცვალებადობა, ბრაზდება ყველა წვრილმანჩე, რასაც თან სდევს სახეში სისხლის მოწოდება, შემდეგ იწყება ტირილი და ხნებშა, რასაც ავადმყოფი მაღავს გარშემომყოფიაგან. განმარტოვების სურვილი. არ უყვარს, როცა ვინვე თანაუგრძნობს;

- ა) ალუმენი;
- ბ) თბილები;
- გ) იოდი;
- *დ) იგნაცია;
- ე) ბარიტა კარბონიკა.

342. გასტრალგია. შეა ხნის ქალს აწესებს სააბმური ტკივილი კუჭის არეში, რომელიც ბოგჯერ ირადირებს წელში. ყელში ფხაჭნის შეგრძნება, რაც მცირდება ნერწყვის ჩაყლაპვისას. ტკივილი კუჭის არეში. დროებით უმცირდება მდგომარეობის შეცვლის შემდეგ. ტკივილის მიუხედავად მყარ საკვებს უკეთ იფასს, ვაღელე თხიერს. უყვარს წნილები. ვერ იფასს ყავას, რისგანაც გულა უჩქარდება და საგარეტის სენს. წარსულში მან დაკარგა საყვარელი ადამიანი;

- ა) აკონიფი;
- *ბ) იგნაცია;
- გ) სელფური;
- დ) ვინეა მინორ;
- ე) კოლოცინტი.

343. ტაქიკარდია. შავგვრემანი, გამხდარი, ძალიან მოუსვენარი, ცივი ბუნების ქალბატონი უჩივის ძლიერ აგზებადობის, ტაქიკარდიას, მუდმივი შიმშილის შეგრძნებას, უცაბედ ძლიერ გახდომას, დიდობობით ხშირ ცემინებას, მენსტრუაცია უხვი, ფერმკრიალი წყლისმაგვარი სისხლით, ყველა სიმპტომი უძრობესდება ჭამის ან რაიმე საქმით დაკავების შემდეგ. სახის კანი მოყვითალო, მშრალი, სარძევე ჯირკვლები ატროფირებული;

- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) კალკარი კარბონიკა;
- გ) ანტიმონიუმ კრუდე;
- *დ) იოდი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

344. დისპესია 8 წლ. ბავშვს აწესებს ხშირი დებინება, რომელსაც წინ უსწრებს გულისრევის შეგრძნება. გულისრევის თან სდევს სისუსტე, შემცივება, კანის მტკიფეულობა, ჰიპერსალივაცია, ბრაზდიკარდია. გულისრევა მეორდება დამკ, გულისრევის შეგრძნება აქცის მუდმივად დღეც და დამეც. ენა სუფთაა.

- *ა) იპეკაკუანა;
- ბ) ალიუმ ცეპა;
- გ) ვალერიანა;

- დ) თეა;
ე) კანტარის.

345. ყივანახველა 10 წლ. ბავშვი ავადაა ყივანახველით. ხელების დროს ბავშვი შემდება, (გამშლელი კუნთების სპაზმის გამო) იხრჩობა, ფერმკრიალდება, ლურჯდება, საბოლოოდ კრენსხვა სუსტდება და ადგილი აქვს დეინების დორწოთი, რაც ძღვომარეობას აუმჯობესებს. ბოგჯერ ადგილი აქვს ცხვირიდან სისხლდენას. ენა სუფთაა;

- ა) ურფია ურენს;
ბ) კალი ბიქრომი;
გ) სენეგა;
დ) ტეია;
* ე) იპეკაკუანა.

346. დისპექსია. პაციენტი უჩივის დებინებას წებოვანი გამჭირვალე ლორწოთი, წვის შეგრძნებას პირში, ყელში, საყლაპავ მილში და კუჭში, მჟავე გემოს პირში. პერიოდულად უჩივის ფადარათს, რის შემდეგაც უპანა ტანში აღნიშნავს ძლიერ წვას;

- * ა) ირის ვერბიკოლორ;
ბ) ლილიუმ ტიფრიზუმ;
გ) ნექს მოშაგა;
დ) ოპიუმ;
ე) პეტროლეუმ.

347. კუჭის წყლელი. პაციენტი უჩივის ტეივილს ეპიგასტრიუმის არეში, რომელიც ქრება ჭამის შემდეგ, მაგრამ სანაცვლოდ ეწყება ტკივილები ხან ერთ სახსარში, ხან მეორეში. პაციენტს ანამნეზში აქვს კუჭის პეპტიური წყლელი. ხშირად უჩივის ტკივილს შებლის არეში წარბებოთან. ტკივილის არე შეიძლება დაიფაროს თითოთ. პაციენტს აქვს „გეოგრაფიული ენა“ წითელი ფერის, მოყვითალო-მოყავისფრო სქელი ნადებით შეაში. ყველა სიმპტომი ძლიერდება ცხელ ამინდში, განსაკუთრებით ზაფხულში, დღით, ლუდის დალვის შემდეგ.

- ა) ურფია ურენს;
ბ) კანტარის;
* გ) კალი ბიქრომი;
დ) ალიუმ ცეპა;
ე) თეა.

348. ქრონიკული ბრონქიფი. მსუქანი, თეთრი პირისახის ქალი უჩივის ხველას წებოვანი, სქელი, წელვალი ნახველით, რომელსაც თან ახლავს ტკივილი გულმკერდის არეში ირადიციით მხრებში. გაუარესება აღინიშნება გახდისას, დილათით აღნიშნავს დაწოლის შეგრძნებას და ტკივილს ცხვირის ფუძეში, ბოგჯერ მომწვანო-მოყვითალო ფერის ჩირქოვანი გამონაღენი, ყნოსვის დაქვეითება, ენა გეოგრაფიული, წითელი, შეაში ყვითელი ნადებით;

- * ა) კალი ბიქრომიკა;
ბ) იპეკაკუანა;
გ) იგნაცია;
დ) ფოსფორი;
ე) სეპია.

349. ასთენია. პუბერტატული ასაკის ანემიური გოგონა უჩივის ძლიერ საერთო სისუსტეს; მენსტრუაცია არა აქვს. ბედა ქეთუთოები შემუპებული ტკივილი და სისუსტე წელის არეში; გულის ცემის შეგრძნება; თფლიანობა; პერიოდულად ჩხვლეჭითი ხასიათის ტკივილი კუნთებში. მდგომარეობა უარესდება დილის 3-4 საათზე.

- ა) სულფური;
ბ) ჰიოსციამუსი;
* გ) კალი კარბონიკა;
დ) ბელალონა;
ე) კოკუს კაპტი.

350. კლიმატები. კლიმატებირული ასაკის ნერვიული, აგჩნებადი, ეჭვიანი, მოლაპარაკე ქალი უჩივის ალებს გულისცემის შეგრძნებისთვის ერთად, ავალმყოფი ვერ იტანს მომდგარ საკედლოს და ქამარს. აქვს განსაკუთრებული სიმპტომი: ჩაძინებისას აღენიშნება ჰაერის უკმარისობა. ყველა სიმპტომი უმჯობესდება ციკლის აღდგენისას

- ა) ირის;
ბ) ბარიტა კარბონიკა;
* გ) ლახების;
დ) კოკულექს;
ე) ნექს მოშაგა.

351. ქოლეცისტიგი. 50 წლის მამაკაცი გამოიყერება გაცილებით ასაკონად, ვიწრო ჩავარდნილი გულმკერდითა და დიდი წამოწეული მუცლით. უჩივის ტკივილს მარჯვენა ფერდექეშა არეში, გამების დაგროვებას, განსაკუთრებით მუცლის ქვედა ნაწილში, ყერყურით და დაწოლის შეგრძნებით ქვემოთ. არ შეუძლია მტკიცნეულ მხარეს წოლა. მგლეჯავი ტკივილი ბერ კილურების სახსრებში, ჯერ მარჯვენა, შემდეგ მარცხენა მხარეს. მარჯვენა ფეხი შეხებით ცხელი, მარცხენა ცივი. პაციენტი გაღიზიანებულია. ყველა სიმპტომი უარესდება 1600-2000 სთ-მდე

- ა) სილიცება;
- ბ) ბრომი;
- * გ) ლიკოპინოუმ;
- დ) ვინეა მინორ;
- ე) ბელადონა.

352. წყლელოვანი კოლიფი. მოკესვენარი, მოძრავი, ჩქარი ავადმყოფი უჩივის წყლისებურ, სისხლიან ფადარათს გაუარესებით დამე, ძლიერ ოფლაინობას უსამთვნო სენით. პირი სავსე ქაფიანი ნერწყვით, უსიამოვნო სუნი პირიდან, ღრმილები შეშეპებული, გაფაშრებული, სისხლმდენი, ზოგჯერ ჩნდება აფები. ეხა გეოგრაფიული, დიდი ბომის, ძლიერ ეტევა პირში.

- ა) საბინა;
- ბ) აღუმინა;
- * გ) მერკეურ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) ბრიონია.

353. საშვილოსნოს პროდაფსი. ფერმ კრთალი სახის მქონე ანუმიური, მედანქოლიური ქალი ცხიმიანი, ფერისმჭამელებიანი კანით, უჩივის სიმძიმის და დაწოლის შეგრძენებას საშვილოსნოს არეში, ღოვინიდან ადგომისას ჯდება, რათა საშვილოსნო არ გამოვარდეს. ტკივილის შეგრძნება წელის არეში, უმჯობესდება მაგარზე და ბურგზე წოლისას. პაციენტი გაღიტიანებულია, მგირალა, ვერ იტანს დაწყნარებას. ინგროვერტი; უყვარს მღამე

- ა) სეპია;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) კალი ბიქრომი;
- * დ) ნაფრი მურიატიკა;
- ე) კოლოცინგი.

354. შაკიკანემიური, გამხდარი ქალი უჩივის თავის ტკივილებს, რომელიც ჩნდება დილით საწოლში. ტკივილი გადის მზის ჩასვლის შემდეგ. პერიოდულად უჩივის სიცივის შეგრძნებას გულის არეში, განსაკუთრებით გადაღლის შემდეგ. ეზიბდება პური და ცხიმიანი საჭმელი. უყვარს მარილი. ვერ წვება მარჯვენა მხარეს გულისცემის შეგრძნების გამო. ახასიათებს ცემინების შეტევები დილათით. განცდისას არ უყვარს დაწყნარება

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- * ბ) ნაფრი მურიატიკა;
- გ) ცინა;
- დ) სარსაპარილა;
- ე) ნუქს ვომიკა.

355. ქრონიკული კოლიფი. შავგვრემანი, გამხდარი, აგზებადი პაციენტი უჩივის ძლიერ მდრღნელი ხასიათის ტკივილს ანუსის არეში დეფეკაციის შემდეგ. შეკრულობას წინ უძღვის ლორწოიანი და მყრალი დიარეა. დათვალიერებისას აღნიშნება ნახეთქები ანუსის ირგვლივ და ტენის კუთხებში. ხელის გულები და ტერფები სველი, ოფლი მყრალი. შარდს აქვს მკვეთრი ცხენის შარდის მსგავსი სუნი. მდგრმბარეობა უმჯობესდება ტრანსპორტში მგბავრობისას.

- * ა) აცილეუმ ნიფრიკუმ;
- ბ) დიოსკორეა;
- გ) ხელილონიუმ;
- დ) მანცინელა;
- ე) პერია.

356. ტაქიარითმია. პაციენტი უჩივის თავბრუსხვევის პაროზე ყოფნისას. თავის ტკივილები პულსაციით, შეგრძნებით თითქოს სკლება. მსუბუქდება მოჭერით. ყნოსვა გამძაფრებული. ნებისმიერი ტკივილის ღრის სასტიკად ეძინება. ტაქიკარდია. გულის თრთოლვა, მოჭერის შეგრძნება, თითქოს ვიდაცამ წავლო ხელი გულში. ვერ იტანს ცივ ნესტიან ქარს

- * ა) ნუქს მოშატა;
- ბ) კამფორა;
- გ) დიგიტალისი;
- დ) გლოხომინი;
- ე) ნაია.

357. დისპექსია. მოკეთალო სახის კანის მქონე ბიზნესმენი უჩივის კუჭის შეკრულობას უშედეგო ჭინთვებით. ვერ იტანს ტბისაცმლის შემთხვერის გულმკერდის ირგვლივ. იღვიძებს დამის 300 -400სთ-ბე და 600სთ-მდე ვერ იძინებს. იღვიძებს უფრო დაღლილი, ვიღრე დაიძინა. განავალი მცირე რაოდენობით, დეფეკაციის შემდეგ რჩება დაუკმაყოფილებლობა. ეხა შელუსილი ძირთან. პაციენტი ძლიერ დაკავებულია სამუშაოთი, ეწევა ურეუქიმო ცხოვრებას, დიმიანდება წვრილმანების გამო

- ა) სეპია;
- ბ) გელბემიუმი;
- გ) სილიცე;
- * დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ლიკოპინოუმი.

358. აგონიური კოლიტი. შეშუპებული, წითელი, ცხელი სახის მქონე ხანდაზმული პაციენტი უჩივის შეკრულობას დეფეკაციის სერვილის გარეშე, ძლიერ ტკივილებს სწორ ნაწლავში. განავალი მრგვალი, მაგარი, მოშავო ფერის, ჩანს ანუსში და მაშინვე უკან ბრუნვება. ძლიერი ძილიანობა. ჩამინებისას სუნთქვა უზერდება, ესაჭიროება შენჯღრება რომ სუნთქვა აღდგეს
- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) სპონგია;
- * გ) ოპიუმი;
- დ) კლცი ფოსფორიკა;
- ე) იოდი.

359. ეგზემა. ნავთობის წარმოებაში მომუშავე პაციენტს აღენიშნება ეგზემა ყურის უკან, ხელის მფევნებსა და ტერფებზე. ხელებზე სისხლმდენი წარმონაქმნები და ნახეთქები, რომლებიც აღვილად ჩირქდება. გამწვავება აღნიშნება გამთარში, სინესტებზე,

ჰექა-ჸეხილის წინ და მის დროს, მანქანით მგბავრობისას, სულიერი მდელვარების დროს. ხანდახან უჩნდება შეგრძნება, თითქოს ლოგინში კიდევ ვიდაც წევს

- ა) ნუქს ვიზიკა;
- ბ) ლიკოპოლიუმ;

გ) ალუმინი;

* დ) პეტროლუმ;

ე) გრაფიტი.

360. ლიაბერი. მაღალი, კარგი აღნაგობის ახალგამრდა პაციენტი ფერმკრთალი გამჭირვალე კანით მეტად მგრძნობიარება გარეშე პირობების მიმართ: სინათლე, ხმაური, სუნები, შეხება, ჰექა-ჸეხილი. უჩივის წყურვილის შეგრძნებას, პირის სიმშრალეს, ტკივილის მარჯვენა ფერდებებში არეში, გონებრივი დაბაბების ლრთის თავის ტკივილს. ექოსკოპიაზე გამოვლინდა უკანა წილის ცხიმოვანი გადაფენება. სისხლში გამოვლინდა შაქრის დონის მომატება, უმნიშვნელო ჭრილობაც კი დღე ხნის განმავლობაში სისხლმდენის. წყურვილი მატულობს 1500 - 1800 სთ-მდე. შვებას გრძნობს ციფი სასმელის მიღების შემდეგ სანამ კუჭში გათბებოდეს, შემდეგ უკან ამოაქვს

ა) აცილუმ ხიფრიუმ;

ბ) არსენიუმ ალბუმ;

* გ) ფოსფორი;

დ) ბრიონია;

ე) აკონიტი.

361. რევმატიზმი. პაციენტი უჩივის ტკივილის მუხლის სახსრებში, განსაკუთრებით ამინდის ცვლილებისას, ცივ, ნესტიან ამინდში. სინესტე გავლენის ახლების ბოგად მდგრმარეობაზე, იწვევს თავის ტკივილის შეტევებს. ტკივილი პარალელურია: იგი გრძნობს წვას, განსაკუთრებით ტერფებზე, თუმცა მუხლები შეხებით ცივია. უკეთ გრძნობს თავს სიარელისას ან ცივ წყალში ფეხების ჩაწყობის დროს. კიდევ ერთი თავისებურება: მარჯვენა მუხლის ტკივილის დროს აწესებს მარჯვენა მხარი

ა) არსენიუმ ალბუმ;

ბ) ჰიოციამუს;

* გ) ლელუმ;

დ) ბრომი;

ე) ამბრა გრიზება.

362. ქრონიკული კოლიტი. ახალგამრდა ქალი, მეცნიერ-მუშაკი უჩივის პერიოდულ ფალარათიანობას: განავალი მრავალჯერადია, ლორწონიანი და აღისფერი სისხლით. დიაგნოზი: არასპეციფიური წყლულოვნი კოლიტი. დაავალდა საყვარელ ქმართან განშორების შემდეგ. მიღების დროს ნერვიულობს და ყელი ეფუნება წითელი ლაქებით. კითხვებზე პასუხობს თავშეავებულად. არ სჯერა მურნალობის, არ ენდობა ექიმს. აქეს ერთი თავისებურება: სითხეს უფრო ძნელად ყლაპავს, ვიღრე მყარ საკვებს;

ა) ვერატრუმ ვირილე;

ბ) კაკტუსი;

* გ) იგნაცია;

დ) ფოსფორი;

ე) ფარაქსაკუმი.

363. მასტიფი. ნამშობიარები ქალი მიღიდა ჰომეოპათთან დიაგნოზით: მწვავე მასტიფი. დათვალიერებით სარძევე ჯირკვლები გამაგრებულია, შესივებული და მტკივნეული. ავალმყოფი აღნიშნავს, რომ როდესაც ბაეშვი წოების ტემპის, ტკივილი კრუელლება მთელ სხეულში. ავალმყოფი გრძნობს მოძრაობის მოთხოვნილებას, მაგრამ იგი მდგომარეობას არ აუმჯობესებს. ავალმყოფის მდგომარეობა უარესდება დამით, სიცივისგან, ზეწოლით, უმჯობესდება დაწოლისას. მიღების დროს ავალმყოფი იკვნებდა ტუჩებს

ა) პლაგინა;

ბ) ბარიტა კარბონიკა;

* გ) ფიტოლაბგა;

დ) ტაბაკუმ;

ე) ესკულუს.

364. საკვერცხების ანთება. ახალგამრდა, თავდაჯერებული ქალი უჩივის კრუნჩხეით ტკივილს საკვერცხებში, რომელიც გადაღის გაბუჟების და სიცივის შეგრძნებაში. მენტესი უხვი, სისხლი მუქი ფერის კოლგებიანი. გასინჯვით აღნიშნება გარე

სასქესო ორგანიზაციის მომატებული მგრძნობელობა: ეერ იტანს შეხებას, გასინჯვისას უფითარდება ეაგინიშმი;

ა) სტაფიბარია;

ბ) ფუქუს;

* გ) პლატინა;

დ) ლიგიტანისა;

ე) ფერუმ მეტალიკუმ.

365. ქრონიკული კოლიტი. გამხდარი, ბოლმიანი აღგმნებული მოხუცი მამაკაცი უჩივის ძლიერ ტკივილს ჭიპის არეში, რომელიც ვრცელდება წლისში. ტკივილი ძლიერდება დამთი, იწყება ნელა და გარევეული პერიოდის შემდეგ ქრონიკული მეტალის განვითარებისას აგადმყოფს აქვს შეკრულობა სპაზმებით უქანა ტანში, განავალი შაგია, თხის კურკლს გაფს. პირის ღრუს დათვალიერებისას ღრმილებები აღენიშნება ცისფერი ხაზი. მუცელი შევარღნილია

ა) კუპრუმ მეტ;

ბ) მერკურ სოლუბილისი;

* გ) პლატინუმი;

დ) ფიტოლაკა;

ე) ფოსფორი.

366. ლისკესია. ავადმყოფს აწუხებს უცაბელი, უხვი, მყრალი დიარეა აღრე დილით, განსაკუთრებით თბილ დროს, ტკივილი ბეჭებს შორის და მარჯვენა ბეჭებს ქვეშ. გასინჯვით ღვიძლი გადიდებულია და მტკივნეული. შევბას გრძნობს მარჯვენა ფერდექვეშა არეში შეუბუქი მისავის დროს. აქვს კბილების კრაჭუნის სურვილი

* გ) პოლოფილუმი;

ბ) პლუმბუმი;

გ) ალუმინი;

დ) საბინა;

ე) თბილები.

367. ქრონიკული ბრონქიტი. ავადმყოფს აწუხებს გამაღიბიანებული, ფხაჭნითი, მშრალი უწყეტი ხეელა. ხეელა ძლიერდება ზეწლით, საუბრით და განსაკუთრებით ცივი ჰაერის შესუნთქვით. ავადმყოფი სულ ითბილავს თაგას, პირს იფარებს ცხვირსახოცით, მჭიდროდ ეხვევა სახვევში. პერიოლულად აღენიშნება ტკივილი მარცხენა ფილტვში მარცხენა დვრილის დონეზე.

ა) ალოკ;

* გ) რუმექს;

გ) იპეკაკუანა;

დ) ბრიონია;

ე) აპის.

368. მტკივნეული მენსტრუაცია. ახალგამრდა ქალს აწუხებს ნააღრევი, ძლიერ უხვი და ხანგრძლივი მენსტრუაცია. სისხლი თხიერია, ნაწილობრივ კოლეგბადიანი, მოღის პერიოდულად, მოძრაობისას მტკივნეულია. ტკივილი ვრცელდება გავიდან ბოქვენამდე. წვა შარლის ბუმბში. შარლი სისხლიანი. ტკივილი აქვს სწორ ნაწლავში სისაცსის შეგრძნებით. უარესადაა დაგვირთვების, სიცხის დროს, უკეთესადაა ცივ-სუფთა ჰაერში

ა) აცილებ ფლუორიკა;

ბ) იპეკაკუანა;

გ) ჰეპარ სულფურის;

* დ) საბინა;

ე) ალუმინია.

369. თავის ტკივილი. კლიმაქტერიულ ასაკში მყოფი ქალი უჩივის სიცხის მოწლობას, პერიოდულ თავის ტკივილს ყოველ მე-7 დღეს, იგი ძლიერდება და სუსტდება მზის მოძრაობისათან ერთად. ტკივილი იწყება კეფაში, ვრცელდება ბემოთკენ და ჩერდება თვალების, განსაკუთრებით მარჯვენა თვალის ბემოთ. ტკივილი სუსტდება სიბნელეში დაწლილია და ჩაბინების შემდეგ. წვის შეგრძნება ხელისა და ფეხის გულებში. ფეხებს ჰყოფს საბინა ქვეშიდან.

ა) სილიცეა;

ბ) ეტება;

* გ) სანგვინარია;

დ) არსენიკუმ ალბუმ;

ე) კალკარებ კარბონიკა.

370. განგრენა. მოხუცი ავადმყოფი მშრალი განგრენის დიაგნოზით. ქვედა კიდერები შეხებით ცივია, თუმცა დაფარებას ვერ იფანს. კიდერებში წვის შეგრძნება, გაუმჯობესება სიცივეზე მიუხედავად ცივი წვივებისა ავადმყოფი მუღმივად ილებს მათბე

ცივს, სველ ნაჟერს. გაუმჯობესებაა აგრეთვე, კიდერების გაჭიმვის დროს

ა) ფლორინუმი;

ბ) პლუმბუმი;

* გ) სეკალე კორნუტუმი;

დ) აცილებ ნიგრიკუმი;

ე) სანგვინარია.

371. დისმენორეა. შეახნის პაციენტი მურთალი, მიწისფერი ელექტრით, ცხვირსა და ლოკებზე დიდი ყვითელი ლაქებით, რომლებიც მოგვაგონებენ პეპელას. მელანქოლიური, მოწყენილი, აგზებადი, ყველაფრისალმი ინდეფერენციული, ფიქრობს მხოლოდ თავის აგადმყოფობაზე, საშეილოსნოდან სისხლდნა მუქი ფერის კოლეგიათ, რომელიც გრძელება 12 დღემდე. თავბრუსხვევა აქვს ლილით გადვიძებისას. ძილი წყვეტილი, პაციენტი იღვიძებს დადღილი. ენა თეთრი, კუჭის სიცარიელის შეგრძნება, რომელიც უმჯობესდება ჭამის შემდეგ. ვერ იტანს რძეს, რის გამოც ეწყება მეავე გულმარჯვა. მეცელი შებერილია, ღვიძლი მგრძნობიარე და გადადებულია. მიღრეკილება შეკრულობისაკენ. მოვაითალო თეთრად შლა წვითი ტკივილითა და ჭავილით საშოში

ა) აპის;

*ბ) სეპია;

გ) კალკარეა კარბონიკა;

დ) გელტემიუმ;

ე) ფოსფორი.

372. შაკიე. ავადმყოფი 8 დღის განმავლობაში უჩიოდა პულსის მარცხნა თვალბუდის ბემოთ. ტკივილი იწყებოდა ყოველ დღით მშის ამოსკვლასთან ერთად, ძლიერდებოდა 930 სთ-სთვის და მცირდებოდა მშის ჩასვლისას. ტკივილი ვრცელდებოდა თვალბუდეში, ძლიერდებოდა მცირე ხმაურბე და მოძრაობისას, მცირდებოდა თავის მაგრად მოჭერის დროს

ა) აპის;

ბ) ლიკოპოდიუმი;

გ) კრეოზოტი;

*დ) სპიგელია;

ე) ვერატრუმ ალბუმ.

373. ქორნიკული პროსტატიცია. პაციენტი სულ ჩქაროსს, გადიბიანებული და გულმავიწყია. შეკითხვებზე ნელა პასუხობს, დიდანს არჩევს შესაფერის სიტყვას. უჩივის მოშარდვის ხმირ მოთხოვნილებას დამე, შარდის ნაკადი სუსტია. შარდი მუქი ყვითელია. უსიამოვნო ამიაკის სუნით, ანამნეზში ცისტიტი, ნეფრიტი, პროსტატიტი. პაციენტის მდგომარეობა უარესდება დილით, სიცივისა და ნესტისაგან. უმჯობესდება საღამოს მუცელბე ან მოხროლ მდგომარეობაში წოლისას. ვერ იტანს კატებს, მაგრამ ძალიან უყვარს ძალდები. შეუძლია იწინასწარმეტყველოს მომავალი, მაგრამ მხოლოდ უსიამოვნი

ა) ციკლამები;

ბ) ჰელსატილა;

გ) სილიცეა;

დ) ფოსფორი;

*ე) მედორინი.

374. გამხდარი ბავშვი გაძლიერებული მაღით. თამაში ბევრ საქმეს იწყებს, მაგრამ არაფერი მიპყავს ბოლომდე. გაუწონასწორებელია, აღვილად გამოდის მწყობრიდან, მიღრეკილია უხეშობისკენ, ეშინია დიდი ცხოველების: ცხენების, ძროხების, ძაღლების და კატების. ქრონიკულ სურდის უხვი გამონალენით, ხშირი ცემინება და წვა ცხეირ-ხახის არეში. პაციენტის მდგომარეობა უარესდება თბილ თოხტში, თბილ, ნესტიან ამინდში, ამინდის გაფუჭების წინ. უყვარს ცხიმიანი საკვები, ღორის ხორცი. ხშირად ცივდება. სახლში მარტო დარჩნისას ყველაფერს ამზგრევს

ა) ეტება;

ბ) კალკარეა;

გ) სილიცეა;

*დ) ტებერკულიანი;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

375. ენერეზი. მცივანა ბავშვი უსიამოვნო სუნის ფეხის ოფლით. რბილი ხასიათის, დამთმობი, მშიშარა, სუვდიანი, მაგრამ ამავე ღროს ჯიუტი, ტირის მაშინ, როცა მს ალერსიანად ესაუბრებიან. საჭიროებს სიყვარულსა და მხარდაჭერას. შარდი დია ფერის ან წითელია, ზოგჯერ ყვითელი ნალექით

ა) ტებერკულიანი;

*ბ) სილიცეა;

გ) სულფური;

დ) ჰელსატილა;

ე) მაგნეზია ფოსფორიკა.

376. დისპექსია. ძებუმწოვარა ბავშვი ვერ იტანს რძეს. საჭმლის მიღების შემდეგ მაღვე ჩნდება ტკივილი მუცელია, ბავშვი ფირის, ცდილობს ფეხები მიიფანოს მუცელთან. განაგები უფრო ხშირად თხელია, ღორწოვანი, მომწვანი, ბავშვის ჭვირითის მსგავსი, მოგჯერ აღინიშნება დებინება. ამონადებინება მასას და ფეკალიებს აქვს მკვეთრი მეავე სუნი, ოფლიც კი მეგვება

*ა) მაგნეზია კარბონიკა;

ბ) ხელილონიუმი;

გ) რუს ფოქსი;

დ) არსენიკუმ ალბუმი;

ე) აპისი.

377. ეგზემა. პაციენტი უჩივის წითელ, ჭავილიან, მწველი ხასიათის გამონაყარს სახეზე წვრილი ჩირქგროვებით. კანი ცხიმიანია, აღენიშნება ბუნებრივი ნაპრალების ძლიერი სიწითლე, ჭავილი ძლიერდება დაბანის და სითბოს შემდეგ, განსაკუთრებით

საწოლში. უჩივის შეკრულობას, მაგრამ პერიოდულად დილის 500სთ-ზე აღვიძებს ფალარათი. პაციენტი მოუწესრიგებელია, უყვარს ფილოსოფიურ თემებზე საუბარი. ტერფებში სიცხის შეგრძნება, არ უყვარს ბანაობა

ა) არსენიკუმ ალბუმ;

*ბ) სულფური;

გ) კალკარეა კარბონიკა;

დ) ტუი;

ე) რუს ტოქსი.

378. კონდილომები. პაციენტი ცხიმიანი, მბრწყინავი სახით, ღრმა ნაოჭებით, განსაკუთრებით წარბებს შორის. წარბები კიდევებში ამოჭმულია. მთელ სხეულზე გაბნეულია მუქი ლაქები, კვანძები, მეჭვები. ოფლი მყრალია, განსაკუთრებით სასქესო ორგანოებზე, მაგრამ ოფლიანობა ძირითადად აღინიშნება სხეულის ღია ნაწილებზე. პაციენტს ხშირად უჩნდება გენიტალიებზე კონდილომები;

ა) ფოსფორი;

*ბ) ტუი;

გ) აცილებ ბენზიოკარბონიკუმ;

დ) ლიკოპორიუმ;

ე) რუს ტოქსი.

379. ფალარათი. პაციენტი ქალი უჩივის ფალარათს. დეფეკაციის წინ აღინიშნება დაუძლურება. განავალი ძალიან თხელია, ხშირი ძლიერი ტენიტებით, ცხელებით უკანა ტანი და ცივი ოფლით შებლის არეში. ამ დროს პაციენტი ისე სუსტდება, რომ შეიძლება გონებაც კი დაკარგოს. დაავალებას უკავშირებს შემინებას. პედის ძაფისებრი, ხელები - ცივი, წებოვანი;

ა) ალუმინა;

ბ) ალუმენი;

გ) ბრიონია;

*დ) ვერატრუმ ალბუმი;

ე) ჰლუმბუმი.

380. შარლის შეკავება. პაციენტი უჩივის ძალიან უცნაურ სიმპტომს: მას შეუძლია მოშარდვა მხოლოდ შემდეგ პოზიში: უნდა იჯდეს დაგავაკარებული ფეხებით საკენა შარლის ბერტის ლროსაც კი. მუდმივად ამორბავებს ფეხებს, ძლიერი კანკალი სხეულში. ვერ იგანს დაინის, უმნიშვნელო რაოდენობითაც კი. სისუსტე კუჭის არეში დილის 1100 სთ-ისთვის;

ა) კუპრუმ მეტალიკუმი;

ბ) ბელადონა;

გ) კალკარეა კარბონიკა;

დ) ბარიტ იოდატა;

*ე) ცინკუმ მეტალიკუმი.

381. ხევლა. ხანმესეული პაციენტი უჩივის საპატურ, მოხრჩობით ხევლას, განსაკუთრებით ძლიერდება დილის 4 00 სთ-ისთვის გელისრევით, ბოგჯერ დებინებით, უმჯობესდება ბოჟინის შემდეგ. ნახველის ამოღება გამნელებულია. ობიექტურად: სახე გამსდარი, თვალები ჩაცვენილი ლურჯი უპეებით, გაფართოებული ნესტოებით და ნესტოების აჩქანებული მოძრაობით, ტენის გალურჯებული, სახე მიწისფერი, ცივი, ოფლიანი. ხმაურიანი სუნთქვა, თითქოს ფილტვი რაღაცით არის დაფარული. ჟერიოლურებად პაციენტი ითიშება, ან ემართება ძილიანობა.

ა) კალიუმ კარბონიკუმი;

ბ) არსენიკუმ ალბუმი;

*გ) ანგიმონიუმ ტარტარიკუმი;

დ) სილიციუმ;

ე) კოკუს კაკტი.

382. ქრონიკული რინიფი. გოგონა 6 წლის 2 წლის ასაქში 2-ჯერ იავადმყოფა ბრონქიფით. წლინახევრის ასაკიდან აწუხებს მედიივი სურდო წყალწყალდა გამონადენით გემოსა და ენთსეის დაკარგვით, ცრემლდენითა და ცემინებით. გამონადენი თაგვიდან იყო წყლისმაგაბრი და უხვი, შემდეგ გახდა სქელი და მოყვითალო. საერთო მდგომარეობა უმჯობესდება სუფთა პარტი, უარესდება ხანგრძლივი მოძრაობის შემდეგ და ლოგინში. გოგონა ალერსიანია, კონგრესური, მხიარული, აგადმყოფობის დროს ხელება მტირალა და ითხოვს ხელში აყვანას.

ა) ალიუმ საფივი;

ბ) ბერბერიისი;

გ) აპოცინუმი;

დ) ბელადონა;

*ე) ჰულსატილა.

383. პიპერგონული დაავალება. პაციენტი - შუახნის აქტიური მამაკაცი, თანამდებობის პირი, გრძნობს დიდ პასუხისნებლობას ქვეშეგრძლომების წინაშე, სისხლსაცვეს წითელი სახით: უჩიოდა სისხლის მოწოდებას თავში არტერიული წნევის მომატებითა და აუტანელი თავის ტავივილით ღირებ. დაავალების პროცენტურასთან ერთად აქტივობა დაეცა, დაუმძიმდა ცუდი ხასიათი, ეჭვიანობა, თვითდაქნინება, სუსტიდალური ფიქრები. შეხსიერება დაუქვეითდა, სიცივისადმი მგრძნობიარე გახდა. გახდა რელიგიური;

ა) ფილინუმი;

- ბ) ბარიტგ კარბონიკა;
- გ) კალკარებ კარბონიკა;
- დ) გრაფიტი;
- *ე) აურუმ მეტალიკური;

384. თირეოფიქსიკომი. პაციენტი ქალი მშვიოვარე, უჩივის ტაქიკარდიას, პერიოდულად უსივდება ყბისქვეშა ლიმფური ჯირკვლები. ობიექტურად: პაციენტი გამხდარია მიუხედავად კარგი მაღისა. გამჭოლი მზერა, ექტოფალმი, ხელის თითების ტრემორი ხელების წინ გაწევის დროს, სარძევე ჯირკვლები მომჩვარებია, თითქო აფროფირებული. ავადმყოფი აწებებს უძილობა და ხშირად ფალარათი დილათბით. ფარისებრი ჯირკვლები გადიდებულია გასინჯვით, ჰკვრივი კონსისტენციის. თვითგრძნობა უმჯობესდება ჭამის შემდეგ, სიცივისგან და გართობის დროს;

- *ა) იოდი;
- ბ) კალკარებ კარბონიკა;
- გ) კალი კარბონიკა;
- დ) ბარიტგ კარბონიკა;
- ე) გრაფიტი.

385. ვენების ვარიკოზი. პაციენტი ქალი 60 წლის, დიგნოზი: მარცხენა წვივის ფლებიფი. უჩივის ტკივილს ვენების გასწვრივ. ობიექტურად: მარცხენა წვივის არეში ვენები ძალიან მგრძნობიარეა პალპაციის დროს, მოლურჯორისტითელი, ზოგჯერ ისამნისფერი. პაციენტი ვერ იტანს შემოჭერილ ტანსაცმელს ან სახვეებს, განსაკუთრებით კისრის არეში. ცივი პროცედურები აუმჯობესებს მდგომარეობას, თბილი - აუარესებს. ავადმყოფობა პროგრესირებს გაბაზტელბე. პაციენტი ბევრს ლაპარაკობს, ხეის ერთი თემიდან მეორები;

- *ა) ლახებისი;
- ბ) ნექს ვომიკა;
- გ) სეპია;
- დ) გრაფიტი;
- ე) ლოკოპოლიუმი.

386. ქრონიკული ბრონქიტი. პაციენტი უჩივის მშრალ ხველას ჩხელეგითი ტკივილით გულმკერდის არეში, წყურვილს, ცხელებას - ამავე დროს სვამის იშვიათად, მაგრამ უხვად. გაუარესება უმცირესი მოძრაობის, ღრმად შესუნთქვის, საუბრის შემდეგ. გაუმჯობესება მოსვეებულ მდგომარეობაში 2100 სთ-ტე, გულმკერდის ფიქსაციის დროს, ხველებისას. ხველა ჩნდება მშრალი, ცივი ჰაერის ბემოქმედებით, მაგრამ ძლიერდება თბილ შენობაში შესვლის შემდეგ;

- *ა) ბრიონია;
- ბ) დულკამარა;
- გ) სილიცებ;
- დ) არსები კუმ ალბუმ;
- ე) რუს ტოქსი.

387. ბრონქიული ასთმა. პაციენტი ქალი. ასთმა დაიწყო აცრის შემდეგ. ხველა ხშირად დამე მწვანე ნახველის გამოყოფით, აქვს დაბვეღლებული ყველის გემო. ქიშინი, დიდი რაოდენობით ლორწო. შეგრძნება თითქოს ფილტვები ფართოვდება, რომ ფილტვის ქვედა ნაწილში ეცემა წვეთება, თითქოს ქვედა ნეკნების ქვეშ რაღაც იმრდება, ზოგჯერ რაღაც მოძრაობს მუცელში. შეტევის შემდეგ უხვა, წებოვანი ოფლი. მდგომარეობა უმრესდება ნესტიან, ცივ ამინდში. სახე ფერმკოთალი, ნაოჭებიანი, ცხიმიანი. კანგე მეჭქები, წარბები მოკლეა, თვალის უპეები შეშუპებული

- ა) კალი კარბონიკა;
- ბ) ბრიონია;
- გ) ფოსფორი;
- *დ) ტუია;
- ე) ალუმენი.

388. ეგზემა. უკიდურესად მცირანა პაციენტი ჭეჭყიანი კანით სხეულის უსიამოვნო სუნით. მიუხედავად ხშირი დაბანისა, იგი არ გამოიყერება სუფთად და მიუხედავად თბილი ტანსაცმლისა - ვერ თბება, ეშინია მომავლის, სევდიანია, მშიშარა, არ აქვს საკეთარი თაფის იმედი. უჩივის ჭავილს სასმენი მიღის არეში. ყურებიდან გამონადენი მოყვავისფრთ-ყვითელი, ჩირქოვანი, სუნითი, აღიზიანებს კანს. თბიექტურად: მარცხენა ყურის უკან აღნიშნება სველი ეგზემა სუნითი გამონადენით და ქერქების წარმოქმნის ტენდენციით. ქერქები მულმივად ავსებენ ყურის ნიჟარას;

- ა) სულფურ;
- *ბ) ფსორინუმ;
- გ) პელსაცილბ;
- დ) სანგვინარია;
- ე) ხამომილა.

389. ეგზემა. პაციენტი უჩივის ეგზემას ძლიერი ქავილით. ქავილი ძლიერდება ლოგინში და ცხელი აბაზანის მიღების შემდეგ. უჩივის აგრეთვე, მოუსვენარ ძილს, სძინავს მარცხენა გვერდზე და იღვიძებს ყოველ 200 სთ-ში ერთხელ. ეს განსაკუთრებით კარგად სხანს შაბინ როცა პაციენტის ერთ-ერთი შეიღია არ არის სახლში. იგი ვერ იძინებს მანამ, სანამ შეიღები სახლში არ დაბრუნდებიან. მუდმივად ჭყოფს ფეხებს საბნიდან ფეხების წვის გამო. აწებებს თაფის ტკივილი კვირის ბოლოს, განსაკუთრებით კვირა დღეს, ხანგრძლივი ძილის შემდეგ. აქვს ძლიერი ტემპერამენტი და ხშირად იყურება მუშტები;

ხორცი, ვერ იტანს სიცხვეს;

ა) რეს ტოქსი;

ბ) ფსორინუმი;

* გ) სულფურ;

დ) არსენიკუმ ალბუმ;

ე) კალკარეა კარბონიკა.

390. დისპექსია. გამხდარი, ანემიური პაციენტი ჩაღურჯებული უპეებით, უჩივის დფიდლისა და ელენთის არეში ტყივილის შეგრძნებას, კარგად ჩანს მთელი შეცლის შებერება, ყურ-ყური გამზები ცედი სუნით, ხშირი დეფეკაცია საკვების, განხავის განვითრებით ხილის მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ გადის კუჭში, განავალში მოუწელებელი საკვებია. ბოყინის ღროს ამოქარვებულ ჰაერს აქვთ ბოლოს მიღებული საკვების გემო, მეუავე ბოყინი რძის, ხილის, ჩაის შემდეგ. უკვარს სპირტიანი სასმელი, ტემპილეული, ცივი წყალი, ყავის მარცვლები. არ უკვარს ჸური, ღული, კარაქი, ხორცი, ცხიმიანი, თბილი საკვები. ძალიან დაღლილად გამოიყერება

ა) ალუმინი;

ბ) აცილემ ფლუორიკუმი;

გ) კალი ბიქრომი;

დ) ანგიმონიუმ ტარტ;

* ე) ხინა.

391. ავაღმყოფი უჩივის ძლიერ საერთო სისუსტეს, განსაკუთრებით გულმკერდის არეში. იმდენად ძლიერს, რომ მას უჭირს ლაპარაკი, ხველას, დაიდ რაოლენტობით ნაცრისფერი ნახველის გამოყოფით, რომელსაც მარილის გემო აქვთ. კაჭის არეში სისუსტისა და სიცარიელის შეგრძნებას, შეკრულობას: განავალი მაგარია, მშრალი, კვანძოვანი. მუცელი შებერილია, ტკივილი ჭიბის ირგვლივ სუსტდება დაწოლით;

* ა) სტანუმ;

ბ) ჰლუმბუმ;

გ) კალი კარბონიკა;

დ) სტაფიტაგრია;

ე) მერკერ სოლუბილის.

392. შიში. ბავშვის ეშინია სიბრუნვისა და მარტოობის, ითხოვს ხელი ჩასჭიდონ: შიში ძლიერდება წყლის ხმაურის ან მბრწყინვავი საგნების დანახვის ღროს. შიში გამნედი უეცარი შემინების შემდეგ და პროცეციულებული იყო უფროსი ძმის მიერ საშიში ისტორიების მოყოლით. ძილი მოუსვენარი, მოულოდნელი გამოლვიძებითა და წამოყვირებით. ბავშვი ჩივის რომ საშიში სახევები აშინებენ.

ა) ჰოდოფილუმი;

* ბ) სტრამონიუმი;

გ) კალი ბიქრომი;

დ) კაბტუსი;

ე) ბარიტ კარბონიკა.

393. ასტერიმულიათა. ფერმურთალ, გამოფიტულ პაციენტს აწესებს მრავლობითი, ჩირქოვანი ფისტულები სახისა და თავის / თმიანი ნაწილი / მარჯვენა ნახვარში. ანამნებში კბილი ექსტრაქცია ქვედ ყბის თსევომიერაფის გამო. შემდეგ მას გაუკეთეს ძვლის ნაწილის რეზექცია, მაგრამ მდეომარეობა მხოლოდ უმნიშვნელოდ გაუმჯობესდა. გამოიყოფა ჩირქი, ზოგჯერ სისხლნარევი. პაციენტის მდგომარეობა უარესდება სიცივებზე, ახალ და საკსე მთვარებზე, დილით და ციკლის ღროს. სითბო - აუმჯობესებდა მდგომარეობას. აღენიშნებოდა მთელი თავის თფლიანობა და ფეხების ცედ სუნიანი თფლი. ფრჩხილებზე დიდი რაოდენობით თეთრი ლაქა;

ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) ჰეპარ სულფურის;

* გ) სილიცეა;

დ) მერკერ დელცის;

ე) სტაფიტაგრია.

394. ჭიბით ინფარიდიდი მსუქანი აგბნებადი ბავშვი მუდმივად იქექება ცხვირში სახის დამახასიათებელი ტოკვით, თვალების ირგვლივ მოლურჯო რგოლები. უჩივის დებინებას და ჭავილს ანუსის არეში. ლაბორატორიული გამოკვლევით დაუდგინდა ჭიბის არსებობა. რომელი პრეპარატი ესაჭიროება ბავშვი?

ა) ანგიმონიუმ კრუდუმ;

ბ) არსენიკუმ ალბუმ;

* გ) ცინა;

დ) კალკარეა კარბონიკა;

ე) ფოსფორი.

395. წითელა 10 წლის მხიარული, მოძრავი გოგონა აფად გახდა ფეხების დასველების შემდეგ. უჩივის სურდოს ყვითელი სქელი გამონაღენით. ვერ გრძნობს სუნებს. გახდა ძლიერ მგირალა. ჩათბობა დროებით აწენარებს, თბილი საფენები არ სიამოვნებს. თხი დღის შემდეგ გამოაჩნდა წითელი გამონაყარი ცურებს უქან, რომელიც დღის განმავლობაში გავრცელდა სახესა და მეურღებელით თხოვს მოფერებას. ეშინია სიბრუნვის, მოთხში მარტო დარჩენის.

ა) სულფური;

- *ბ) პულსატილა;
- გ) სილიცეა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) კალი ბიქრომი.

396. პნევმონიაქალი ავად გახდა მშრალ ცივ ამინდში სიარულის შემდეგ. საღამოს 9.00 სთ-ზე დაეწყო ჩახეხვის გრძნობა ხახაში, მშრალი ხევლა, გაძნელებული, ხშირი სუნთქვა, ჩხვლეფა მარჯვენა გვერდში, რომელიც სუნთქვისას და მოძრაობისას ძლიერდება, უკეთ არის მოსუენებულ მდგომარეობაში. ანამნეზში ავალმყოფი აღნიშნავს შეკრულობას მშრალი ნახშირისებური განავლით. მუდმივად ითხოვს თბილ რძეს. აღენიშნება ძლიერი პირის სიმშრალე. უნდა მარტო დარჩენა. აუსკულტაცია მიგანიშნებს მარჯვენა ფილტრში ანთებით პროცესებს;

- ა) აპის;
- ბ) კერატრუმ ალბუმ;
- *გ) ბრიონია;
- დ) რუს ტოქსი;
- ე) კოკა.

397. გაცივება. ახალგაზრდა შავგვრემანი, აქტიური, სისხლსაჭესე ქალი ავად გახდა მშრალ, ცივ ქარში ყოფნის შემდეგ. შეადამისას აუწია სიცემ 380 -მდე, სახე წამოუწითლდა, ხოლო ლოგინიდან წამოდგომისას უფერმერთალდება. აწუხებს ძლიერი წეურვილი და კანის სიმშრალე. პაციენტს მიეცა ჰომეოპათიური პრეპარატი 3 მეათედ განზავებაში ყოველ წთ-ში 1 სთ-ის განმავლობაში. ამის შემდეგ მსა დაეწყო ძლიერი თვალიანობა და მდგომარეობა შეკეთრად გაუმჯობესდა სრულ გაჯანსაღებამდე. პრეპარატის მიღების აუცილებლობა მოიხსნა თვლის გამოსვლისთანავე. რომელი პრეპარატი მიეცა პაციენტს?

- ა) ბელადონა;
- *ბ) აკონიფი;
- გ) მერკერი;
- დ) აპისი;
- ე) გელბეგმინი.

398. გრავმა. პაციენტი მოხვდა ავტოკატასტროფიზი. უჩივის ჩხვლეფითი ხასიათის ტკიფილს გულის არეში ფიზიკური დატევირთვისას, უძილობას, სისხლაქცევებს კანზე. ლოგინი მაგარი ეზვენება. თავი ცხელი აქვს, ხოლო მთელი სხეული - ცივი. შეავვ საკვების მოთხოვნილება;

- *ა) არნიკა;
- ბ) აკონიფი;
- გ) კამფორა;
- დ) ბელადონა;
- ე) კარბო ვეგეფაბილის.

399. ბრონქიული ასთმა. 40 წლის მშუოთვარე, პედანტური, სამუშაოსგან გადაღლილი მამაკაცი უჩივის დამ-დამობით ასთმის შეტევებს, რაც უარესადება დამის 200 - 300 სთ-ზე, თან ახლავს სიკელილის ძლიერი შიში, მოუსვენრობა, წვის შეგრძნება ბეკრედში. ნახველი ქაფისებურია, წააგავს ათქვეფილ ცილას. ენა თეთრი ნაღებით, თითქოს შედებილია თეთრი საღებავით. გაუმჯობესება სუფთა ჰაერზე. რომელი პრეპარატი ესაჭიროება პაციენტს?

- ა) ბელადონა;
- ბ) იპეკაკუანა;
- გ) კალი ბიქრომი;
- დ) აკონიფი;
- *ე) არსენიკუმ ალბუმი.

400. კლიმატური სიმღრომი. კლიმატურული ასაკის ეჭვიანი, მშუოთვარე, ლაქლაქა ქალი უჩივის დისმენორეას შეხურებით სახის არეში, მარცხენა საკვერცხის ტკიფილს, ტკიფილს გულის არეში. გაუარესება დიღაობით. მარცხენა მხრივი თავის ტკიფილები უმჯობესდება კისრის მიღამოში გადასვლის შემდეგ. ყველა სახის სიმპოზი უმჯობესდება მენსტრუაციის დაწყების შემდეგ

- ა) ლიკოპოდიუმი;
- ბ) სეპია;
- *გ) ლახეგისი;
- დ) არსენიკუმ ალბუმი;
- ე) ნაია.

401. კარდიონეგრომი. ხანშიმესული ქალი უჩივის ტკიფილს გულის არეში: თითქოს უჭერენ რკინის მარწეხებით, სუნთქვის შებღუდვას, მარცხენა ხელის დაბუქების სიარულისას, გაუარესებას ბემოთ ასვლისას. უყვარს ბევრი წამლის მიღება. გაუარესება დიღის 1100 სთ-დან დამის 1100 სთ-მდე, გაუმჯობესება სუფთა ჰაერზე. ჩივილები დაკავშირებულია ნერვიულობისთან

- ა) ხინა;
- *ბ) კაპტუსი;
- გ) ხატრი შურიატი;
- დ) ცინა;
- ე) აპისი.

402. კუჭის წყლელი. მამაკაცი უჩივის ქრონიკულ ბრონქიტს, ხველებას სქელი, ბლანტი - მოყვითალო ნახველით. აქვს კუჭის წყლელი. დებინგბა ღორიშოთ, ნადველით, საკვებით. აღენიშნება დისპეფსია. ავალმყოფი პროფესიით მშენებელია, უყვარს ლუდი.

კუჭის ტკივილი ჩხელეტით ხასიათისაა

- * ა) კალი ბიქრიმი;
- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნუქს ვომიკა;
- დ) აპისი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

403. ქალი. აქვს ჩხელეტითი ხასიათის ტკივილი გულმკერდის მარჯვენა ნაწილში. აღენიშნება საერთო სისუსტე. აღვილად ცივდება, ადვილად ოფლიანობს. უშებდება ზედა ქუთუთოები, შეშეპებულია წარბებს შორის ადგილიც. მდგომარეობა უარესდება გამოხინისას 3.00 - 4.00 სთ-ბე. ავადმყოფი მგრძნობიარეა შეხებისადმი. აქვს მგრძნობიარე ტერფები და ვერ იტანს ბეჭრის შეხებასაც კი. ვერ იტანს წყალს, ვერ ინელებს ხორცს. ცუდად იტანს ცხელ ამინდს. ხშირად აქვს ტკივილები კულუსენში

ა) ბრიონია;

* ბ) კალი კარბონიკა;

გ) ხელიდონიუმი;

დ) აპისი;

ე) კოკა.

404. ვენების ვარიკოზული გაგანიერება. ფეხები უხურდება ისე, რომ საბნიდან უნდა გამოყოს. შეხებისას ცალი ფეხი ცხელი, მეორე გრილი. ვარიკოზულად გაგანიერებული ვენები. მიღრეკილია ყაბბობისკენ. ბუასილი. ფეხის ტერფები ოფლიბი, უსიამოვნო სუნით

ა) სეპია;

* ბ) ლიკოპოდიუმი;

გ) არსენიკუმი;

დ) სილიციუმი;

ე) აცილუმ სალიცილიკუმ.

405. მეტრორაგია. სუსტი პაციენტი ცივი კილურებით-გულისრევის შეგრძნება, რომელიც იწყება ჭამის დაწყებისთანავე, ხშირად შეადამისას. მენსტრუაცია უხვი, კოლფებიანი, წყალდწყალა. წყლება 2-3 დღით და შემდეგ ისევ იწყება. შეშეპებები სისხლის დიდი რაოდენობით დაკარგვის შემდეგ. თითოს დაჭრის შემდეგ კანზე რჩება ჩაღრმავება

* ა) ფერუმ მეტალიკუმ;

ბ) არინკა;

გ) სპონგია;

დ) სეპალი;

ე) მაგნეზია მურიატიკა.

406. დიაპერსია. პაციენტი უჩივის ხშირ დებინებას და ფალარას, თრივე შემთხვევაში მასებში გატენება გადაუმუშავებელი საჭმელი და ხშირად სისხლი. ანემია დამის თფლიანობით. ხშირი სისხლდენები ცხვირიდან. ეზიდვება რძე და ხორცი. ყველა ჩივილი უმჯობესდება ცივი კომპრესისგან. ჩივილები უარესდება დამის 4-6 სთ-ბე

* ა) ფერუმ ფოსფორიკუმ;

ბ) მაგნეზია მურიატიკა;

გ) ნუქს ვომიკა;

დ) ლილიუმ ტიგრინუმ;

ე) იპეკაკუანა.

407. ნევრალგია. პაციენტი უჩივის კუნთების კანკალს, რომელიც იწყება უცებ, ყოველგვარი მიზების გარეშე. სახის კუნთები უთორთის. სახის ნევრალგია შეგრძნებით, თითქოს ყინულოვანი ნემსებით ჩხელეტენ. ქავილი ტერფებსა და ფეხის თითქოში შეგრძნებით, თითქოს მოყინული აქვს

* ა) აგარიკუსი;

ბ) აპისი;

გ) ლელემი;

დ) სეპალი;

ე) ნუქს ვომიკა.

408. სტენკარლიდია. სუსტი პაციენტი, რომელიც ვერ იტანს გემს. მუდმივად აქვს გულისრევის შეგრძნება, თავბრუსხვევა, განსაკუთრებით ძლიერდება სიმაღლები ან კაბები ასვლისას და ბერთ ფერებისას, შეიძლება გონიც კი დაკარგოს. უკეთ ხდება ჰაერზე გასვლისას. აქვს ქოშინი, განსაკუთრებით მარცხენა მხარეზე წოლისას. ტაქიკარლიდი, ტერფები და ხელის მგევნები ყინულივით ცივი. გულმკერდში მოჭრის შეგრძნება ტკივილით ბეჭებს შორის. კილურების კანკალი;

* ა) ფაბაკუმი;

ბ) კაპტუსი;

გ) კოკა;

დ) ლახეზისი;

ე) ნაია.

409. მენსტრუალური ტკივილები. პაციენტი უჩივის ტკივილებს ციკლის დროს და მისი დამთავრების შემდეგ. სისხლი მოდის მხოლოდ წლის დროს. შარლება ჩვეულებრივ მდგომარეობაში პრაქტიკულად არ შეუძლია-უნდა დაწვეს. მენსტრუალური სისხლი უსიამოვნო სუნის, უხვის. პაციენტი ცუდად გრძნობს თავს სიცივეში, ჰაერზე, როცა უმოძრაოდაა, მენსტრუალური სისხლი

ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;

ბ) იგნაცია;

* გ) კრეოზიტუმ;

დ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;

ე) ლედუმი.

410. კუდუსუნის ტკივილი. ნერვიული სესტი ქალი გამჭოლი ტკივილით კუდუსუნში, რომელიც უცებ იწყება. ვერ იტანს საბის მიკარუბასაც კი. ახასიათებს დაირება მწვანე, ქაფიანი ფეკალური მასებით, რომელსაც მეავე სუნი აქვს. თან ახლავს ისეთი ტკივილი, რომელიც აიძულებს ორად მოიხაროს. პერიოდულობა სამი კვირა. მენსტრუაციის დროს სისხლი არ მოხდის სიარულისას

ა) კაუსტიკუმი;

* ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

გ) ცინკუმ მეტალიკუმი;

დ) კრეოზოტუმი;

ე) კოლოცინზი.

411. კარდიონევრობი. პაციენტი კლიმაქტერიული ასაკის ნერვიული ქალია, რომელსაც აქვს შეტევითი ხასიათის ტკივილები გულის არეში შეგრძნებით, თითქოს "გულს რკინის მარწუხით უჭერებ". ამავე დროს აქვს საშვილოსნის გამოვარდნა. პულსაცია მთელ სხეულში. ტაქიკარდია. ჩხვლეფა გულის არეში. შეგრძნება, რომ მუცლის ორგანოები დაწულია. მენსტრუალური სისხლი მოსდის მხოლოდ მოძრაობისას, უსიამოვნო სუნით

ა) სეპია;

ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

გ) იგნაცია;

* დ) ლილიუმ ტიგრინუმ;

ე) ნექს ვომიკა.

412. ცრუ კრუპი. ბავშვს აქვს სპაზმური ხველის ძლიერი პაროქსიმები, რომლებიც ძლიერდება წოლისას, აიძულებს წამოჯდეს. ლებინების სერვილი. ბავშვი გახდა ძალიან ეჭვიანი მას მერყ, რაც გაუჩნდა უმცროსი მმა

ა) ბელადონა;

* ბ) ჰიოსიციამ-ჟია;

გ) კეპრუმი;

დ) კოკეს კაპტო;

ე) კოკა.

413. ურეთრიტი. მამაკაცი უჩივის შარლის შეკავებას, მწვავე ტკივილებს ურეთრაში. ტკივილს შეხებისას. წვის შეგრძნებას შარლვისას, რომელიც შარლის ბეშტისკენ აღის. შარლი მოედინება ორ ნაკადად. ახასიათებს ხშირი თავგბრუსვევა უცნაური შეგრძნებით, თითქოს თავზე ეწვეთება წყლის წვეთები

* ა) კანაბის საგივა;

ბ) კალი კარბონიკა;

გ) კოკა;

დ) კონიუმი;

ე) კანტარისი.

414. გასტროენტეროკოლიტი. პაციენტი უჩივის წვის შეგრძნებას საჭმლის მომნელებელ მთელ ტრაქტში, პირში და ენაში ისეთი შეგრძნებით, თითქოს დაფუფქული ჰქონდეს. ლებინება მეავე, ნაღველშერეული მასით, ხანდახან სისხლნარევიც. ჰიპერსალივაცია. ლებინება მდგრადი ფალარათი მწვანე ფეკალური მასით. სისუსტე. ხშირი თავის ტკივილი, რომელსაც წინ უძღვის თვალწინ ბინდივით ლაქის გაჩენა

ა) იგნაცია;

ბ) იოდი;

გ) სეპია;

დ) კამფორა;

* ე) ირის ვერმიკოლორ.

415. ქალი დისპეპსიით. ჭამის შემდეგ შებერვა. იმულებულია შეიხსნას ქამარი. კუჭში ქვის შეგრძნება. ცხიმიანის გიბდი. მწარე გემო პირში. კუჭის მოქმედება არასოდეს არ არის ერთნაირი. მიღრეკილია ფალარათის კენ. არ აქვს წყურვილის გრძნობა.

ა) სეპია;

ბ) კარბო ვეგეტაბილისი;

* გ) პულსატილა;

დ) ნუქს ვომიკა;

ე) ფოსფორი.

416. შაკიეთ სააკის ქალი თავის ტკიფილებით, რომელთაც გონების დაქარგვამდე მიშყავს პაციენტი; თანდათან გასდის როგორც კი დაიწყებს მთქნარების; შეგრძნება, თითქოს ტყვიის ბურთი აქვს შებლში, თითქოს ტვინი იკუმშება; მენსტრუაციის დროს კბილების ტკიფილი, კბილები გაშავებული, აღვილად იფშვნება. უჩივის დილათით საწოლში ბურგის ტკიფილებს. თამბაქო და ალკოჰოლი აუარესებს მდგომარეობას

ა) სეპია;

ბ) ნუქს ვომიკა;

* გ) სგაფიტაგრია;

დ) აქტეა რაცემოზა;

ე) სილიცეა.

417. ქრონიკული რინიფი. ახალგამრდა ნაზი ქალი უჩივის ქრონიკულ რინიფს; ცხვირიდან მუდმივად სიდის; მციფანაა; ეშინია თრაპირი ქარისკაბირად ცივდება; ფეხები სულ გაყინული, მაგრამ ოფლიანი აქვს; ოფლი მყრაბლია; მცირე ჭრილობაც კი უჩირქდება

ა) ანაკარდიუმი;

ბ) ლილიუმ ტიგრინებ;

* გ) სილიცეა;

დ) იგნაცია;

ე) პლატინა.

418. დისპექსია. საშუალო სააკის ქალი ჰერპესული გამონაფარით ყურების უკან, მწეველის დისპექსით; ტერფების ოფლიანობა მყრაბლი სუნით; სახეზე ყვითელი ლაქები, განსაკუთრებით ცხვირშე; შეგრძნება თითქოს საშვილოსნო გამოუვარდება

ა) სილიცეა;

ბ) ამბრა გრიზეა;

გ) აქტეა რაცემოზა;

დ) პლატინა;

* ე) სეპია.

419. ქრონიკული გასტრიფი. ახალგამრდა ასთენიური მამაკაცი ნაზი გამჭვირვალე კანით, ხშირი სისხლდენებით ცხვირიდან, უჩივის დისპექსიას; სიცივის შეგრძნება და მწვავე მჭრელი ტკიფილები მუცელის არეში. ტკიფილები კუჭის არეში უმსუბუქდება ცივი წყლის ან ყინულის მიღებისას, მაგრამ როგორც კი კაჭში გათბება, უკან იღებს. წვის შეგრძნება კუჭისა და საყლაპავში

ა) ბრიონია;

ბ) სულფური;

* გ) ფოსფორი;

დ) არსენიკუმი;

ე) ხელილონიუმი.

420. ნეკრალგია. ქალი სახის ნეკრალგიით. ლეჭვისას ყბის სახსრების ტკაცუნი. ენა თეთრი ნადებით, ენის წევრშე კი წითელი სამკუთხედი. დილათით სახსრების რიგიდობა, მოძრაობისას ტკიფილო, რომელიც გადის სწრაფად მოძრაობის დაწყებისთანავე. პირის კუთხეებში დაწყლულებული

ა) ბრიონია;

* ბ) რუს ფოქსი;

გ) რუტა;

დ) ლელკამარა;

ე) ეუფრიზია.

421. სამწვერა ნერვის ანთება. ახალგამრდა ქალი სამწვერას ნეკრალგიით. ირალიაცია ყურში, კბილებში, შებლში, თავის თმით დაფარულ ნაწილში. კბილის ტკიფილს უმსუბუქებს ცივი წყლის დაგუბება პირში. უძილობა ინტელექტუალური მუშაობის შედეგად

ა) ბელადონა;

* ბ) კოფეა;

გ) ხამომილა;

დ) ნუქს ვომიკა;

ე) იგნაცია.

422. რეემატიზმი. მამაკაცი კისრის რეემატიზმით. ვერ იტანს ცივ ჰაერს. გაუარესება ხდება ნესტიან, წვიმიან ამინდში. სიცივისგან ტკიფა კანი. უჭირს მოძრაობის დაწყება, მერე კი ტკიფილი უმსუბუქდება. უხდება თბილის მიღება მტკიფან

ალგილიზე, დაჭიმვა, მასაუი. ლეჭვისას ყბის სახსრები უფატებულებს

ა) ბრიონია;

* ბ) რუს ფოქსი;

გ) ლელკამარა;

დ) ხელილონიუმი;

ე) აპისი.

423. შაკიეთ. 50 წლის ქალი თავის ტკიფილებით, რომელსაც ახასიათებს პერიოდულობა-ყოფელ 2 დღეში ერთხელ გერ იტანს მიკარებას, მაგრამ უმსუბუქდება ძლიერი მოჭერით, თბილ რთახში. ტკიფილი მატერიალის პარტიები გასვლისას, დავარცხნისას. თითქოს თავის ქალა საცავა გასცემა. ტკიფი თითქოს უკანყალებს, თვალები ჩამავებული, ჩავარდნილი. მოყვითალო ფერმერთალი სახე. ყურებში წუილი. ანამნეზში ხშირი ფადარათი. დიდხანს აწოვებდა ბავშვს. ხშირად ამცირებს, კერაფრით ვერ თბება. ეშინია თრპირის

ა) ბელადონა;
ბ) ლიკოპოდიუმი;
*გ) ქინა;
დ) ბრიონია;
ე) ფოსფორი.

424. ყივანახველა. ბავშვი ყივანახველით. შეტევისას სახე უწითლდება, ცრუმლიანობა ეწყება, ხელები და ქრუნჩელი-მუშტად შეკრული. საპამური ხველება, თითქოს იხრჩობა, შეტევები ხანგრძლივი, იცვლება დებინებით. განსაკუთრებით მბიმდება დამის 3 საათზე. უმსუბუქებს ციფი წყლის დალევა

ა) ბელადონა;
*ბ) კუპრუმი;
გ) აციდემ ფოსფორიკუმი;
დ) პერტუსინი;
ე) ბრიონია.

425. შაკიეთ. თავის ტკიფილი აუგანელია, ბოგჯერ გონისაც კარგაქს. შემსუბუქებას ცალილობს ხელების მოჭერით თავშე ან ბალიშტე ძლიერია მიჭერით. თან ახლავს გულისრევის შეგრძნება. ვერ იგანს სუნებსა და მცირედ ხმაურსაც კა. უნდა იყოს მარტო, სრულ სიწყნარესა და სიბრუნვეში. როცა ტკიფილი აპოვებას აღწევს ეწყება დებინება საკვებითა და ნალეველით. ლოკალიზაცია-ტკიფილი იწყება კეფილან, ვრცელდება მთელ თავში და კონცენტრირდება მარჯვენა თვალის ბემოთ. წევს

ა) არნიკა;
*ბ) სანგვინარია;
გ) აკონიფი;
დ) ბერბერისი;
ე) მერკური.

426. შაკიეთ. ქალი აუგანელი თავის ტკიფილებით. შეტევისას ვერ იგანს შუქს და ხმაურს. გის ბნელ რთახში ხელების დაყრდნობილი თავით. თავი მხურვალე, ცხელი, ფეხები კი ციფი. მარჯვენა მხრივი ლოკალიზაცია

*ა) ბელადონა;
ბ) ბოტროფისი;
გ) ბრიონია;
დ) ფოსფორი;
ე) ცინკუმი.

427. დისპერსია. მუცელის ტკიფილი ისეთი ძლიერია, რომ აიძულებს პაციენტს თრად მოიკეცოს, ამავე დროს უნდა იაროს, რათა შეუმსუბუქებეს ტკიფილი. შებლივ ციფი ოფლი ასხამს. მიღრეკილია ფალარათისკვენ;

ა) ლიკოპოდიუმი;
*ბ) ვერაფრუმ ალბუმი;
გ) ხელიდონიუმი;
დ) ბაპტიზია;
ე) ბერბერისი.

428. მეტეორიზმი. მამაკაცი დისპერსიით, მუცელის ძლიერი შებერვით დაუყოვნებლივ ჭამის შემდეგ, საჭმელი ეჩვენება მეავედ. მეავე ბოყინი. ვერ ხმარობს ქამარს, აწუხებს წელზე შარვალი. ვერ იგანს ქუდს. ძლიერი მეტეორიზმი საკვების მიღების შემდეგ

ა) ნუქს ვომიკა;
ბ) ხელიდონიუმი;
გ) ხამომიღა;
*დ) ლიკოპოდიუმი;
ე) ასკლეპიასი.

429. დისპერსია. მამაკაცი დისპერსიით, ენაზე კბილების ანაბეჭდი. უყვარს ცხელი საჭმელი. გულისრევის და დებინებას უხსნის ცხელი წყლის დალევა. საკვების მიღება დროებით უხსნის ჩივილებს. ტკიფილი ეპიგასტრიუმში, ირალიციით მარჯვენა გვერდსა და ბეჭმელი ცვირებით ფერი. ხელის თითების წვერებში ყინულოვანი სიციფის შეგრძნება;

ა) ლიკოპოდიუმი;
ბ) კარბო ვეგეტაბილის;
გ) ბრიონია;
დ) ხამომიღა;
*ე) ხელიდონიუმი.

430. ქრონიკული გასამრიფი. გულისრევა ყავის დაღვევის შემდეგ.თუდონობა ჭამის მერვ.ენაზე ყვითელი ნალები.მწარე გემო პირში.საკვების რეგულიზაცია.დებინება ნალველით.მომატებული მეავიანობა.შეგრძნება, თითქოს კაჭში ქვა აქტს.ერთი ლოყა წითელი აქტს, მეორე ფერმერთაღი

- ა) ლიკოპოდიუმი;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- * გ) ხამომილა;
- დ) ბელალონა;
- ე) ბრიონია.

431. ჭირვეული ბავშვი. აღგზნებული ბავშვი სულ ითხოვს ხელში აყვანის, გირის, ყვირის, ერთი ლოფა წითელი აქტს, მეორე კი ფერმკრთაღი.ყვირის თუ არ მისცეს ის, რაც უნდა, მაგრამ მაშინვე კარგავს ინტერესს, როგორც კი მიიღებს სასურველ ნივთს

- ა) ბელალონა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) ხელიდონიუმი;
- დ) ბრიონია;
- * ე) ხამომილა.

432. ვენების ვარიკოზული გაგანიერება. ასაკოვანი ქალი ვარიკოზულად გაგანიერებული ვენებით.მწველი ტკივილებით ქვემო კიდერებში, ჭიანჭველების შეგრძნებით.ობიექტური დათვალიერებისას კიდერების კანი ცივია.ტკივილები უმსუბუქდება ცივი საფეხბისაგან. არ იფარებს ფეხებზე საბანს-ყოფს გარეთ.ტკივილები უარესდება სითბოსგან

- ა) ლიკოპოდიუმი;
- * ბ) სეკალე;
- გ) სელენიუმი;
- დ) ლელემი;
- ე) კალკარეა კარბონიკა.

433. პოდაგრა. ასაკოვანი ქალი ტკივილებით ქვემო კიდერების სახსრებში განსაკუთრებით წერილებში.სახსრების ტკაცუნი.პოდაგრული კვანძები.ფეხები შემუშავებული.ფეხისგულები მტკივნეული, ძლიერ აღგამს.შეგრძნება, თითქოს კიდერები ცივ წყალშია მოთავსებული.სახე უხურს.ტკივილებს უმსუბუქების ცივ წყალში ჩაყოფა, სიგრილე-ტკივილი მატულობს თბილ ლოგინში, საბის დაფარებისას

- ა) დულკამარა;
- ბ) არნიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- * დ) ლელემი;
- ე) სუკალე.

434. პოდაგრა. ძლიერი მგლეჯავი ტკივილები ფეხებში, რომელიც მძაფრდება დამე, საწოლში.პოდაგრული კვანძები.ტკივილები ქვესლებში შეგრძნებით, თითქოს დადის შეშის ნამსხვრევებზე-ტერფების დაბუქება. მარჯვენა ფეხი ცხელი, მარცხენა ცივი

- ა) სეკალე;
- ბ) ლელემი;
- * გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) სეპა;
- ე) ფოსფორი.

435. ხშირი ჰემორაგიები. პაციენტს ეჩვენება, რომ საწოლი ძალიან მაგარია, აქტს დაბეჭილობის შეგრძნება.თავი ცხელია.ტანი კი ცივი. ეშინა ყოველგვარი შეხების, დარტყმის

- ა) კოლოცინტი;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- გ) ხინა;
- დ) ნექს ვომიკა;
- * ე) არნიკა.

436. კუჭის წყლელი. პაციენტი ზედმეტად სისუფთავის მოყვარულია. აქტს დაუცველობის შეგრძნება.სულ წყურია და სვამს პატარა ყლაპებით.აქტს სიკედილის გამოხატული შიში. მცირანა. ყველა ჩივილს სხსიათებს პერიოლულობა-14 დღე-ტკივილები მწველი ხასიათისაა

- ა) არნიკა;
- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემ;
- გ) ლახებისი;
- * დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ნექს ვომიკა.

437. ეგზოფთალმითავის ძლიერი ტკივილი პულსაციის შეგრძნებით, თავი ცხელი, კიდერუბი ცივი. უფრო ხშირად მარჯვენა მახრივი. წითელი სახით.პაციენტი ნერგიული, ფეთქებადი, ემციური, ხშირად აქტს სურვილი ვინგე სუემოს. ვერ იტანს როცა ყელზე ტანსაცმელი ედება. ენერგიული, სიცოცხლით სავსე-ცუდად გრძნობს თავს მზეზე, ძიღმი ლაპარაკობს, გაცივებისას

ახასიათებს მაღალი სიცხვე ბოლოი, გუგები გაფართოებული აქტს

- ა) ლახებისი;
- ბ) ჰიოსუსიამუსი;
- * გ) ბელადონა;
- დ) აკონიგი;
- ე) იოდი.

438. ართონიგი. ბრაზიანი პაციენტი, ინგროვერტი. ხშირად აქვს ბრონქიტი. სახსრების ტკივილი ეწყება მოძრაობის დროს. უჭირს მოძრაობა. სულ უნდა მოსვენებულ მდგომარეობაში, უმოძრაოდ ყოფნა. ტკივილები შგლეჯავი და ჩხელეფითი ხასიათის. უჩივის პირის სიმშრალეს. შაკიკი, განსაკუთრებით თვალების მოძრაობისას. ემატება საღამოს. ტკივილის ხასიათი-თითქოს თავი უნდა გასკვდეს

- ა) როლოდენდრონი;
- ბ) რუს ტოქსი;
- * გ) ბრიონია;
- დ) ლულკამარა;
- ე) ბელადონა.

439. რევმატიზმი. ადვილად აგზებადი მოუსვენარი პაციენტი, რომელიც უჩივის ტკივილებს სახსრებში. განსაკუთრებით ნესტიან და ცივ ამინდში. დიღხანს ვეც რჩება ერთ პომაში, რაღაც ეწყება ტკივილი, რომელიც უმსუბუქდება მოძრაობისას. მტკივანი ააგილები უცილება და უბუქდება

- ა) როლოდენდრონი;
- * ბ) რუს ტოქსი;
- გ) ბრიონია;
- დ) ლულკამარა;
- ე) ბელადონა.

440. ტოქსიური ჩიუვე. ზელმეტად აქტიური პაციენტი, რომელიც სულ ჩქარობს, ფუსფუსებს. გაუთავებლად და ჩქარა ლაპარაკობს, ერთ ადგილზე ვერ ისვენებს. მომატებული მაღით, მაგრამ ძალიან გამხდარი. ჯირკვლები გადილებული. კანი მუქი, მოყვითალო. ყველა სიმპტომი უმჯობესდება ჭამის დროს. უკეთესად გრძნობს თავს ცივი შხაპისა და საურთოდ სიცივისაგან, მოძრაობისას და ჭამის დროს

- ა) ანაკარდიუმი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) სეპია;
- * დ) იოდი;
- ე) სილიცეა.

441. ბრონქიული ასთმა. სუსტი, ფერმერთალი, მაღალ იღლება. ხშირი ბრონქიტები, ხველება. ხველების შეგევები დამის 3-4 სო-ზე. არ უკვარს მიკარება, განსაკუთრებით ძილში. ადგილად დიტიანდება. მცივანა, ეშინია თრპირის. მიღრეკილია შეშეცებისაკენ, განსაკუთრებით ახასიათებს ბერ ქუთუთოს შეშეცება. ასთმის შეტევა დამის 3-4 სო-ზე, იმულებულია დაჯდეს წინ დახრილი თავით. ნახველის ამოლება უჭირს

- ა) ბრიონია;
- ბ) არსენიკუმი;
- * გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სილიცეა.

442. ენურები. ფერმერთალი ახალგაზრდა გოგონა ისტერიული ტიპის, თავის ტკივილებით, რასაც ამბაფრებს ნებისმიერი სუნი, ირადიაციით თვალებში, შეგრძნებით, თითქოს ლურსმანს უჭედებენ თავში. ხშირად თავის ტკივილი ქრება დებინგის ან შარდვის შემდეგ

- * ა) იგნაცია;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ლახებისი;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ბელადონა.

443. ასთმა. ასთენიური ტიპის ქალი, რომელსაც ასთმის შეტევები დაეწყო ქმრის გარღაცვალების შემდეგ. შეტევისას ფერმერთალი სახე, შეიძლება ქონდეს უხებლიერ შარდვა. ნერვიულობისს აქვს ბურთის შეგრძნება ყელში

- ა) ლახებისი;
- ბ) ბელადონა;
- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) სილიცეა;
- * ე) იგნაცია.

444. ქრონიკული გასტრიგი. ასთენიური ტიპის სტუდენტი "მშიერი ტკივილებით", რომელიც უმსუბუქდება საკვების

მიღებასას.გამწევება აღინიშნება სესიების დროს, უჩივის მექსიერების დაქვეითებას.ახასიათებს ბილტსიტებათბა, უხეშობა
ა) რესტორანი;
ბ) იოდი;
გ) ლიკოპოდიუმი;
დ) მერკერ სოლუციის;
*ე) ანაკარდიუმი.

445. ქრონიკული კოლიფი. ნორმოსთვის კონსტიტუციის პაციენტი დიდი მუცელით.უჩივის ყაბშობას და მუცელის შებერვას ყოველი ჭამის შერე, "მგლის მაღას", სიცესტე 4-დან 8სთ-მდე.ხშირად აქვს სწორი ნაწლავის გამოვარდნა.ბებასილი.ხშირი სურლო,რომლის დროსაც ყნოსვა უმძაფრდება
ა) კარბო ვეგეტაბილის;
ბ) კალკარი კარბონიკა;
*გ) ლიკოპოდიუმი;
დ) ხელიდონიუმი;
ე) ქინა.

446. კოლიფი. დაუძლეურებული, ფერმერთალი პაციენტი ქრონიკული ფადარათით, მუცელის შებერვით, მეტეორიზმით.დვიძლი გადიდებული, სკლერუბი მოყვითალო ძალიან მგრძნობიარე შეხებისა და ორპირი ქარის მიმართ, ანამნეზში ხანგრძლივი სისხლდენები;
ა) ლიკოპოდიუმი;
ბ) ხელიდონიუმი;
*გ) ქინა;
დ) კარბო ვეგეტაბილის;
ე) არნიკა.

447. ბრონქული ასთმა. ნაბი აგებულების პაციენტი ასთმით, მდგომარეობა უარესდება ორპირი ქარისა და სიცივისგან.გამოხატული აქვს ქინძისთავებისა და ხემსების შიში.პატარა ნაკაწრიც კი იოლად უჩირქდება. მცივანა,იფეთნება
ა) ჰეპარ სულფურის;
*ბ) სილიცეა;
გ) იგნაცია;
დ) იოდი;
ე) ნუქს ვომიკა.

448. ართრიფი. რევმატიული ტკიფილები ძლიერდება ნესტიან, ცივ ამინდში, ვერ იტანს ცივ აბაზანას.ებიტლება მჟავე ღვინო, რაღან იგი აძლიერებს ტკიფილებს.ფალარათი დიეტის დარღვევისას.ხშირად ენაცვლება ყაბშობას.ფეხის ტერფებზე გარქოვანებული კანი.ენა რძესავით თეთრი ნადებით
ა) კალკარი კარბონიკა;
*ბ) ანტიმონიუმ კრუდემ;
გ) ლიკოპოდიუმი;
დ) ბრიონია;
ე) რესტორანი.

449. ყაბშობა. არ აქვს კუჭმი გასვლის სურვილი.ვერ იტანს კარგოფილს, სამაგიეროდ ჭამს ყავის მარცვლებს, მშრალ ჩაის ღეჭავს.ასევე უნდება არასაკვები პროლექტების ჭამა:ნახშირი, ლურსმანი და სხვა. სუიციდური აჩრები
ა) ნუქს ვიმიკა;
ბ) ბრიონია;
გ) გრაფიტი;
*დ) ალუმინა;
ე) ლიკოპოდიუმი.

450. პროსტატიფი. პაციენტი უჩივის სპერმატორეას.ურეთრაში აღენიშნება პარადოქსული ხასიათის წვა-როცა არ შარდავს, შარვაისას წვის შეგრძნება ქრება.გულის აჩქარება მოძრაობისას.ანამნეზში არის ონანიზმი
*ა) სტაფიზგრია;
ბ) ნუქს ვიმიკა;
გ) კონიუმი;
დ) სეპია;
ე) მედორინუმი.

451. ალგომენორეა. ბრაზიანი პაციენტი.ძალიან მგრძნობიარეა ნებისმიერი ტკიფილისადმი.ტკიფილები უარესდება სითბოსგან.მენსტრუაციის დროს შავი ფერის უხვი რაოდენობის სისხლი კოლფებით, ტკიფილებით. ერთი ლოფა წითელი აქვს, მეორე ფერმკრთალი
ა) ბელადონა;
*ბ) ხამომილა;
გ) ლილოუმ ტიგრინუმ;

- დ) მაგნებია კარბონიკა;
ე) ჰელიუმილა.

452. ქრონიკული კოლიფი. ნაბი აღნაგობის პაციენტი ქრონიკული შეკრულობით, რომლის დროსაც უკვე ნაწილობრივ გამოსული განავალი უკან ბრუნდება სწორ ნაწილებში. ახასიათებს ფეხების ოფლიანობა მყრალი მძაფრი სენით.

- ა) ლიკოპორიუმი;
*ბ) სილიცეა;
გ) გრაფიტი;
დ) ნუქს ვომიკა;
ე) ანაკარლიუმი;

453. გასტრალგია. სპასტიური ყაბმობა. მუცელი შევარდნილი. განავალი შაგი, გაეს ცხერის კურკლის. ტკივილები კაჭის არეში, რომელიც ქრება დებინების შემდეგ, ანუსის სფინქტერის სპაზმები. შეგრძნება, თითქოს კანაფით არის გაჭიმული ანუსიდან სწორი ნაწილებისკენ. მძაფრი ტკივილები მთელს მუცელში. უმჯობესდება დაჭერით.

- ა) კოლონინგი;
ბ) ბრიონია;
გ) ნუქს ვომიკა;
დ) ხამომილა;
*ე) პლუმბუმი.

მკურნალობა ჰომეოპათიური დიაგნოზის მიხედვით

454. ოფლიანობის რა ლოკალიზაცია ახასიათებს უფრო ხშირად კალციუმის კარბონატს?

- *ა) თავი;
ბ) ყერები;
გ) ბარძაყი;
დ) მუცელი;
ე) წვივები.

455. როდის ხდება ყიფლიბანდის შეხორცება კალციუმის კარბონატის ტიპის ახალშობილში?

- ა) ნაწილ-ნაწილ;
*ბ) ვალაზე გვიან;
გ) ღრომები აღრე;
დ) ორი წლის ასაკში;
ე) ორი თვის ასაკში.

456. გემოგენების რა თავისებურებები ახასიათებს კალციუმის კარბონატის ტიპის ბაგშეს?

- ა) სურს მხოლოდ რძე და რძის პროდუქტები;
*ბ) უყვარს საკუებად უვარგისი საგნები;
გ) ლიმონი;
დ) უყვარს მხოლოდ გაშლი;
ე) უყვარს მხოლოდ მსხალი.

457. რომელ პრეპარატს აქვს ლორის, შებოლილი და დამკავებული პროდუქტების მოთხოვნილება?

- ა) თეა, კონიუმ;
ბ) ვერატრემ ვირიდე, სილიცეა;
*გ) კალკარეა ფოსფორიკა, კაუსტიკ;
დ) სეპია, სილიცეა;
ე) ოპიუმ, ტუა.

458. რომელი პრეპარატების არის მეტად დამახასიათებელი ქუთუთოების პტოზი?

- *ა) კაუსტიუმი, გელტემინუმი;
ბ) ხელიდონიუმი, კორალიუმ რებრემ;
გ) ლილოუმ ფიგრინუმ, ესტალიპტუს;
დ) კოკა, კაკტუს;
ე) აბსინთიუმ, ბერბერის.

459. რა პობა უადვილებს კუჭში გასვლას პრეპარატ კაუსტიკუმის პაციენტს?

- ა) ჩაცუცქული;
*ბ) მდგომარე;
გ) წინ გადახრილი;
დ) ხებისმიერი;
ე) ფეხი ფეხზე გადადებული.

460. როგორი ბავშვებისთვის არის ნაჩვენები პრეპარატი ხამომილა?

- ა) მშვიდი, აუდელვებელი;
- ბ) თეთრი, ცინგლიანი;
- * გ) გაღიტიანებული;
- დ) თეთრი, მსუქანი, სუსტი;
- ე) ფერმკრთალი, გაფართოვებული გუგებით.

461. სახის როგორი ფერი ახასიათებს ხამომილას ტიპის ადამიანს?

- ა) ციანოტური;
- ბ) ფერმკრთალი;
- * გ) ერთი ლოკალური, მეორე ფერმკრთალი;
- დ) მომწვანი;
- ე) მიწისფერი.

462. რა შემთხვევაში გრძნობს ბავშვი ხამომილა თავს კარგად?

- * ა) როცა ხელში აყვანილს აფარუბენ;
- ბ) საწოლში;
- გ) მჯდომარე;
- დ) როცა მარტო თამაშობს;
- ე) როცა სხვა ბავშვებთან თამაშობს.

463. როგორი ირადიაცია ახასიათებს ტკიფილს თირკმლის არეში პრეპარატ ხელიდონიუმის საჭიროებისას?

- ა) საღამისებური ტკიფილი;
- ბ) მარცხენა დვრილი;
- გ) მარჯვენა ბარძაყი;
- * დ) მარჯვენა ბეჭის ქვედა კუთხე;
- ე) მარჯვენა წვივი.

464. რომელი პროდუქტი იწვევს დიარეას პრეპარატ ქინინუმ არსენიკომის შემთხვევაში?

- ა) ხორცი;
- * ბ) კვერცხი;
- გ) შოკოლადი;
- დ) ბრინჯი;
- ე) წიწიბურა.

465. როგორი ფსიქოლოგიური სურათი ახასიათებს ქინას?

- * ა) ძალიან ავი, გაღიტიანებული, ვერ იგანს მიკარებას;
- ბ) რბილი, ალერგიანი;
- გ) მშენილი;
- დ) ალერგიანი, მტირალა;
- ე) ითხოვს მოფერებას.

466. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის ტკიფილის შემსუბუქება მოშარლვის შემდეგ?

- ა) ფოსფორი, კოქა;
- ბ) ალუმინი, ჰელებორუს;
- გ) ფოსფორი, ნატრი მურიატიკა;
- დ) კალცი კარბონიკა, ალუმინია;
- * ე) გელბემინუმ, იგნაცია.

467. როგორი ხასიათის ტკიფილი გვხვდება პრეპარატ კაკტუსის შემთხვევაში?

- * ა) თითქოს საღამისები აქვს შემოჭერილი;
- ბ) მწვევლი;
- გ) სიცივის შეგრძნებით;
- დ) დაბუქების შეგრძნებით;
- ე) დაწოლითი.

468. როგორი ენაა დამახასიათებელი პრეპარატ წუქს ვომიკას ტიპის პაციენტისთვის?

- ა) მთლიანად დაფარულია თეთრი სქელი ნალებით;
- ბ) მთლიანად დაფარულია რუხი ნალებით;
- გ) გეოგრაფიული;
- * დ) ენის ძირი ნალებიანი, დანარჩენი ნაწილი სუფთა;
- ე) ნალებით დიაგონალზე.

469. როგორი კუჭის მოქმედება ახასიათებს წუქს ვომიკას ტიპის პაციენტს?

- ა) აფონიური შეკრულობა;
- *ბ) სპასტიური შეკრულობა;
- გ) რბილი, ფანქარივით წვრილი განავალი;
- დ) ფალარათი;
- ე) ხან ფალარათისა და ხან შეკრულობის მონაცემები.

470. როგორი ენა ახასიათებს პრეპარატ რუს ტოქსიკოდენდრონს?

- *ა) წითელი სამქეობელი ენის წვერზე ან ნაღები დიაგონალზე;
- ბ) მთლიანად დაფარულია რუხი ნაღებით;
- გ) მთლიანად დაფარულია თეთრი ნაღებით;
- დ) ენის წვერი ნაღებიანი, დანარჩენი სუფთა;
- ე) გეოგრაფიული.

471. როგორი განავალი ახასიათებს პრეპარატ პლუმბუმ მეტალიკუმს?

- *ა) მკვრივი, ნაჭრებად, შავი;
- ბ) რბილი, წვრილი, ყავისფერი;
- გ) თხელი, ლორწოვანი;
- დ) ლორწოვანი, მომწვანო;
- ე) სისხლნარევი.

472. როგორი ლოკალიზაციის და რა სახის ოფლი ახასიათებს პრეპარატ ვერატრუმ ალბუმს უპირატესად?

- ა) მუცელზე, ცხელი;
- ბ) გულმკერდზე,ცივი;
- *გ) შებლზე,ცივი;
- დ) კეფზე,ცხელი;
- ე) ხელებზე და ფეხებზე,ცივი.

473. დღის რა მონაკვეთში შეიმჩნევა ფალარათი პრეპარატ სულფურის შემთხვევაში?

- *ა) დილით 5 საათზე აყენებს საწოლილან;
- ბ) საღამოს;
- გ) 23 საათზე;
- დ) დღისით 16-20 საათზე;
- ე) 24 საათზე.

474. რა მოდალობა ახასიათებს პრეპარატ ანაკარდიუმს საკვების მიღებასთან დაკავშირებით?

- ა) გაუმჯობესება ჭამის შემდეგ;
- ბ) გაუარესება;
- გ) ზიბლი საკვების მიმართ;
- *დ) გაუმჯობესება ჭამის დროს;
- ე) გაუარესება ჭამის დროს.

475. როგორ ადამიანებს ენიშნებათ უპირატესად პრეპარატი ნუქს ვომიკა?

- *ა) ნერვიული, აგზნებადი;
- ბ) მოთენთილი, მსუქანი;
- გ) მოთენთილი, ფლეგმატიკი;
- დ) მტირალა, მშიშარა.

476. რა სახის შეკრულობის დროს ინიშნება პრეპარატი ალუმინა?

- *ა) აფონიური შეკრულობა;
- ბ) სპასტიური შეკრულობა;
- გ) შეკრულობა მხოლოდ მოგზაურობისას;
- დ) რბილი, ფანქარივით წვრილი განავალი;
- ე) ხან ფალარათი, ხან შეკრულობა.

477. რითი გამოირჩევა პრეპარატ სილიცეას დეფეკაცია?

- ა) უშედეგო მოთხოვნილება წვით სწორ ნაწლავში;
- *ბ) განავალი, ნახევრად გამოსულიც კი, კელავ ბრუნდება ნაწლავში.
- გ) განავალი თავიდან მკვრივია შემდეგ თხელი;
- დ) ხან ფალარათი, ხანშეკრულობა;
- ე) განავალი თავიდან თხელია, შემდეგ მკვრივი.

478. რითი გამოირჩევა პრეპარატ ვერატრუმ ალბუმის შეკრულობა?

- ა) ტენებმები ვრცელდება შარლის ბუშტებე;
- ბ) შეკრულობა კოლიკით და შევარღნილი მუცელით;

* გ) აეაღმყოფი ხარჯაეს დიდ ენერგიას დეფენსიურის დროს და იფარება თფლით, ზოგჯერ შეიძლება კოლაფსტიც ჩავარდეს;
დ) ცრუ ტენებმები;
ე) განავალი თავიდან მკვრივია, შემდეგ თხელი.

479. როგორი ენა ახასიათებს პრეპარატ ანგიმონიუმ კრედემს?

- ა) ნადებიანი ძირში;
- * ბ) მთლიანად დაფარულია სქელი ნადებით;
- გ) ნადებით მხოლოდ შეაში;
- დ) ნადებიანი დიაგონალზე;
- ე) გეოგრაფიული.

480. რა ძირითადი ჩივილები გვხვდება დრომა ფსიქიური დაზიანებისას პრეპარატ ანაკარდიუმის შემთხვევაში?

- * ა) საწინააღმდეგო იმპულსები, უჩივის ნებისა და სურვილის გაორებას;
- ბ) პათოლოგიური ეჭვიანობა;
- გ) საწოლში გვერდით სხვა ადამიანის ყოფნის შეგრძნება;
- დ) სიმაღლის შიში;
- ე) ესიზმრება კაფები და ძაღლები.

481. რა უზეველო მოდალობები ახასიათებს პრეპარატ არგენტუმ ნიტრიკუმს?

- * ა) გაუმჯობესება ქარის სახეში შებერვის დროს;
- ბ) გაუმჯობესება ნესტიან ამინდში;
- გ) გაუმჯობესება სიცივეში;
- დ) გაუმჯობესება სიცივეში;
- ე) გაუმჯობესება ნესტიან ამინდში.

482. რომელი პრეპარატის ტიპის ადამიანს არ შეუძლია დახუჭული თვალებით სიარული?

- ა) ფოსფორი;
- * ბ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- გ) კალციუმ კარბონიკუმ;
- დ) კოკა;
- ე) აპისი.

483. რომელი პრეპარატი ენიშნებათ ხშირად მოსწავლეებს გამოცდის წინ?

- ა) აპისი, სეპია, ხამომილა;
- ბ) რუს ტოქსი, სულფური, შედორინი;
- * გ) არგენტუმ ნიტრიკუმი, ანაკარდიუმი, გელბემინი;
- დ) აპისი, კოკა, თეა;
- ე) ჰიოსციამუს, სტრამონიუმ, მედორინი.

484. რისი შიში ახასიათებს განსაკუთრებით პრეპარატ არნიკას?

- ა) სიმაღლის;
- ბ) ძაღლების;
- * გ) შეხების, განსაკუთრებით მოულოდნელის;
- დ) გაგიქების;
- ე) კატების.

485. რა ბოგადი შეგრძნებები ახასიათებს უპირატესად პრეპარატ არნიკას?

- ა) ჯანსაღი სხეულის შეგრძნება;
- ბ) ბოგადი სისუსტის შეგრძნება;
- * გ) დამტვრეულობის, დაკეცილობის შეგრძნება;
- დ) წვის შეგრძნება;
- ე) სიცივის შეგრძნება.

486. რომელ პრეპარატის ახასიათებს სისხლის მოწოდებად თავში მაშინ, როცა სხეულის სხვა ნაწილები ციფი რჩება?

- ა) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- * ბ) არნიკა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) თეა;
- ე) კოკა.

487. დღის რა მონაკვეთში უარესდება არსენიკუმ ალტუმის ტიპის პაციენტის მდგომარეობა?

- * ა) დამე 1-დან 3სთ-მდე;
- ბ) დილის 6 საათშე;
- გ) დილის 5 საათშე;

დ) დღისით საღილის შემდეგ;

ე) 7 საათზე.

488. რომელი პრეპარატის ტიპის ადამიანს უჩნდება სისხლჩაქცევები მცირე მიკარუბის დროსაც კი?

ა) ალუმინი;

*ბ) არნიკა;

გ) არსენიკუმ ალბუმ;

დ) კოკა;

ე) ლაბეგისი;

489. როგორ მოქმედებს ცივი წყლის დალევა არსენიკუმ ალბუმის ტიპის პაციენტები?

*ა) აუარესებს მდგომარეობას;

ბ) აუმჯობესებს მდგომარეობას;

გ) მძიმედ აწვება კუჭბე;

დ) იწვევს წვით ტკივილებს კუჭში;

ე) არანაირად არ მოქმედებს.

490. როგორი სახის ნახველი ახასიათებს არსენიკუმ ალბუმის ტიპის პაციენტს?

*ა) ქაფიანი, გაგს ათქევეფილი აკერტის ცილის;

ბ) მცირე ლორწოვანი ნაფლეთებით;

გ) გრძელი ყვითელი ძაფებით;

დ) მომწვანი ფერის;

ე) სისხლნარევი.

491. რა სახის გამონაყარი ახასიათებს პრეპარატ არსენიკუმ ალბუმს?

ა) რომელსაც თან ახლავს ჩელეფითი ტკივილი;

ბ) რომელსაც თან ახლავს დაბუჟება;

*გ) რომელსაც თან ახლავს წვა და ქაფილი და მცირდება სითბოს გემოქმედებით;

დ) რომელსაც თან ახლავს სიცივის შეგრძნება;

ე) რომელსაც თან ახლავს სიცხის შეგრძნება.

492. აურემ მეტალიკუმისთვის დამახასიათებელი მთავარი ფსიქიკური მახასიათებელი

ა) სიკვდილის შიში;

ბ) კატების შიში;

*გ) სიცოცხლისადმი ზიზდი, სუიციდისადმი მიღრეკილება;

დ) ეჭვიანობა, ძაღლების შიში;

ე) რქოსანი პირუტყვის შიში.

493. რომელი მოდალობა ახასიათებს პრეპარატ ბრომის მდგომარეობას?

*ა) გაუმჯობესება ბრვის პირას;

ბ) გაუმჯობესება მთებში;

გ) გაუმჯობესება ნესტიან ამინდში;

დ) გაუარესება ნესტიან ამინდში;

ე) გაუმჯობესება მშრალ ამინდში.

494. რა ძირითადი შეგრძნება ახასიათებს პრეპარატ კაპტუსს?

ა) სხვადასხვა ადგილების დაბუჟების შეგრძნება;

*ბ) მოჭერის შეგრძნება ნებისმიერ ორგანოში;

გ) ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება;

დ) სიცივის შეგრძნება;

ე) სიცხის შეგრძნება.

495. ექიმ შარეგის აზრით რომელ ერთადერთ პრეპარატს ახასიათებს მარცხენა ხელის შეშუპება?

ა) კონიქმი;

*ბ) კაპტუსი;

გ) მერკურ სოლუბილის;

დ) აპისი;

ე) პულსატილა.

496. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს უყვარს დიდი რაოდენობით წამლების მიღება?

ა) იგნაცია;

*ბ) კაპტუსი;

გ) მერკურ სოლუბილის;

დ) აპისი;

ე) პულიაგილა.

497. რომელი სამი ძირითადი დაბავალება ახასიათებს პრეპარატ კალკარეა კარბონიკას?

- ა) ნეფრიტი, ლუმბაგო, ნეფრიტი;
- ბ) შაკიკი, იშაისი, ართონობი;
- გ) ფსორიაზი, ეგზემა, შაკიკი;
- *დ) დიათეზი, რაქიფი, ტებერკულოზი;
- ე) კოლიტი, ენტერიტი, ნეფრიტი.

498. მთვარის რომელ ფაზაში უუარესდება მდგომარეობა კალკარეა კარბონიკას ტიპის პაციენტები?

- ა) ბოლო მეოთხედში;
- ბ) მთვარის პირველ მეოთხედში;
- *გ) სავსემთვარეობის დროს;
- დ) მესამე მეოთხედში;
- ე) არც ერთ ფაზაში.

499. რისი შიში ახასიათებს უპირატესად პრეპარატ კალკარეა კარბონიკას?

- ა) სარქეების შიში;
- ბ) ცხოველების შიში;
- *გ) ავალმყოფობის;
- დ) კატების შიში;
- ე) თვითმფრინავის შიში.

500. რომელი პრეპარატი იძლევა ჭინჭრის ციცებას ციც წყალთან შეხების შემდეგ?

- ა) არსენიკუმ ალტუმ;
- ბ) კოკ;
- *გ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- დ) კალკარეა ფლუორიკა;
- ე) არგენტუმ ნიტრიკუმ.

501. როგორი ძვლები ახასიათებს კალკარეა ფლუორიკას ტიპის პაციენტებს?

- ა) ჯანმრთელი;
- *ბ) ლეფორმინებული;
- გ) რბილი;
- დ) დამოკლებული;
- ე) დაგრძელებული.

502. რა ემართება ელასტიურ ქსოვილს კალკარეა ფლუორიკას პათოლოგიის დროს?

- ა) არ იცვლება;
- ბ) მკვრივდება;
- გ) ფონესი მატელობს;
- *დ) კარგავს ძირითად თვისებებს, კარგავს ტონებს;
- ე) იცვლება სხედა სახის ქსოვილით.

503. რომელ პრეპარატებს ახასიათებს ჯირკელების გამკვრივება?

- ა) აპის, კოკა, თეა;
- ბ) კარდეს მარიანეს, საბინა, სტანუმ;
- *გ) კონიუმ, იოდი, სილიცია;
- დ) ნუქს ვომიკა, თბიუმი, ნუქს მოშატა;
- ე) კოკა, სტრამონიუმი, სილიცია.

504. რომელ პრეპარატს ახასიათებს მთელი სხეულის გაცივება ძალების სრული წართმევით, კოლაფსითა და კრუნჩხებით?

- ა) აპისი;
- ბ) კარდეს მარიანეს;
- *გ) კამფორა;
- დ) აკონიტი;
- ე) იოდი.

505. რომელი პრეპარატი წარმოადგენს თითქმის ყველა მცენარეული სწრაფადმოქმედი საფალარათო შხამების ანგილოფს?

- *ა) კამფორა;
- ბ) ბრონიზია;
- გ) იგნაცია;
- დ) კოკელეს;
- ე) სტანუმ.

506. დოქტორ შარემის ამრით რომელი სამი პრეპარატია ნაჩვენები ქოლერის დროს?

- ა) ცინა, კოკულუსი, კაუსტიკუმი;
- ბ) ცინხონა, კოლხიკუმი, მილეფოლიუმ;
- გ) კანგარისი, ტუია, კანაბის ინდიკა;
- *დ) კამფორა, ვერაფრუმი, კუპრუმი;
- ე) არსენიკი, ცინა, სეპია.

507. რა შეგრძნებებს იწვევს პრეპარატი კანგარისი შარდის ბუშტის დაბიანების დროს?

- ა) მცუბუქი ჩხვლეტა;
- ბ) სიცივე შარდის ბუშტის არეში;
- *გ) მწველი ტყიფილი მოშარდვის ხშირი მოთხოვნით;
- დ) სიცხის შეგრძნება შარდის ბუშტის არეში;
- ე) დაწოლითი ტყიფილი.

508. ძირითადად რომელ ორგანოებზე მოქმედებს პრეპარატი კანგარისი?

- ა) ელენთა;
- ბ) კუჭი, ნაწლავები;
- *გ) საშარლე თრგანოები;
- დ) დვიძლი და კარის ვენა;
- ე) სისხლძარღვები.

509. რომელი პრეპარატი იხმარება ყველა იმ დაავადების დროს, რომელსაც თან ახლავს ლორწოვანი გარსების წვა?

- ა) თება;
- ბ) კოკა;
- *გ) კაფსიკუმი;
- დ) ტუია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილისი.

510. რომელი პრეპარატი იხმარება მუცელის შებერვისას, როცა პაციენტი იძულებულია შეიხსნას ქამარი?

- *ა) ლიკოპილიუმი;
- ბ) ნაია;
- გ) ვალერიანა;
- დ) კოკა;
- ე) ტეია.

511. რომელი სამი ძირითადი პრეპარატი იხმარება მუცელის გაზებით შებერვის დროს?

- ა) იგნაცია, მილეფოლიუმი, ამბრა გრიზეა;
- *ბ) ქინა, ლიკოპილიუმი, კარბო ვეგეტაბილის;
- გ) ჰიოსფიამუს, ჰიდრასტის, მოშუსი;
- დ) ცინა, თება, კოკა;
- ე) სილიცება, ცინქონა, ლაპის.

512. რომელი პრეპარატის ტიპის ადამიანს ეჩვენება, რომ გარშემო ყველაფერს საკუთარ სხეულსაც კი განავლის სუნი აქვს?

- ა) აპისი;
- ბ) ვალერიანა;
- გ) ხამომილა;
- დ) კოლხიკუმი;
- *ე) ხელილონიუმი.

513. რომელი ორგანოს დაბიანების დროს ითვლება მთავარ პრეპარატად ხელილონიუმი?

- ა) გული;
- ბ) ყური;
- გ) სისხლძარღვები;
- *დ) დვიძლი;
- ე) ცხვირი.

514. ფილგვის რომელი წილი ბიანდება უფრო ხშირად მნევმონიის დროს ხელილონიუმის ტიპის პაციენტებში?

- ა) მარცხენა ქვედა;
- ბ) მარცხენა ბელა;
- *გ) მარჯვენა ქვედა გართულებით დვიძლის მხრიდან;
- დ) მარჯვენა ბელა;
- ე) ორივე ქვედა.

515. რომელ დაავალებას უკავშირებენ პრეპარატ ქინას ისფორიას?

- ა) ტუბერკულოზი;
- ბ) გონორეა;
- *გ) მალარია;
- დ) სიფილის;
- ე) იშიასი.

516. რა თავისებურება ახასიათებს ქინას ფიპის ტკივილს?

- ა) გაუარესება ძლიერი ბეჭოლის დროს;
- *ბ) გაუარესება მიკარებით და გაუმჯობესება ბეჭოლით;
- გ) გაუმჯობესება მოძრაობაში;
- დ) გაუარესება მოძრაობაში;
- ე) გაუმჯობესება ბეჭოლის დროს.

517. რა მოქმედებას ახდენს პრეპარატი ქინა სისხლძარღვოვან სისტემაზე?

- ა) არაგითარი;
- *ბ) სისხლდენა, ანემია;
- გ) შეშეპება, ანასარკა;
- დ) კაპილარების გახეოქვა;
- ე) შეგუბება პორტალურ ვენაში.

518. რომელი პრეპარატი იხმარება ტრადიციული ჰომეოპათიაში მსხვილი ჭიების არსებობის დროს?

- ა) აპისი;
- ბ) მერკერ ბიიოლი;
- *გ) ცინა;
- დ) მაგნეზია ფოსფორიკა;
- ე) ჰელებორუსი.

519. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავბრუსხვევა, გულისრევა, ლებინება და შაკიკი ტრანსპორტში მგზავრობის დროს?

- ა) აპისი;
- ბ) ნექს ვომიკა;
- გ) ცინა;
- *დ) კოკელუსი;
- ე) კოფეა.

520. რომელი მოდალობა ახასიათებს კოფეას კბილის ტკივილს?

- *ა) ტკივილი სუსტდება ცივი წყლის მოქმედებით;
- ბ) ტკივილი სუსტდება თბილი წყლის მოქმედებით;
- გ) ტკივილი სუსტდება ცხელი წყლის მოქმედებით;
- დ) ტკივილი მატულობს ცივი წყლის მოქმედებით;
- ე) ტკივილი მატულობს ცხელი წყლის მოქმედებით.

521. რა პონა ამეცაბუქებს მუცელის ტკივილს პრეპარატ კოლოცინტის შემთხვევაში?

- ა) ბერგბე წოლა გაჭიმული ფეხებით;
- ბ) მარჯვენა გვერდზე წოლა;
- გ) მარცხენა გვერდზე წოლა;
- *დ) ორად მოხრა და მუცელზე რაიმე მკვრივის მიჭერა;
- ე) მუცელზე წოლა.

522. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავზე გადასხმული ცივი წყლის შეგრძნება?

- ა) ლელკამარა;
- *ბ) კუპრუმ მეტალიკუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ლიგიფალისი;
- ე) სულფური.

523. რომელი პრეპარატი ინიშნება ძირითადად სპაზმების და კრენჩხვების დროს?

- ა) ლელკამარა;
- *ბ) კუპრუმ მეტალიკუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ლიგიფალისი;
- ე) სულფური.

524. რა პირველად გავლენას ახდენს დიგიტალისი პულსჩე?

- ა) არითმია;
- ბ) ტაქიკარლია;
- გ) ბიგემინია;
- დ) ტრიგემინია;
- *ე) შენელება შემდგომი აჩქარუბით.

525. ძირითადად რომელ ორგანოზე მოქმედებს პრეპარატი დიფიტალისი?

- ა) თვალები, ყელი, კანი;
- *ბ) გული, ღვიძლი, სისხლძარღვები;
- გ) ლორწოვანი, სეროტული გარსები;
- დ) ცხვირი, ყელი, თირკმელები;
- ე) კუჭი, ნაწლავები.

526. როგორი ხველა ახასიათებს პრეპარატ დროტერას ყივანახველის დროს?

- ა) შემაწუხებელი, მხოლოს დამტ, ნახველიანი;
- *ბ) მშრალი, სპაზმური, ხშირი შეტევებით, მოხრჩობის საშიშროებით. შეცეფა მთავრდება დებინებით;
- გ) ძლიერი ხველა ღვიძინების რეფლექსებით სქელი, ცილისმაგვარი ნახველის გამოყოფით;
- დ) იშვიათი შეტევებით, მომწვანო ნახველით;
- ე) შეტევის დროს ბავშვი შემდება, კარგაც გონებას, სახე ციანობურია, შეტევა მცირდება რამდენიმე ყლუპი ციფი წყლის მიღებით.

527. როგორი ამინდი იძლევა გაუარესებას პრეპარატ დულგამარას შემთხვევაში?

- *ა) ნესტიანი, ციფი ამინდი;
- ბ) ცხელი;
- გ) მშრალი, ციფი ქარი;
- დ) კარგი, მშრალი, მზიანი ამინდი;
- ე) მშრალი ცხელი ქარი.

528. როგორი ტიპი შეესაბამება პრეპარატ გრაფიტს?

- *ა) ფერმერთალი, მცუქნი, აწუხებს შეკრულობა, მციფანა, დაბნეული;
- ბ) გამხდარი, აქტიური, ნერვიული, ცხელი;
- გ) მსუქანი, პლეგორული, ცხელი, მორცხვი;
- დ) ნესტიანი, ციფ სარღაფებში მცხოვრები და მომუშავე ადამიანები;
- ე) მთებში მცხოვრები ადამიანები.

529. როგორი გამონაყარი ახასიათებს პრეპარატ გრაფიტს?

- ა) წერილი პაპულები, ქავილისას სისხლმდები;
- *ბ) სველი ქერცლიანი, ქერქის აცლის შემდეგ გამოიყოფა ყვითელი თაფლივით სქელი სითხე;
- გ) ფართო, წითელი დაქქნი კანი, ქავილიანი ლოგინში ჩათბობისას;
- დ) ქავილიანი გამონაყარი დაზირქებით. გაუარესება ლოგინის სითბოში და დაბანით;
- ე) პესტელომური გამონაყარი, რომელიც უმჯობესდება ცხელი წყლით დაბანით.

530. რა პირობებში კლინდება ან უარესდება პრეპარატ დულგამარას გამონაყარ?

- *ა) ნესტიან სიცივეში;
- ბ) სიცხეში;
- გ) აღმოსავლეთის ქარში;
- დ) მშრალ ამინდში;
- ე) მთებში ცხოვრებისას.

531. რომელი პრეპარატია მგრძნობიარე ნოფიო სიცივის მიმართ?

- ა) თეა, კოკა;
- ბ) კოლხიკუმ, სილიცეა;
- *გ) დულგამბრა, ნაფრი სულფურიკა;
- დ) აკონიფი, ბრიონია;
- ე) არსენიკი, პულსატილა.

532. რა ახასიათებს ძირითადად ჰამამელისს?

- ა) თავის ტყივილი;
- *ბ) ვენერი შეგუბება და სისხლდენა;
- გ) სახსრების დაბიანება;
- დ) საშარდე სისტემის დაზიანება;
- ე) სასქესო თრგანოების პათოლოგია.

533. რას იწვევს პრეპარატი ჰელებორუსი ფსიქოფროციონალური პრობლემების მქონე ავადმყოფებში?

- * ა) გრძნობების დაჩლუნგებას;
- ბ) გადიმიანებადობს და აგრესიას;
- გ) ღრმა მედანქოლიას ნალეველითა და სასოწარკვეთით;
- დ) მხიარულ აგზებას;
- ე) სუიციდალური აბრების გაჩენას.

534. რას წარმოადგენს პრეპარატი ჰეპარ სულფურის ქიმიური თვალსაზრისით?

- ა) რკინის ნაერთი ფოლადთან;
- * ბ) გოგირდის ნაერთი კალციუმთან;
- გ) გოგირდის ნაერთი მაგნიტის ფოსფაგთან;
- დ) გოგირდის ნაერთი სილიციუმთან;
- ე) კალციუმის ნაერთი სილიციუმთან.

535. რომელი პრეპარატის მოქმედებას გავს პრეპარატ ჰეპარ სულფურის შემაღენელი ნაწილების მოქმედება და სხეულის რომელ ნაწილებში მოქმედებს?

- ა) კანჩე მოქმედებს როგორც ჰელსაგილა, კუჭიე როგორც კოკულუსი;
- * ბ) კანჩე მოქმედებს როგორც სულფური, კუჭიე როგორც კალკარეა;
- გ) კანჩე მოქმედებს როგორც გრაფიტი, კულტე როგორც კაპტუსი;
- დ) ვენაჩე მოქმედებს როგორც ხამომილა, კანჩე როგორც აკონიტი;
- ე) აორტაზე მოქმედებს როგორც სტრამონიუმი, კანჩე როგორც გრაფიტი.

536. რა რეაქცია აქვს ტკივილზე პრეპარატ ჰეპარ სულფურის ტიპის პაციენტს?

- * ა) მომატებული მგრძნობელობა ტკივილისა და შეხებისადმი: ავადმყოფს გული მისდის უმნიშვნელო ტკივილის დროს;
- ბ) არ არის მგრძნობიარე ტკივილისადმი: იყი ტკივილს თითქმის ვერ შეიგრძნობს;
- გ) მიუყენებულ ტკივილზე აქვს ალექვატური რეაქცია;
- დ) დაგვაანებული რეაქცია ტკივილზე;
- ე) მოღენებული რეაქცია ტკივილზე.

537. პიროვნების რომელ ტიპს შეესაბამება პრეპარატი ჰეპარ სულფური?

- ა) ეჭვიანი, არასრულფასოვნების კომპლექსით, ექსტრავაგანტური;
- * ბ) გადიმიანებული, გაბრაბებული, მცივანა, მიღრეკილი ალკიპლოიმისა და დაზირქებისაკენ;
- გ) მხიარული, გულითიბილი, მოგჯერ იოლად აგზებადი, მაგრამ მაღვევ გასდის;
- დ) ჩაკეფილი, ნალელიანი, ჩუმი, უკომფლიქტო, მელანქოლიკი;
- ე) ყურადღებიანი, ალერსიანი, ჩუმი.

538. როგორ გამოიყენება ჰიოსციამუსის ტიპის პაციენტი ბოლების დროს?

- ა) სტეპორობული ბოლება;
- ბ) მხიარული ბოლება ადვილად გაბარიტებაში;
- * გ) მხედველობითი ჰალუცინაციები: საგნება ეზევენება წითლად;
- დ) ბოლება ჰალუცინაციებით, მუსკულატურის ძლიერი აგზება, რომელიც უკვე აღარ კონტროლდება ტვინის ცენტრებით, ტონური კრენჩევები მცირე შეხების დროსაც კა;
- ე) გამძვინვარება ყველაფრის დანგრევის სურვილით.

539. როგორ იქცევა ძილის ავადმყოფი ბავშვი ჰიოსციამუსი?

- ა) ძინაგის მშევილად, ისე რომ ძლიერ ისმის მისი სუნთქვა;
- * ბ) შეკრთმა, ძილის დროს წამოყვარება, კანკალი, იღვიძებს შეშინებული;
- გ) მთვარეული;
- დ) მშევილი ძილი;
- ე) იღვიძებს ყოველ ერთ საათში.

540. რა პორა აუარესებს ხელას პრეპარატ ჰიოსციამუსის შემთხვევაში?

- ა) ლოგინში წამომჯდარი;
- * ბ) როგორც კი ავადმყოფი იღებს ჰორიზონტალურ მდგომარეობას;
- გ) მუცელზე წოლის დროს;
- დ) მარცხენა გვერდზე;
- ე) მარჯვენა გვერდზე.

541. რა პრეპარატი იხმარება ძირითადად თუ პაციენტს აწევებს წყლის შიში?

- ა) მერკერიუს ვიფეს, იოლი, ბორაქსი;
- * ბ) ბელადონა, ჰიოსციამუსი, სტრამონიუმი;
- გ) სულფური, არსენიკუმი, სეპაია;
- დ) ქინა, ცინა, ლიკოპოდიუმი;
- ე) თეა, კოკა, პელსაგილა.

542. რა შემთხვევის შემდეგ იხმარება პრეპარატი იგნაცია?

- ა) ძაღლის შეყეფების შემდეგ;
- ბ) მოწამეობის შემდეგ;
- * გ) საყვარელი ან ახლობელი ადამიანის დაკარგვის სემდეგ;
- დ) მოუღოლნელი სიხარულის;
- ე) ფინანსური კრახის შემდეგ.

543. რომელ ორგანოზე და როგორ მოქმედებს პრეპარატი იგნაცია უფრო ხშირად?

- ა) კანგეივენეს სისხლიან ჰესტელებს;
- * ბ) სწორ ნაწლავებზე, იწვევს შეკრულობას;
- გ) კანგე იწვევს მეჭეჭებს;
- დ) ნაწლავებზე, იწვევს დიარეას;
- ე) შარდის ბუმტებ, იწვევს ცისტიტს.

544. როგორი კრუნჩხვის ღროს იხმარება პრეპარატი იგნაცია?

- ა) შერეული;
- ბ) ძლიერი სპაზმი;
- * გ) ტონური;
- დ) კლონური;
- ე) არ იწვევს.

545. როგორ მოქმედებს პრეპარატი იოდი მადაბე?

- * ა) იწვევს დაუოკებელ შიმშილს, მდგომარეობა უმჯობესდება საკვების მიღების შემდეგ, მაგრამ აფალმყოფი მაინც ხდება;
- ბ) იწვევს მაღის დაკარგებას;
- გ) მცირე ულუფა იწვევს სწრაფ დაკმაყოფილებას;
- დ) არავითარი კავშირი არ აქვს;
- ე) ჭამის შემდეგ აყრის.

546. რომელი დაბავადებები წარმოადგენერ ხშირად ჩვენებას პრეპარატ იოდის დანიშვნისათვის?

- * ა) მკერდისა და საკვერცხების აფროფია, ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერტონია, საყმაწვილო და სასუნთქი გზების დააჭადებები;
- ბ) შეკრულობა, ბერისილი, კრუნჩხვითი ხასიათის ტკივილები;
- გ) თავის ტკივილი მშებელ და კაშებაშა სინათლეში;
- დ) ტონური კრუნჩხვები, ნახეთქები;
- ე) წყლულები და რძიანა კანისა და ლორწოვანის საბლვარზე.

547. მთვარის რომელ ფაზაში იძლევა გაუარესების პრეპარატი იოდი?

- ა) არის დამოკიდებული;
- ბ) ახალი მთვარისბის;
- გ) საქსემთვარეობისას;
- * დ) უკანასკნელ მეოთხედში;
- ე) პირველ მეოთხედში.

548. როგორი ენა ახასიათებს პრეპარატ იგნაციას?

- ა) ნალები დიაგონალზე;
- ბ) ყვითელი ნალები ძირში;
- გ) თეთრი ნალებით, სუფთა კუნძულებით მასზე;
- * დ) სუფთა ენა კბილების ანაბეჭდებით მასზე;
- ე) სქელი თეთრი ნალები მთელ ენაზე.

549. რას იწვევს იპეკაკუანა უფრო ხშირად?

- ა) თავის ტკივილს;
- ბ) ჰესტელოზე გამონაყარს კანგე;
- გ) ძლიერ ტკივილებს მენჯის არეში;
- დ) ბერისილს და შეგუბებას ენერე სისტემაში;
- * ე) ღებინებას და სპაზმებს.

550. როგორი ენა ახასიათებს პრეპარატ იპეკაკუანას?

- ა) გეოგრაფიული ყვითელი ნალებით;
- * ბ) სუფთა ან მცურუექი თეთრი ნალებით;
- გ) მშრალი, წვრილი, კანკალებს, დაფარულია ყავისფერი ნალებით;
- დ) სქელი თეთრი ნალებით მთელ ენაზე;
- ე) ნალები დიაგონალზე.

551. რა შეგრძნებებს იწვევს პრეპარატი ირის ვერზიკოლორ საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში?

- ა) დაწოლის შეგრძნებას კუჭის არეში;
*ბ) წვის შეგრძნება მთელ საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში;
გ) სიცივის შეგრძნება მთელ საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში;
დ) დაბუქების შეგრძნება კუჭის არეში;
ე) ჩხვლები.

552. რა გავლენას ახდენს კალი ბიქრომიკა ლორწოვან გარსებზე?

- *ა) ლორწოს გამოყოფის მომატება;
ბ) ლორწოვანების სიმშრალე;
გ) წვის შეგრძნება;
დ) მოყინვის შეგრძნება;
ე) სიცივის შეგრძნება.

553. როგორი ფსიქოლოგიური სურათი ახასიათებს აკონიტს?

- ა) მშვიდი, გაწონასწორებული ადამიანი;
ბ) მშვიდი განწყობა იცვლება მხიარულებით;
გ) მხიარული ხასიათი და მოუსვენრობა;
*დ) შიშის ძლიერი გრძნობა, მოწყენილობა და მოუსვენრობა;
ე) გაღიმიანებაღობა და ცვალებაღი მოწყენილობა.

554. რისი შიში ახასიათებს აკონიტს ყველაზე მეტად?

- ა) ცხოველების;
*ბ) სიკვდილის;
გ) სიმაღლის;
დ) ქალების;
ე) წყლის.

555. როგორი სახის ფერი აქვს ბელალონას ტიპის ადამიანს თავის ტკიფილის დროს?

- ა) მიწისფერი;
ბ) შეუცვლელი;
*გ) გაწითლებული;
დ) მოყვითალი;
ე) ფერმკრთალი.

556. როგორი ტრაქმის დროს იხმარება ლედუმი?

- ა) მოტებილობის;
*ბ) ნაჩხვლეგი ჭრილობის;
გ) ნაკვეთი ჭრილობის;
დ) დაქექილობის;
ე) ნაფლეთი ჭრილობის დროს.

557. რა დამოკიდებულება აქვს აპისის ტიპის ადამიანს გარემო ტემპერატურასთან?

- ა) ვერ იტანს მშრალ სიცივეს;
*ბ) ვერ იტანს სითბოს;
გ) ვერ იტანს ნესტიან სიცივეს;
დ) ნებისმიერი ტემპერატურის დროს თავს კარგად გრძნობს;
ე) ვერ იტანს ორპირ ქარს.

558. რა გავლენას ახდენს პრეპარატი ბელალონა ადამიანის თვალებზე?

- *ა) გუგების გაფართოვება;
ბ) სკლერების სიყვითლე;
გ) ცისფერი სკლერები;
დ) გუგების შევიწროვება;
ე) ჩაწითლებული თვალები.

559. რომელ ორგანოებზე მოქმედებს პრეპარატი ბერბერისი უმეტეს შემთხვევებში?

- ა) თვალები და ყურები;
ბ) თავის ტვინი და გული;
*გ) თირკმელები და შარდის ბუშტი;
დ) ელენთა;
ე) სასქესო ორგანოები.

560. ჩვეულებრივ დაბვალების რომელ სტადიაში ნიშნავენ აკონიტს?

- *ა) მწვავე პერიოდის დასაწყისი;

- ბ) დაავალების ქრონიკული სტადიაზ;
გ) გამოჯანმრთელების პროცესის დაწყებისას;
ღ) ექსედაციური პროცესის ჩამოყალიბების დროს;
ჟ) რეკონვალესცენციის პროცესში.

561. რომელ სამყაროს განეკუთვნება აურემ მეტალიკუმი და კუპრუმი?

- ა) მარილები;
ბ) მცენარეული სამყარო;
* გ) შეტალები;
ღ) ცხოველური სამყარო;
ჟ) მეავეები.

562. როგორ ვითარდება კალკარეა ფოსფორიკას ტიპის ბავშვი?

- ა) ვითარდება ნორმის ფარგლებში;
ბ) ვაღაბე ადრე ამოსდის კბილები;
* გ) გვიან ამოსდის კბილები, ყიფლიბანდი გვიან ეხურება;
ღ) ჩონჩხის ადრეული გაძვლოვანება;
ჟ) აღრე ეხურება ყიფლიბანდი.

563. როგორი გუნდი განწყობილება ეუფლება აურემ მეტალიკუმის ტიპის აღამინას პათოლოგიის დროს?

- ა) აგრესიული ხდება;
ბ) მხიარულია;
გ) ცვალებადი ხასიათი უხდება;
* ღ) ღრმა მელანქოლია ან დეპრესია;
ჟ) ტირის მაგრამ დამშვილებისას წყნარდება.

564. სხეულის რომელ ნაწილზე მოქმედებს უპირატესად ესკულუსი?

- ა) თვალებზე;
ბ) ყერებზე;
გ) ნაწლავების ქვედა ნაწილზე;
* ღ) ქვემო კილურებზე;
ჟ) ღვიძლებზე.

565. როგორი ტრავმის დროს იხმარება სტაფიტაგრია?

- ა) მოგებილობა;
ბ) დაევეილობა;
გ) ნაჩხვლები ჭრილობა;
* ღ) ნაკვეთი ჭრილობა;
ჟ) ნაფლეთი ჭრილობა.

566. რა საკვები პროცესი იწვევს მდგომარეობის გაუარესებას პრეპარატ ალემინას შემთხვევაში?

- ა) პერი;
ბ) ხორცი;
* გ) კარტოფილი;
ღ) რძე;
ჟ) ვაშლი.

567. რა სახის საკვებისადმი აქვს მიღრეკილება პრეპარატ ალემინას ტიპის პაციენტს?

- ა) უყვარს ხილი;
* ბ) ჭამს საკვებად უვარვის საგნებს;
გ) უყვარს მარილიანი;
ღ) ჭამს ტებილეულს;
ჟ) ცხიმიან საკვებს.

568. როგორ იტანს შეკრულობას კალკარეა კარბონიკის ტიპის ბავშვი?

- * ა) შეკრულობის დროს თავს კარგად გრძნობს;
ბ) შეკრულობის დროს თავს სუსტად გრძნობს;
გ) საერთო მდგომარეობა არ იცვლება;
ღ) ღიზიანდება და ტირის;
ჟ) მუცელი სტკივა და ლოგინიდან არ დგება.

569. როგორი ხასიათის ტკივილი ახასიათებს პრეპარატ აკონიტს?

- * ა) აუგანელი, მწვავე, თან ახლავს უკიდურესი გაღიმიანება;
ბ) ყრჯ;

- გ) დამდლელი, გამომფიტავი;
დ) ჩხელეგითი 2სთ-იანი პერიოდულობით;
ე) დაწოლითი.

570. რომელი საკეთი პროცესის სურვილი უჩნდება კალკარუბ კარბონიკის ფიბის აღამიანს ავალმყოფობის დროს?

- ა) ვაშლი;
*ბ) კვერცხი;
გ) ხორცი;
დ) რძე;
ე) მსხალი.

571. როდის სუსტდება ტკივილი ბრიონის ფიბის აღამიანებში?

- ა) ცივ წყალში ბანაობის დროს;
ბ) მოძრაობის დროს;
*გ) სრულ მოსვენებულ მდგომარეობაში;
დ) ცივ წყალში ბანაობის შემდეგ;
ე) ქარიან ამინდში სეირნობის შემდეგ.

572. ძირითადად რა მოვლენებს იწვევს პრეპარატი აპისი ორგანიზმში?

- ა) ფრჩხილების გაყოფას;
ბ) ფალარაის;
*გ) სხვადასხვა ნაწილების შეშუპებას;
დ) თმების ცვენას;
ე) თავის ტკივილს.

573. რა ემართება არგენტუმ ნიტრიკუმის ფიბს საპასუხისმგებლო მოვლენის წინ?

- ა) ეწყება თავის ტკივილი;
*ბ) ემართება ფალარათი;
გ) უწითლდება თვალები;
დ) ვარდება კოლაფსმი;
ე) იწყებს უაბრო სიცილს.

574. რა დამოკიდებულება აქტს დროსთან არგენტუმ ნიტრიკუმის ფიბის აღამიანს?

- ა) სულ ჩქარობს;
ბ) არანაირი დამოკიდებულება არა აქტს;
გ) ვერ გრძნობს დროის ფაქტორს;
*დ) დრო მიღის ძალიან ნელა;
ე) დრო მიღის ძალიან ჩქარა.

575. რისი შიში ახასიათებს ბორაჯისის ფიბის აღამიანებს?

- ა) წყლის;
*ბ) ქვემოთ გადაბალვილების;
გ) ზემოთ ასვლის ან მოძრაობის;
დ) ძალლების;
ე) მაღალი სახლების.

576. როდის ძლიერდება ტკივილი ბრიონის ფიბის აღამიანებში?

- ა) მოსვენებულ მდგომარეობაში;
ბ) ხმაურის დროს;
*გ) მოძრაობის დროს;
დ) თბილი აძლიკაციების შემდეგ;
ე) ბანაობის შემდეგ.

577. რა დამოკიდებულება აქტს ტკივილი არგენტუმ ნიტრიკუმის ფიბის აღამიანს?

- ა) ებიზღება;
ბ) არ უყვარს;
*გ) უყვარს მაგრამ მდგომარეობას აუარესებს;
დ) გულგრილია;
ე) დამე ჭამს ბევრ ტკივილს.

578. როგორი პელსია დამახასიათებელი აკონიფისთვის?

- *ა) საქსე, მაგარი, ცვალებადი;
ბ) ძაფისებრი;
გ) სუსტი, ბრადიკარდიული;

- დ) სესფი, მოციმციმე არითმია;
ე) ბიგემინია.

579. როგორია აკონიფის მოქმედების ამორჩული ადგილი ფილტრის დაზიანებისას?

- * ა) მარცხენა ფილტვის ბედა წილი;
ბ) მარჯვენა ფილტვის შეა წილი;
გ) მარჯვენა ფილტვის ქვედა წილი;
დ) მარცხენა ფილტვის ქვედა წილი;
ე) ორივე ქვედა წილი.

580. განსაკუთრებით რისი შიში ახასიათებს არგენტუმ ნიტრიკუმის ტიპის ადამიანს?

- ა) ცეცხლის;
* ბ) სიმაღლის;
გ) ძაღლების;
დ) სიბნელის;
ე) კაფების.

581. როგორი ტრაქმის დროს იხმარება არნიკა უპირატესად?

- * ა) დაჟეჟილობის;
ბ) ნაჩხვლები ჭრილობის;
გ) ნაკვეთი ჭრილობის;
დ) გახსნილი სისხლმდენი ჭრილობის;
ე) მოგეხილობის.

582. როგორი დასაწყისი აქვს აკონიფის დაავალებებს?

- ა) თანდათან ვითარდება და ასევე ქრება;
* ბ) მოუღოძნელად ჩნდება და სწრაფად ვითარდება ძლიერად;
გ) თანდათან ვითარდება;
დ) მოუღოძნელად ჩნდება და ნელ-ნელა ქრება;
ე) ნელა ვითარდება, მაგრამ სწრაფად ქრება.

583. როგორ გრძნობს თავს არნიკას ტიპის პაციენტი საწოლში?

- ა) ნებისმიერი მოსწონის;
ბ) საწოლი ძალიან რბილი ეზენება;
გ) ცივა თბილი საბნის ქვეშ;
* დ) საწოლი ძალიან მაგარი ეზენება;
ე) ოფლიანდება საბნის მცირელი მიკარების შემდეგ.

584. წნევის მომატების რა შემთხვევაშია ნაჩყენები აკონიფი უფრო ხშირად?

- ა) თავის ტკივილის დროს;
ბ) კუჭის წყლელის დროს;
* გ) წნევის მომატება ორგანული დაბიანების გარეშე;
დ) სისხლძარღვების შორსწასული ათერისკლერობის დროს;
ე) არტერიული ჰიპერტენზია თირკმლის დაბიანების დროს.

585. საშვილოსნოს ტკივილის რა ირადიაცია ახასიათებს აქტერა რაცემობას?

- ა) გადადის მკერდის არეში;
ბ) გადადის კულესუნში;
გ) გადადის ბარბაყში ქვემოთ მუხლამდე მარცხნივ;
* დ) გადადის მუცელის ერთი მხრიდან მეორეში;
ე) გადადის ბარბაყში ქვემოთ მუხლამდე მარჯვნივ.

586. დღის რა მონაკვეთში უარესდება პრეპარატ აკონიფის საერთო მდგომარეობა?

- ა) 23 სთ-გვ;
* ბ) შეაღამისას;
გ) 16-დან 20 სთ-მდე;
დ) დღის 3 სთ-გვ და დღის 15 სთ-გვ;
ე) საღამოს 9 სთ-გვ.

587. რომელ პრეპარატს აქვს პათოგენებში პოსტრავმული პროფეტული სისხლდენა?

- ა) ცინა, ეტება, იპეკაკუანა;
ბ) სეპია, ციკლამენ, ტბაბაკუმი;
* გ) მილეფოლიუმი, არნიკა, ხამამელისი;
დ) ბრიონია, იპეკაკუანა, კოლხიკუმ;

ე) არგენტინიუმ, იგნაცია, აპისი.

588. რომელი პრეპარატი იხმარება უფრო ხშირად ახლობლების, საყვარელი აღამიანების დაკარგვით გამოწვეული დარღის დროს?

- ა) ლელუმი, ბერბერისი;
- ბ) ანგიმონიუმ ტარტარიკუმი, ბრიონია;
- *გ) იგნაცია, ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) სიფილინუმ, აპისი;
- ე) ხამამელის, კარბო ვეგეტაბილის.

589. რომელ პრეპარატს აქვს პათოგენეზში ცხვირიდან სისხლდენა მენტესის დათრგუნვის შემდეგ?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- *ბ) ბრიონია;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) აგარიკუსი;
- ე) მეტერუუმ.

590. რომელი პრეპარატის პათოგენეზში გვხვდება კილურების მშრალი განგრენა?

- ა) ცინა, გრაფიტი;
- ბ) ბელადონა, აკონიფი;
- *გ) სეკალე კორნუტუმ, არსენიკი;
- დ) გრაფიტი, ლელუმი;
- ე) მედორინუმ, ლუებინუმი.

591. რომელი პრეპარატი იხმარება მშის დაკვრის დროს?

- *ა) გლობონინი, გელბერტინი, ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- ბ) სილიცია, კოქელუსი, ლიოსკორებ;
- გ) არსენიკი, ბოვისტა, კანგარის;
- დ) ვერაბრუუმ ალბუმ, ანაკარდიუმ, ხამომილა;
- ე) ხელიდონიუმ, მერკურ კორომივუს, კამფორა.

592. რომელი პრეპარატი იხმარება ემოციური ფალარათის დროს?

- ა) კაკტუსი, სეპია;
- ბ) ირის ვერბიკოლორ, აურუმ;
- *გ) გელბერტინი, ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- დ) კალკარეა კარბონიკა, გრაფიტი;
- ე) ალუმინია, ლახებისი.

593. რომელი პრეპარატის ტიპს არ შეუძლია მოშარდვა უცხო აღამიანების თანდასწრებით?

- ა) სულფური, ფოსფორი;
- ბ) ალუმინია, გრაფიტი;
- *გ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ, ამბრა გრიბეა;
- დ) სეპია, იგნაცია;
- ე) ამონიუმ კარბონიკუმ, ბრომი.

594. რომელ პრეპარატს აქვს პათოგენეზში განრისხების დათრგუნვის შედეგად განვითარებული პრობლემები?

- ა) რუსა;
- ბ) ფერუუმ მეტალიკუმ;
- *გ) სტაფიბაგრია;
- დ) ლაუროცერასუს;
- ე) როდოდენდრონი.

მკურნალების შერჩევა ჰომეოპათიური ცნობარის მიხედვით

595. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიგმრება, რომ მას ამპუტირებული აქვს ფეხი?

- *ა) აფროპინი;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბელადონა;
- დ) ამბრა გრიბეა;
- ე) კალმიუმ მეტალიკუმ.

596. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიგმრება რომ მას ამპუტირებული აქვს ხელი?

- ა) აფროპინი;
- *ბ) ლობელია;

- გ) ბელადონა;
- დ) ამბრა გრიზეა;
- ე) კალმიუმ მეტალიკუმ.

597. რომელი პრეპარატი ინიშნება,თუ პაციენტს ესიმმრება რომ გარბის?

- ა) აფროპინი;
- ბ) ლობელია;
- * გ) ბელადონა;
- დ) ამბრა გრიზეა;
- ე) კალმიუმ მეტალიკუმ.

598. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, თითქოს იგი ბემოთ-ქვემოთ დარბის?

- ა) აფროპინი;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბელადონა;
- * დ) ამბრა გრიზეა;
- ე) კალმიუმ მეტალიკუმ.

599. რომელი პრეპარატი ინიშნება,თუ პაციენტს ესიმმრება როგორ მისდევს ვიღაცს?

- ა) აფროპინი;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბელადონა;
- დ) ამბრა გრიზეა;
- * ე) კალმიუმ მეტალიკუმ.

600. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ,თუ პაციენტი სიმმარში უშედეგოდ ცდილობს ილაპარაკოს?

- * ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) ინდიგო;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმ;
- ე) ანაკარდიუმ.

601. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ,თუ პაციენტი სიმმარში უშედეგოდ ცდილობს გაადოს პირი?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- * ბ) აგარიკუს;
- გ) ინდიგო;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმ;
- ე) ანაკარდიუმ.

602. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ,თუ პაციენტი სიმმარში უშედეგოდ ცდილობს გაექცეს მოსალოდნელ საშიშროებას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- * გ) ინდიგო;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმ;
- ე) ანაკარდიუმ.

603. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს თითქოს ორსულდად არის?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) ინდიგო;
- * დ) აციდუმ პიკრიკუმ;
- ე) ანაკარდიუმ.

604. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს რომ მას თმები გასცეიდა?

- * ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) ინდიგო;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმ;
- ე) ანაკარდიუმ.

605. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს რომ მისი სახე დაფარულია ჩირქოვანი პუსტულებით?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) ინდიგო;

დ) აცილებ პიკრიკუმ;

* ე) ანაკარდიუმ.

606. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს თითქოს მას თავბრუსხვევა აწებებს?

ა) სილიცეა;

ბ) ციმიციფეგა;

გ) ფიზოსტიგმა;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;

ე) არსენიკუმ ალბუმ.

607. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს რომ კიდურები აქვს მოტეხილი?

ა) სილიცეა;

* ბ) ციმიციფეგა;

გ) ფიზოსტიგმა;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;

ე) არსენიკუმ ალბუმ.

608. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი სიმმარში ხედავს რომ იგი ბრმა არის?

ა) სილიცეა;

ბ) ციმიციფეგა;

* გ) ფიზოსტიგმა;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;

ე) არსენიკუმ ალბუმ.

609. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება სუნიანი, დამპალი წყალი?

ა) სილიცეა;

ბ) ციმიციფეგა;

გ) ფიზოსტიგმა;

* დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;

ე) არსენიკუმ ალბუმ.

610. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება შავი წყალი?

ა) სილიცეა;

ბ) ციმიციფეგა;

გ) ფიზოსტიგმა;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;

* ე) არსენიკუმ ალბუმ.

611. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ იგი ჩააგდეს საფლავში?

* ა) მაგნებია კარბონიკა;

ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;

გ) ფერუმ იოდ;

დ) რუს ჭოჭის;

ე) კონიუმი.

612. .რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ იგი მოთხვრილია ექსკრემენტებით?

ა) მაგნებია კარბონიკა;

* ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;

გ) ფერუმ იოდ;

დ) რუს ჭოჭის;

ე) კონიუმი.

613. .რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ იგი დასველდა წვიმაში?

* ა) მაგნებია კარბონიკა;

ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;

გ) ფერუმ იოდ;

დ) რუს ჭოჭის;

ე) კონიუმი.

614. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ იგი ძალიან მაღალია?

ა) მაგნებია კარბონიკა;

ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;

* გ) ფერუმ იოდ;

დ) რუს ჭოჭის;

ე) კონიუმი.

615. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ მას ვიდაცის ხმა ეძახის?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ფერუმ იოდ;
- *დ) რუს ტოქსი;
- ე) კონიუმი.

616. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, რომ მას მტრები მოსდევენ?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ფერუმ იოდ;
- დ) რუს ტოქსი;
- *ე) კონიუმი.

617. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, რომ მას მოჩვენებები მოსდევენ?

- *ა) სილიცია;
- ბ) მაგნეზია მურიატიკა;
- გ) აპისი;
- დ) სელენიუმ;
- ე) ოპიუმ.

618. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, რომ მას ყაჩაღები, მბარცველები მოსდევენ?

- ა) სილიცია;
- *ბ) მაგნეზია მურიატიკა;
- გ) აპისი;
- დ) სელენიუმ;
- ე) ოპიუმ.

619. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ იგი ქალიშვილია?

- ა) სილიცია;
- ბ) მაგნეზია მურიატიკა;
- გ) აპისი;
- დ) სელენიუმ;
- ე) ოპიუმ.

620. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება საქმეები, რომლების გაკეთებაც დღის განმავლობაში დაავიწყდა?

- ა) სილიცია;
- ბ) მაგნეზია მურიატიკა;
- გ) აპისი;
- *დ) სელენიუმ;
- ე) ოპიუმი.

621. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება დრაკონები?

- ა) სილიცია;
- ბ) მაგნეზია მურიატიკა;
- გ) აპისი;
- დ) სელენიუმ;
- *ე) ოპიუმ.

622. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ, თუ პაციენტს ესიმმრება შავი ცხოველები?

- *ა) არნიკა, პულსატილა;
- ბ) სილიცია;
- გ) ბოვისტა, ცინხონა;
- დ) ცინხონა, სეპია;
- ე) სარსაპარილა.

623. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ, თუ პაციენტს ესიმმრება მიწისძვრა?

- ა) არნიკა, პულსატილა;
- *ბ) სილიცია;
- გ) ბოვისტა, ცინხონა;
- დ) ცინხონა, სეპია;
- ე) სარსაპარილა.

624. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ, თუ პაციენტს ესიზმრება, რომ მას გვეღვია კბენენ?

- ა) არნიკა, პულსატილა;
- ბ) სილიცეა;
- * გ) ბოვისფა, ცინქონა;
- დ) ცინქონა, სეპია;
- ე) სარსაპარილა.

625. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ, თუ პაციენტს ესიზმრება მას გაუპატიურების საშიშროება ელის?

- ა) არნიკა, პულსატილა;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ბოვისფა, ცინქონა;
- * დ) ცინქონა, სეპია;
- ე) სარსაპარილა.

626. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ, თუ პაციენტს ესიზმრება კაფასტროფა?

- ა) არნიკა, პულსატილა;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ბოვისფა, ცინქონა;
- დ) ცინქონა, სეპია;
- * ე) სარსაპარილა.

627. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება რომ ლოგინი პატარაა?

- * ა) ფერუშ იოდ;
- ბ) ჰლაფინა;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) არნიკა;
- ე) ლახეზის.

628. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება სისხლისდერა?

- ა) ფერუშ იოდ;
- * ბ) ჰლაფინა;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) არნიკა;
- ე) ლახეზის.

629. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება რომ ელვა მოხვდა ჭექა-ჭეხილის დროს?

- ა) ფერუშ იოდ;
- ბ) ჰლაფინა;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- * დ) არნიკა;
- ე) ლახეზის.

630. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება საკუთარი დასაფლავება?

- ა) ფერუშ იოდ;
- ბ) ჰლაფინა;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) არნიკა;
- * ე) ლახეზის.

631. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება, რომ ჭიაყელებს აღებინებს?

- * ა) ხინიუშ;
- ბ) ნაია;
- გ) ხაფრიუშ კარბონიუშ;
- დ) არნიკა, პულსატილა;
- ე) არნიკა.

632. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიზმრება თვითმკვლელობა?

- ა) ხინიუშ;
- * ბ) ნაია;
- გ) ხაფრიუშ კარბონიუშ;
- დ) არნიკა, პულსატილა;
- ე) არნიკა.

633. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, რომ აქვს ქორწილი თრ ქალთან?

- ა) ხინიური;
- ბ) ნაია;
- * გ) ნაფრიური კარბონიკური;
- დ) არნიკა, პულსატილა;
- ე) არნიკა.

634. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება შავი ძაღლები?

- ა) ხინიური;
- ბ) ნაია;
- გ) ნაფრიური კარბონიკური;
- * დ) არნიკა, პულსატილა;
- ე) არნიკა.

635. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება, რომ კანი ააგლიჯეს?

- ა) ხინიური;
- ბ) ნაია;
- გ) ნაფრიური კარბონიკური;
- * დ) არნიკა, პულსატილა;
- ე) არნიკა.

636. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება ტარაკანები?

- * ა) კოკა, კრეოზოფურუმი;
- ბ) არსენიკური ალბური, აურური;
- გ) კანგარის, პტელეა;
- დ) აპისი;
- ე) იოდი.

637. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება სიბნელე?

- ა) კოკა, კრეოზოფურუმი;
- * ბ) არსენიკური ალბური, აურური;
- გ) კანგარის, პტელეა;
- დ) აპისი;
- ე) იოდი.

638. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება ბრბო?

- ა) კოკა, კრეოზოფურუმი;
- ბ) არსენიკური ალბური, აურური;
- * გ) კანგარის, პტელეა;
- დ) აპისი;
- ე) იოდი.

639. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ ცხელ იატაკზე დადის?

- ა) კოკა, კრეოზოფურუმი;
- ბ) არსენიკური ალბური, აურური;
- გ) კანგარის, პტელეა;
- * დ) აპისი;
- ე) იოდი.

640. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ესიმმრება რომ დადის ფალახში, ექსკრუმენტებზე?

- ა) კოკა, კრეოზოფურუმი;
- ბ) არსენიკური ალბური, აურური;
- გ) კანგარის, პტელეა;
- დ) აპისი;
- * ე) იოდი.

641. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი ხედავს ღმერთს?

- * ა) ეთერი;
- ბ) სფრამთნიური;
- გ) სფრამთნიური, ვერაფრური;
- დ) კანაბის ინდიკა, სფრამთნიური;
- ე) ახგუსტურა ვერა.

642. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ იგი ჯერ ღმერთია, ხოლო შემდეგ ეშმაკი?

- ა) ეთერი;
*ბ) სტრამონიუმ;
გ) სტრამონიუმ, ვერატრუმ;
დ) კანაბის ინდიკა, სტრამონიუმი;
ე) ანგუსტურა ვერა.

643. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი აცხადებს, რომ მას კავშირი აქვს დმერთთან?

- ა) ეთერი;
ბ) სტრამონიუმ;
*გ) სტრამონიუმ, ვერატრუმ;
დ) კანაბის ინდიკა, სტრამონიუმი;
ე) ანგუსტურა ვერა.

644. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი აცხადებს, რომ იგი ღვთისმშობელია?

- ა) ეთერი;
ბ) სტრამონიუმ;
გ) სტრამონიუმ, ვერატრუმ;
*დ) კანაბის ინდიკა, სტრამონიუმი;
ე) ანგუსტურა ვერა.

645. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი დარწმუნებულია, რომ ის არასოდეს გაიღვიძებს?

- ა) ეთერი;
ბ) სტრამონიუმ;
გ) სტრამონიუმ, ვერატრუმ;
დ) კანაბის ინდიკა, სტრამონიუმი;
*ე) ანგუსტურა ვერა.

646. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი ამბობს, რომ ყველა დაბვადებით არის ავალ?

- *ა) აურუმ მეტალიკუმ, სტრამონიუმ;
ბ) ვერატრუმ ვირიდე;
გ) კალი ბრომი;
დ) კანაბის ინდიკა;
ე) მეტერუუმ.

647. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი ამბობს, რომ იგი ყრუა, მუნჯი და დაბვადებულია კიბოთი?

- ა) აურუმ მეტალიკუმ, სტრამონიუმ;
*ბ) ვერატრუმ ვირიდე;
გ) კალი ბრომი;
დ) კანაბის ინდიკა;
ე) მეტერუუმ.

648. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ მისი სხეულის ნაწილები გამრდილია?

- ა) აურუმ მეტალიკუმ, სტრამონიუმ;
ბ) ვერატრუმ ვირიდე;
*გ) კალი ბრომი;
დ) კანაბის ინდიკა;
ე) მეტერუუმ.

649. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი ამბობს, რომ იყო მარადიულობაში, იმქვეყნიურ ცხოვრებაში?

- ა) აურუმ მეტალიკუმ, სტრამონიუმ;
ბ) ვერატრუმ ვირიდე;
გ) კალი ბრომი;
*დ) კანაბის ინდიკა;
ე) მეტერუუმ.

650. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ მეჭეჭები აქვს?

- ა) აურუმ მეტალიკუმ, სტრამონიუმ;
ბ) ვერატრუმ ვირიდე;
გ) კალი ბრომი;
დ) კანაბის ინდიკა;
*ე) მეტერუუმ.

651. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი ხედაქს გოლიათებს?

- *ა) ბელადონა;

- ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

652. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება სახრჩობელა?

- * ა) ბელადონა;
- ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

653. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ ხედავს გამდინარე წყალს?

- ა) ბელადონა;
- ბ) საბალილა;
- * გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

654. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი დარწმუნებულია, რომ იგი ჯადოქარია?

- * ა) ბელადონა;
- ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

655. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ ყველა მფერია?

- ა) ბელადონა;
- ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- * დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

656. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ მისი სხეული გამომშრალია?

- ა) ბელადონა;
- * ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- ე) კროტალუს.

657. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ თვალები უვარღება ორბიგებილან?

- ა) ბელადონა;
- ბ) საბალილა;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) მერკურ, პლატინა;
- * ე) კროტალუს.

658. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ არ შეუძლია გადაყდაპვა?

- * ა) ლიბინუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ნაია;
- დ) კურარე;
- ე) გლონოინუმ.

659. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ იგი ჯუჯად?

- ა) ლიბინუმ;
- * ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ნაია;
- დ) კურარე;
- ე) გლონოინუმ.

660. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ იგი შიმშილობს?

- ა) ლიბინუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;

- * გ) ნაია;
- დ) კურარე;
- ე) გლობოინუმ.

661. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ ყველაფერი ბინძურია?

- ა) ლიზინუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ნაია;
- * დ) კურარე;
- ე) გლობოინუმ.

662. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება და აცხადებს, რომ ქვედა ტუჩი შეშუპებული აქვს?

- ა) ლიზინუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ნაია;
- დ) კურარე;
- * ე) გლობოინუმ.

663. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება და აცხადებს, რომ სახლები ეცემა თავზე?

- * ა) საბადილა;
- ბ) სტაფიბაგრია;
- გ) აცილებ ფლუორიკუმ;
- დ) ტებერკულინუმ;
- ე) ციკლამენ.

664. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ ცოლი გაექცევა?

- ა) საბადილა;
- * ბ) სტაფიბაგრია;
- გ) აცილებ ფლუორიკუმ;
- დ) ტებერკულინუმ;
- ე) ციკლამენ.

665. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ იყო მიწისძვრა?

- ა) საბადილა;
- ბ) სტაფიბაგრია;
- * გ) აცილებ ფლუორიკუმ;
- დ) ტებერკულინუმ;
- ე) ციკლამენ.

666. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ ოთახი ძალიან დიდია?

- ა) საბადილა;
- ბ) სტაფიბაგრია;
- გ) აცილებ ფლუორიკუმ;
- * დ) ტებერკულინუმ;
- ე) ციკლამენ.

667. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი შეცდომით თვლის, რომ ოთახი ძალიან პატარაა?

- ა) საბადილა;
- ბ) სტაფიბაგრია;
- გ) აცილებ ფლუორიკუმ;
- დ) ტებერკულინუმ;
- * ე) ციკლამენ.

668. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ კილურები არა აქვთ?

- * ა) სტრამონიუმი;
- ბ) საბადილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ცინკებ მეტალიკუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

669. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ კილურები მოტეხილი აქვს?

- ა) სტრამონიუმი;
- * ბ) საბადილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;

დ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
ე) ნუქს ვომიკა.

670. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ იგი დედოფალია?

- ა) სტრამონიუმი;
- ბ) საბალილა;
- *გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

671. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ ლოგინი ქანაობს წინ და უკან?

- ა) სტრამონიუმი;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- *დ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

672. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ ვიღაცამ დაიკავა მისი ლოგინი და აღგიღი აღარ დარჩა?

- ა) სტრამონიუმი;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- *ე) ნუქს ვომიკა.

673. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის ვიღაცა წევს მის გვერდით?

- *ა) პეტროლეუმი;
- ბ) ლაკ კანინუმი;
- გ) ნაფრიუმ ფოსფორიკუმი;
- დ) მეტერეუმი;
- ე) სულფურ.

674. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის რომ ავეჯი აღამიანებად არის ქცეული?

- ა) პეტროლეუმი;
- ბ) ლაკ კანინუმი;
- *გ) ნაფრიუმ ფოსფორიკუმი;
- დ) მეტერეუმი;
- ე) სულფურ.

675. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის რომ მისი ტვინი გამაგრებულია?

- ა) პეტროლეუმი;
- ბ) ლაკ კანინუმი;
- გ) ნაფრიუმ ფოსფორიკუმი;
- *დ) მეტერეუმი;
- ე) სულფურ.

676. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ ტვინში ბურჟის აქტეს?

- ა) პეტროლეუმი;
- ბ) ლაკ კანინუმი;
- გ) ნაფრიუმ ფოსფორიკუმი;
- დ) მეტერეუმი;
- *ე) სულფურ.

677. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ მოუწევს მონასტერში წასვლა?

- *ა) ლაკ დეფლორატეუმი;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ანაკარდიუმი;
- ე) ჰიოსციამუს.

678. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ მისი სათესლე ჯირკვალი გასივებულია?

- ა) ლაკ დეფლორატეუმი;
- *ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ანაკარდიუმი;

ე) ჰითსციამუს.

679. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ მარმარილოს ძეგლს წარმოადგენს?

- ა) ლაკ დეფლორატუმ;
- ბ) საბალილა;
- * გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ანაკარდიუმ;
- ე) ჰითსციამუს.

680. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ მისი ქმარი სხვაა?

- ა) ლაკ დეფლორატუმ;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- * დ) ანაკარდიუმ;
- ე) ჰითსციამუს.

681. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს ასოები ჭიანჭველებად ეზვენება?

- ა) ლაკ დეფლორატუმ;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) ანაკარდიუმ;
- * ე) ჰითსციამუს.

682. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი თვლის, რომ ლოგინი სავსეა ჭიანჭველებით?

- ა) ლაკ დეფლორატუმ;
- ბ) საბალილა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- * დ) პლუმბუმ;
- ე) ჰითსციამუს.

683. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ელოდება ცუდ ახალ ამბებს?

- * ა) ასტერიას;
- ბ) ლიბინუმ, ვალერიანა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) პიროგენიუმ;
- ე) ბელადონა.

684. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ელოდება სასიამოვნო ახალ ამბებს?

- ა) ასტერიას;
- * ბ) ლიბინუმ, ვალერიანა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) პიროგენიუმ;
- ე) ბელადონა.

685. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის, რომ მისი ფეხები ზელმეტად გრძელია?

- ა) ასტერიას;
- ბ) ლიბინუმ, ვალერიანა;
- * გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) პიროგენიუმ;
- ე) ბელადონა.

686. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის, რომ მას ბევრი ფეხი და ხელი აქვს?

- ა) ასტერიას;
- ბ) ლიბინუმ, ვალერიანა;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- * დ) პიროგენიუმ;
- ე) ბელადონა.

687. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს საკუთარი ხელის თითების ფრჩხილები ეზვენება ძალიან დიდად, თითქოს თევზებია?

- ა) ასტერიას;
- ბ) ლიბინუმ, ვალერიანა;
- * გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) პიროგენიუმ;

ე) ბელადონა.

688. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს ეზვენება, რომ მისი ცხვირი გამჭვირვალეა?

- ა) ასტერინი;
- ბ) ლიბინუმ, ვალერიანი;
- გ) კანაბის ინდიკა;
- დ) პიროგენიუმ;
- *ე) ბელადონა.

689. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის რომ მისი თაფი გარემოცულია ცეცხლით?

- *ა) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ლაკ კანინუმ;
- დ) აგარიკელი;
- ე) ვერატრუმ ალბუმ.

690. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის რომ იგი მოჯადოვებულია?

- ა) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- *ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ლაკ კანინუმ;
- დ) აგარიკელი;
- ე) ვერატრუმ ალბუმ.

691. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის რომ ხედავს ობობებს?

- ა) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- *გ) ლაკ კანინუმ;
- დ) აგარიკელი;
- ე) ვერატრუმ ალბუმ.

692. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის რომ მთელი სხული დაპატარავებული აქვს?

- ა) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ლაკ კანინუმ;
- *დ) აგარიკელი;
- ე) ვერატრუმ ალბუმ.

693. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი თვლის რომ იგი კიბოთი არის დაძვალებული?

- ა) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) კანაბის ინდიკა;
- გ) ლაკ კანინუმ;
- დ) აგარიკელი;
- *ე) ვერატრუმ ალბუმ.

694. რომელ პრეპარატებს ახასიათებს ფალარათი დილის 5 საათზე?

- *ა) ფოსფორი, სულფური;
- ბ) ფერუმი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- დ) აკონიტუმ, დულკამარა;
- ე) ანგიმონიუმ კრულუმ.

695. რომელ პრეპარატებს ახასიათებს ფალარათი დილის 8 საათზე?

- ა) ფოსფორი, სულფური;
- *ბ) ფერუმი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- დ) აკონიტუმ, დულკამარა;
- ე) ანგიმონიუმ კრულუმ.

696. რომელ პრეპარატებს ახასიათებს ფალარათი დილის 9 საათზე?

- ა) ფოსფორი, სულფური;
- ბ) ფერუმი;
- *გ) ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- დ) აკონიტუმ, დულკამარა;
- ე) ანგიმონიუმ კრულუმ.

697. რომელი პრეპარატის იხმართ ფალარათის შემთხვევაში, თუ ის გამოწვეულია ცივი ქარის გემოქმედებით?

- ა) ფოსფორი, სულფური;
- ბ) ფერუმი;
- გ) ნაფრიუმ სულფურიკებ;
- *დ) აკონიტუმ, დუღვამარა;
- ე) ანტიმონიუმ კრუდემ.

698. რომელი პრეპარატი იხმარება მჟავე დვინით გამოწვეული ფალარათის დროს?

- ა) ფოსფორი, სულფური;
- ბ) ფერუმი;
- გ) ნაფრიუმ სულფურიკებ;
- დ) აკონიტუმ, დუღვამარა;
- *ე) ანტიმონიუმ კრუდემ.

699. რომელი პრეპარატი განკურნავს დილის უნებლიერ დეფეკაციას

- *ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) ჰიოსციამუსი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

700. რომელი პრეპარატი განკურნავს აღელვებით გამოწვეულ უნებლიერ დეფეკაციას?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- *ბ) ჰიოსციამუსი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

701. რომელი პრეპარატი განკურნავს უნებლიერ დეფეკაციას საკვების მიღების დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) ჰიოსციამუსი;
- *გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

702. რომელი პრეპარატი განკურნავს უნებლიერ დეფეკაციას, რომელიც აღინიშნება სიცილის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) ჰიოსციამუსი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- *დ) სულფური;
- ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

703. რომელი პრეპარატი განკურნავს უნებლიერ დეფეკაციას, რომელიც აღინიშნება ცემინების დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) ჰიოსციამუსი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- *დ) სულფური;
- ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

704. რომელი პრეპარატი განკურნავს ფორთოხლის მიღებით გამოწვეულ ფალარათს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) ჰიოსციამუსი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- *ე) აცილუმ ფოსფორიკუმ.

705. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტს ემართება უმტკიფნეულო ფალარათი დილით მხოლოდ ჭამის შემდეგ?

- *ა) ქინა;
- ბ) როდოდინდრონ;
- გ) გინგიბერ;
- დ) ესკულუს;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

706. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტს ყოველი ჭექა-ჭუხილის წინ ემართება ფალარათი?

- ა) ქინა;
- *ბ) როდოდენდრონ;
- გ) ბინგიბერ;
- დ) ესკულის;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

707. რომელი პრეპარატით ინკურნება ნესვის ჭამით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) ქინა;
- ბ) როდოდენდრონ;
- *გ) ბინგიბერ;
- დ) ესკულის;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

708. რომელი პრეპარატს იხმართ ჰექტიური ციებ-ცხელებით გამოწვეული ფალარათის დროს?

- ა) ქინა;
- ბ) როდოდენდრონ;
- გ) ბინგიბერ;
- *დ) ესკულის;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

709. რომელი პრეპარატით ინკურნება მოლუსკების მიღებით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) ქინა;
- ბ) როდოდენდრონ;
- გ) ბინგიბერ;
- დ) ესკულის;
- *ე) კარბო ვეგეტაბილის.

710. რომელი პრეპარატით ინკურნება შებოლილი ხორცის მიღებით გამოწვეული ფალარათი?

- *ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) ვერატრუმ ალბუმ;
- გ) ნექს ვომიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) საბალილა.

711. რომელი პრეპარატით ინკურნება კიტრის მიღებით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- *ბ) ვერატრუმ ალბუმ;
- გ) ნექს ვომიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) საბალილა.

712. რომელი პრეპარატით ინკურნება ნარკოტიკების მიღებით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) ვერატრუმ ალბუმ;
- *გ) ნექს ვომიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) საბალილა.

713. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დამწვრობით გამოწვეული ფალარათის დროს?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) ვერატრუმ ალბუმ;
- გ) ნექს ვომიკა;
- *დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) საბალილა.

714. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ იმ შემთხვევაში, თუ ფალარათი მეორდება ყოველ მეოთხე დღეს?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) ვერატრუმ ალბუმ;
- გ) ნექს ვომიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- *ე) საბალილა.

715. რომელი პრეპარატით ინკურნება შოკოლადით გამოწვეული ფალარათი?

- * ა) ლითოუმ, ბორაქს;
- ბ) მედორინუმი;
- გ) აცილუმ ნიტრიკუმ, ფიტოლაკა;
- დ) სეპია;
- ე) გელტემინუმ.

716. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ მატარებელში მგზავრობით გამოწვეული ფალარათის დროს?

- ა) ლითოუმ, ბორაქს;
- * ბ) მედორინუმი;
- გ) აცილუმ ნიტრიკუმ, ფიტოლაკა;
- დ) სეპია;
- ე) გელტემინუმ.

717. რომელი პრეპარატით ინკურნება ლიმონათით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) ლითოუმ, ბორაქს;
- ბ) მედორინუმი;
- * გ) აცილუმ ნიტრიკუმ, ფიტოლაკა;
- დ) სეპია;
- ე) გელტემინუმ.

718. რომელი პრეპარატით ინკურნება ბლფაში ბანაობით გამოწვეული ფალარათი?

- ა) ლითოუმ, ბორაქს;
- ბ) მედორინუმი;
- გ) აცილუმ ნიტრიკუმ, ფიტოლაკა;
- * დ) სეპია;
- ე) გელტემინუმ.

719. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ცედი ახალი ამბის გაგების შემდეგ განვითარებული ფალარათის დროს?

- ა) ლითოუმ, ბორაქს;
- ბ) მედორინუმი;
- გ) აცილუმ ნიტრიკუმ, ფიტოლაკა;
- დ) სეპია;
- * ე) გელტემინუმ.

720. რომელი პრეპარატი იხმარება ოფლიანობის დათრიგუნვით გამოწვეული ფალარათის დროს?

- * ა) აკონიტუმ;
- ბ) რუგა;
- გ) ოპიუმ;
- დ) ალოე;
- ე) არგენტუმ ნიტრიკუმ, არსენიკუმ ალბუმ.

721. რომელ პრეპარატს იხმართ მწეხარებით გამოწვეული უნებლივ დეფეკაციის დროს?

- ა) აკონიტუმ;
- ბ) რუგა;
- * გ) ოპიუმ;
- დ) ალოე;
- ე) არგენტუმ ნიტრიკუმ, არსენიკუმ ალბუმ.

722. რომელ პრეპარატს იხმართ სიარელით გამოწვეული უნებლივ დეფეკაციის დროს?

- ა) აკონიტუმ;
- ბ) რუგა;
- გ) ოპიუმ;
- * დ) ალოე;
- ე) არგენტუმ ნიტრიკუმ, არსენიკუმ ალბუმ.

723. რომელი პრეპარატით ინკურნება დებინების აქცით გამოწვეული უნებლივ დეფეკაცია?

- ა) აკონიტუმ;
- ბ) რუგა;
- გ) ოპიუმ;
- დ) ალოე;
- * ე) არგენტუმ ნიტრიკუმ, არსენიკუმ ალბუმ.

724. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კრუნჩხებით და კონველსიებით გამოწვეული უნებლივ დეფეკაციის დროს?

- * ა) სტრიქნინუმ;

- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ნაფრთუმ მურიაგიკუმ, ალუმინა;
- დ) ლიკოპოლიკუმ;
- ე) მოშუს.

725. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დფინით გამოწვეული ყაბბობის შემთხვევაში?

- ა) სფრიქნინუმ;
- *ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ნაფრთუმ მურიაგიკუმ, ალუმინა;
- დ) ლიკოპოლიკუმ;
- ე) მოშუს.

726. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ ყაბბობა აღინიშნება ყოველ მეორე დღეს?

- ა) სფრიქნინუმ;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- *გ) ნაფრთუმ მურიაგიკუმ, ალუმინა;
- დ) ლიკოპოლიკუმ;
- ე) მოშუს.

727. რომელი პრეპარატი ინიშნება ჩვეული სიტუაციის შეცვლით გამოწვეული ყაბბობის შემთხვევაში?

- ა) სფრიქნინუმ;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ნაფრთუმ მურიაგიკუმ, ალუმინა;
- *დ) ლიკოპოლიკუმ;
- ე) მოშუს.

728. რომელი პრეპარატი კურნავს ყავით გამოწვეულ ყაბბობას?

- ა) სფრიქნინუმ;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) ნაფრთუმ მურიაგიკუმ, ალუმინა;
- დ) ლიკოპოლიკუმ;
- *ე) მოშუს.

729. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ ყაბბობა აღინიშნება ყოველ სამ კვირაში ერთხელ?

- *ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ალუმინა;
- დ) გრაფიტი, ჰამამელისი;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

730. რომელი პრეპარატი ინიშნება როდესაც ლეფეკაცია ხდება მარტო ვერტიკალურ მდგომარეობაში?

- ა) კალი ბიქრომი;
- *ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ალუმინა;
- დ) გრაფიტი, ჰამამელისი;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

731. რომელი პრეპარატი ინიშნება, როდესაც ყაბბობა აღინიშნება სწორი ნაწლავის სიმშრალის შემთხვევაში?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- *გ) ალუმინა;
- დ) გრაფიტი, ჰამამელისი;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

732. რომელი პრეპარატი კურნავს ყაბბობას მენსტრუაციის დათრგუნვის შემთხვევაში?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ალუმინა;
- *დ) გრაფიტი, ჰამამელისი;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

733. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გაზების დაგროვებისას დილით, ლოგინიდან ადგომისას?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) კაუსტიკუმი;

- გ) ალექსინა;
დ) გრაფინა, ჰამამელისი;
* ე) კარბო ვეგეტაბილის.

734. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გამების დაგროვებისას დეფეკაციის დროს?

- * ა) ხელიდონიუმი;
ბ) აცილემ ფლუორიკა;
გ) ფოსფორი;
დ) არგენტუმ ნიფრიკუმი;
ე) აცილემ ფოსფორიკუმ.

735. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გამების დაგროვებისას შუალდემდე დეფეკაციის წინა პერიოდში?

- ა) ხელიდონიუმი;
* ბ) აცილემ ფლუორიკა;
გ) ფოსფორი;
დ) არგენტუმ ნიფრიკუმი;
ე) აცილემ ფოსფორიკუმ.

736. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გამების დაგროვებისას შაქრის მიღების შემდეგ?

- ა) ხელიდონიუმი;
ბ) აცილემ ფლუორიკა;
გ) ფოსფორი;
* დ) არგენტუმ ნიფრიკუმი;
ე) აცილემ ფოსფორიკუმ.

737. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გამების დაგროვებისას მჟავე საკვების მიღების შემდეგ?

- ა) ხელიდონიუმი;
ბ) აცილემ ფლუორიკა;
გ) ფოსფორი;
დ) არგენტუმ ნიფრიკუმი;
* ე) აცილემ ფოსფორიკუმ.

738. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გამების უნებლივ გამოყოფის შემთხვევაში?

- ა) ხელიდონიუმი;
ბ) აცილემ ფლუორიკა;
* გ) ფოსფორი;
დ) არგენტუმ ნიფრიკუმი;
ე) აცილემ ფოსფორიკუმ.

739. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს დილით ადგომის შემდეგ?

- * ა) ეტება;
ბ) ლიზინუმი;
გ) აკონიტი;
დ) კოლოცინტი, კროფონ ტიგლოიუმ;
ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმი.

740. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს, გამოწვეულს წყლის ხმაურით?

- ა) ეტება;
* ბ) ლიზინუმი;
გ) აკონიტი;
დ) კოლოცინტი, კროფონ ტიგლოიუმ;
ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმი.

741. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს გამების შეგაღების შემთხვევაში?

- ა) ეტება;
ბ) ლიზინუმი;
* გ) აკონიტი;
დ) კოლოცინტი, კროფონ ტიგლოიუმ;
ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმი.

742. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს საკვების მიღების დროს?

- ა) ეტება;
ბ) ლიზინუმი;
გ) აკონიტი;

*დ) კოლოცინტი, კროფონ ტიგლიუმ;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

743. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს ყავის დალევის შემდეგ?

- ა) ეტუბია;
- ბ) ლიზინუმი;
- გ) აკონიფი;
- დ) კოლოცინტი, კროფონ ტიგლიუმ;
- *ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

744. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს მენსტრუაციის წინა პერიოდში?

- *გ) ტუია;
- ბ) ამონიუმ კარბონიკუმ, ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- გ) ნიკოლებ;
- დ) ლიკოპოდიუმი, სილიცეა;
- ე) ნუქს ვომიკა.

745. რომელი პრეპარატი კურნავს ტენებმებს მენსტრუაციის პერიოდში?

- ა) ტუია;
- *ბ) ამონიუმ კარბონიკუმ, ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- გ) ნიკოლებ;
- დ) ლიკოპოდიუმი, სილიცეა;
- ე) ნუქს ვომიკა.

746. რომელი პრეპარატი კურნავს რძის მიღებით გამოწვეულ ტენებმებს?

- ა) ტუია;
- ბ) ამონიუმ კარბონიკუმ, ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- *გ) ნიკოლებ;
- დ) ლიკოპოდიუმი, სილიცეა;
- ე) ნუქს ვომიკა.

747. რომელი პრეპარატი ინიშნება მგლის მაღის შემთხვევაში კუჭის ტკიფილის დროს?

- ა) ტუია;
- ბ) ამონიუმ კარბონიკუმ, ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- გ) ნიკოლებ;
- *დ) ლიკოპოდიუმი, სილიცეა;
- ე) ნუქს ვომიკა.

748. რომელი პრეპარატი არჩენს დიმენტერიის დროს განვითარებულ მგლის მაღის?

- ა) ტუია;
- ბ) ამონიუმ კარბონიკუმ, ნატრიუმ სულფურიკუმ;
- გ) ნიკოლებ;
- დ) ლიკოპოდიუმი, სილიცეა;
- *ე) ნუქს ვომიკა.

749. რომელი პრეპარატი არჩენს მგლის მაღის, რომელიც აღინიშნება საკვების მიღებიდან 2 საათის შემდეგ?

- *გ) ტაქტექს;
- ბ) იოდი;
- გ) კოლხიკუმ;
- დ) ჰიოსფიამუსი;
- ე) პლატინა.

750. რომელი პრეპარატი კურნავს მგლის მაღის, რომელიც აღინიშნება საკვების მიღებიდან 3 საათის შემდეგ?

- ა) ტაქტექს;
- *ბ) იოდი;
- გ) კოლხიკუმ;
- დ) ჰიოსფიამუსი;
- ე) პლატინა.

751. რომელი პრეპარატი კურნავს მგლის მაღის, რომელიც აღინიშნება ეპილეფსიის შეტევის წინ?

- ა) ტაქტექს;
- ბ) იოდი;
- გ) კოლხიკუმ;
- *დ) ჰიოსფიამუსი;

გ) პლატინა.

752. რომელი პრეპარატი ინიშნება დარღით გამოწვეული უმაღლების შემთხვევაში?

- ა) ტაქსუს;
- ბ) იოდი;
- გ) კოლხიკუმ;
- დ) ჰიოსფიამუსი;
- *ე) პლატინა.

753. რომელი პრეპარატი ინიშნება საჭმლის სუნით გამოწვეული უმაღლების დროს?

- ა) ტაქსუს;
- ბ) იოდი;
- *გ) კოლხიკუმ;
- დ) ჰიოსფიამუსი;
- ე) პლატინა.

754. რომელი პრეპარატი ინიშნება ნისლიანი ამზნდით გამოწვეული უმაღლების შემთხვევაში?

- *ა) ქინა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალი ფოსფორი;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კაუსტიკუმ, პეტროლეუმი.

755. რომელი პრეპარატი ინიშნება დვინის მიღებით გამოწვეული მაღის გაძლიერების დროს?

- ა) ქინა;
- *ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალი ფოსფორი;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კაუსტიკუმ, პეტროლეუმი.

756. რომელი პრეპარატი ინიშნება მენსტრუაციის პერიოდში გაძლიერებული მაღის დროს?

- ა) ქინა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- *გ) კალი ფოსფორი;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კაუსტიკუმ, პეტროლეუმი.

757. რომელი პრეპარატი ინიშნება ლუდის მიღების გამო გაძლიერებული მაღის შემთხვევაში?

- ა) ქინა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალი ფოსფორი;
- *დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კაუსტიკუმ, პეტროლეუმი.

758. რომელი პრეპარატი კერნაფს კუჭის ტკივილს დილით შიმშილის დროს?

- ა) ქინა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალი ფოსფორი;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- *ე) კაუსტიკუმ, პეტროლეუმი.

759. რომელი პრეპარატი კერნაფს კუჭის ტკივილის დილით ჭამის შემდეგ?

- *ა) ნუქს ვომიკა, ტარენტულა;
- ბ) სეპია;
- გ) კალკარეა, სელფურ;
- დ) სარსაპარილა;
- ე) ლიკოპოდიუმი.

760. რომელი პრეპარატი კერნაფს კუჭის ტკივილის 13 სთ-მდე?

- ა) ნუქს ვომიკა, ტარენტულა;
- *ბ) სეპია;
- გ) კალკარეა, სელფურ;
- დ) სარსაპარილა;
- ე) ლიკოპოდიუმი.

761. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილს შეადლის წინ დეფეკაციის შემდეგ?

- ა) ნუქს ვომიკა, ტარუნტულა;
- ბ) სეპია;
- * გ) კალკარეა, სულფურ;
- დ) სარსაპარილა;
- ე) ლიკოპოდიუმი.

762. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილის საღამოს სიმღერის დროს?

- ა) ნუქს ვომიკა, ტარუნტულა;
- ბ) სეპია;
- გ) კალკარეა, სულფურ;
- * დ) სარსაპარილა;
- ე) ლიკოპოდიუმი.

763. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილის ზურგჩე წოლის დროს დამე?

- ა) ნუქს ვომიკა, ტარუნტულა;
- ბ) სეპია;
- გ) კალკარეა, სულფურ;
- დ) სარსაპარილა;
- * ე) ლიკოპოდიუმი.

764. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილს დამე ძილის პერიოდში?

- * ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
- ბ) ტუია;
- გ) ბორაქსი;
- დ) კაუსტიკუმი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ, მერკურ.

765. რომელი პრეპარატი კურნავს ვაქცინაციით გამოწვეულ კუჭის ტკიფილს?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
- * ბ) ტუია;
- გ) ბორაქსი;
- დ) კაუსტიკუმი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ, მერკურ.

766. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ მსხლით გამოწვეული ტკიფილის დროს კუჭის კარლიალურ ნაწილში?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
- ბ) ტუია;
- * გ) ბორაქსი;
- დ) კაუსტიკუმი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ, მერკურ.

767. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კუჭის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ღრმად ჩასუნთქვისას?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
- ბ) ტუია;
- გ) ბორაქსი;
- * დ) კაუსტიკუმი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ, მერკურ.

768. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სითხეების მიღებით გამოწვეული კუჭის ტკიფილის დროს?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
- ბ) ტუია;
- გ) ბორაქსი;
- დ) კაუსტიკუმი;
- * ე) არსენიკუმ ალბუმ, მერკურ.

769. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კოიტუსის შემდეგ განვითარებული კუჭის ტკიფილის დროს?

- * ა) აცილებ ფოსფორიკუმ;
- ბ) გრაფიტი;
- გ) აცილებ ოქსალიკუმ;
- დ) პტელეა;
- ე) მერკურ კოროზიფეს.

770. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ მოხარშული ხორცით გამოწვეული კუჭის ტკიფილის დროს?

- ა) აცილებულ ფოსფორიკებ;
- *ბ) გრაფიტი;
- გ) აცილებულ თქსალიკუმ;
- დ) პტელეა;
- ე) მერკურ კორობიფუს.

771. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება შაქრის მიღების შემდეგ?

- ა) აცილებულ ფოსფორიკებ;
- ბ) გრაფიტი;
- *გ) აცილებულ თქსალიკუმ;
- დ) პტელეა;
- ე) მერკურ კორობიფუს.

772. რომელი პრეპარატი კურნავს კუჭის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება შაქრის მიღების შემდეგ?

- ა) აცილებულ ფოსფორიკებ;
- ბ) გრაფიტი;
- გ) აცილებულ თქსალიკუმ;
- *დ) პტელეა;
- ე) მერკურ კორობიფუს.

773. რომელი პრეპარატი ინიშნება მეავე გამლის მიღებით გამოწვეული კუჭის ტკიფილის შემთხვევაში?

- ა) აცილებულ ფოსფორიკებ;
- ბ) გრაფიტი;
- გ) აცილებულ თქსალიკუმ;
- დ) პტელეა;
- *ე) მერკურ კორობიფუს.

774. რომელი პრეპარატი ინიშნება წვითი კუჭის ტკიფილის დროს საღამოს თევზის მიღების შემთხვევაში?

- *ა) ტუია;
- ბ) სანგვინარია;
- გ) აპოცინუმ;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) სარსაპარილა.

775. რომელი პრეპარატი ინიშნება წვითი ტკიფილის დროს კუჭის არეში, რომელსაც თან ახლავს თავის ტკიფილი?

- ა) ტუია;
- *ბ) სანგვინარია;
- გ) აპოცინუმ;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) სარსაპარილა.

776. რომელი პრეპარატი ინიშნება საუმის მიღებით გამოწვეული წვითი ტკიფილის დროს კუჭის არეში?

- ა) ტუია;
- ბ) სანგვინარია;
- *გ) აპოცინუმ;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) სარსაპარილა.

777. რომელი პრეპარატი ინიშნება კუჭის არეში მენსტრუაციის დროს განვითარებული წვითი ტკიფილისას?

- ა) ტუია;
- ბ) სანგვინარია;
- *გ) ტარენტულა;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) სარსაპარილა.

778. რომელი პრეპარატი ინიშნება პურის მიღებით გამოწვეული წვითი ტკიფილის დროს კუჭის არეში?

- ა) ტუია;
- ბ) სანგვინარია;
- გ) აპოცინუმ;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- *ე) სარსაპარილა.

779. რა პრეპარატი კურნავს ჩაის მიღებით გამოწვეულ წვითი ხასიათის ტკიფილს კუჭის არეში?

- * ა) კალადიუმ;
- ბ) ანგუსტურა ვერა;
- გ) არგენტუმ მეტალიკუმ;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

780. რა პრეპარატი კურნაცს კითხვით გამოწვეულ წვითი ხასიათის ტკიფილს კუჭის არეში?

- ა) კალადიუმ;
- ბ) ანგუსტურა ვერა;
- * გ) არგენტუმ მეტალიკუმ;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

781. რა პრეპარატი კურნაცს თბილი რძის მიღებით გამოწვეულ ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს კუჭის არეში?

- ა) კალადიუმ;
- * ბ) ანგუსტურა ვერა;
- გ) არგენტუმ მეტალიკუმ;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

782. რა პრეპარატი კურნაცს დებინებით გამოწვეულ მჭრელი ხასიათის ტკიფილს კუჭის არეში?

- ა) კალადიუმ;
- ბ) ანგუსტურა ვერა;
- გ) არგენტუმ მეტალიკუმ;
- * დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

783. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დილით რძის მიღებით გამოწვეული წყერვილის შემთხვევაში?

- ა) კალადიუმ;
- ბ) ანგუსტურა ვერა;
- გ) არგენტუმ მეტალიკუმ;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- * ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

784. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ 14 სთ-ზე წყერვილის შემთხვევაში?

- * ა) პულსატილა;
- ბ) ბრიონია, ნუქს ვომიკა;
- გ) ექპატორიუმი;
- დ) ციქუტი;
- ე) აპისი.

785. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ გაბრაბებით გამოწვეული წყერვილის შემთხვევაში?

- ა) პულსატილა;
- * ბ) ბრიონია, ნუქს ვომიკა;
- გ) ექპატორიუმი;
- დ) ციქუტი;
- ე) აპისი.

786. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დებინების წინა პერიოდში წყერვილის შემთხვევაში?

- ა) პულსატილა;
- ბ) ბრიონია, ნუქს ვომიკა;
- * გ) ექპატორიუმი;
- დ) ციქუტი;
- ე) აპისი.

787. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კრუნჩების თანმხლები წყერვილის შემთხვევაში?

- ა) პულსატილა;
- ბ) ბრიონია, ნუქს ვომიკა;
- გ) ექპატორიუმი;
- * დ) ციქუტი;
- ე) აპისი.

788. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დილით საუმის წინა პერიოდში გულძმარვისას?

- * ა) ნუქს ვომიკა;

- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) მერკერ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა, ფერუმ ფოსფორიკა;
- ე) აგარიკუს.

789. რომელი პრეპარატი ინიშნება თამბაქოს მოწევით გამოწვეული გულძმარვის შემთხვევაში დილით?

- ა) ნუქს ვომიკა;
- *ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) მერკერ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა, ფერუმ ფოსფორიკა;
- ე) აგარიკუს.

790. რომელი პრეპარატი კურნავს დამე გულძმარვას ფეხმძიმობის დროს?

- ა) ნუქს ვომიკა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- *გ) მერკერ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა, ფერუმ ფოსფორიკა;
- ე) აგარიკუს.

791. რომელი პრეპარატი ინიშნება მუავე პროდექტების მიღებით გამოწვეული გულძმარვის დროს?

- *ა) ნუქს ვომიკა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) მერკერ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა, ფერუმ ფოსფორიკა;
- ე) აგარიკუს.

792. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ყავით გამოწვეული გულძმარვის დროს?

- ა) ნუქს ვომიკა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) მერკერ სოლუბილის;
- *დ) კალკარეა ფოსფორიკა, ფერუმ ფოსფორიკა;
- ე) აგარიკუს.

793. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ხორცის მიღებით გამოწვეული გულძმარვის შემთხვევაში?

- ა) ნუქს ვომიკა;
- ბ) ლიკოპოდიუმი;
- გ) მერკერ სოლუბილის;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- *ე) აგარიკუს, ფერუმ ფოსფორიკუმ.

794. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ მოხრით გამოწვეული გულძმარვის შემთხვევაში?

- *ა) ტუია;
- ბ) ნუქს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) კალი ნატრიოკუმი.

795. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ლუდის მიღებით გამოწვეული გულძმარვის შემთხვევაში?

- *ა) ფოსფორი;
- ბ) ნუქს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) კალი ნატრიოკუმი.

796. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ალკოჰოლიკების გულძმარვის შემთხვევაში?

- ა) ფოსფორი;
- *ბ) ნუქს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) კალი ნატრიოკუმი.

797. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შაქრის მიღებით გამოწვეული გულძმარვის შემთხვევაში?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) ნუქს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;

- * გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- დ) სულფური;
- ე) კალი ნაფრიკუმი.

798. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ მოხარშული კვერცხით გამოწვეული გულმარვის შემთხვევაში?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) ნექს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- * დ) სულფური;
- ე) კალი ნაფრიკუმი.

799. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დილით შიმშილით გამოწვეული სლოკინის დროს?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) ნექს ვომიკა, აცილუმ სულფურიკუმ;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- * დ) სულფური;
- ე) კალი ნაფრიკუმი.

800. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სლოკინის დროს, რომელიც აღინიშნება 11 საათზე?

- * ა) აცილუმ თქესაღილიკუმ;
- ბ) ჰელსაფილა;
- გ) კეპრუმ მეტალიკუმ;
- დ) რანუნკულუს ბულბომზე;
- ე) ტაბაკუმი.

801. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სლოკინის დროს, რომელიც აღინიშნება ძიღში?

- ა) აცილუმ თქესაღილიკუმ;
- * ბ) ჰელსაფილა;
- გ) კეპრუმ მეტალიკუმ;
- დ) რანუნკულუს ბულბომზე;
- ე) ტაბაკუმი.

802. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სლოკინის დროს, რომელიც აღინიშნება უგონთ მდგომარეობაში?

- ა) აცილუმ თქესაღილიკუმ;
- ბ) ჰელსაფილა;
- * გ) კეპრუმ მეტალიკუმ;
- დ) რანუნკულუს ბულბომზე;
- ე) ტაბაკუმი.

803. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სლოკინის დროს, რომელიც აღინიშნება აღკოპოლის მიღების შემდეგ?

- ა) აცილუმ თქესაღილიკუმ;
- ბ) ჰელსაფილა;
- გ) კეპრუმ მეტალიკუმ;
- * დ) რანუნკულუს ბულბომზე;
- ე) ტაბაკუმი.

804. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ სლოკინის დროს, რომელიც აღინიშნება ხელისას?

- ა) აცილუმ თქესაღილიკუმ;
- ბ) ჰელსაფილა;
- გ) კეპრუმ მეტალიკუმ;
- დ) რანუნკულუს ბულბომზე;
- * ე) ტაბაკუმი.

805. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ცხელი სასმელის მიღებით გამოწვეული სლოკინის დროს?

- * ა) ვერაფრუმ ალბუმ;
- ბ) ტუია;
- გ) ფოსფორი;
- დ) ამისი;
- ე) ოეა.

806. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ცივი წყლის მიღებით გამოწვეული სლოკინის შემთხვევაში?

- ა) ვერაფრუმ ალბუმ;
- * ბ) ტუია;
- გ) ფოსფორი;

დ) აპისი;

ე) თეა.

807. რომელი პრეპარატი კურნავს გაცივებით გამოწვეულ სლოკინს?

ა) ვერაფრუქმ ალბუმ;

ბ) ტეიბ;

* გ) ფოსფორი;

დ) აპისი;

ე) თეა.

808. რომელი პრეპარატი კურნავს სლოკინს დებინების შემდეგ პერიოდში?

* ა) ვერაფრუქმ ალბუმ, ბრიონია;

ბ) ჰამამელისი;

გ) ფოსფორი;

დ) კარბო ვეგეტაბილის;

ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმ.

809. რომელი პრეპარატი კურნავს ღორის ხორცის მიღებით გამოწვეულ სლოკინს?

ა) ვერაფრუქმ ალბუმ, ბრიონია;

* ბ) ჰამამელისი;

გ) ფოსფორი;

დ) კარბო ვეგეტაბილის;

ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმ.

810. რომელი პრეპარატი კურნავს სლოკინს, რომელიც აღინიშნება ტიფის შემთხვევაში?

ა) ვერაფრუქმ ალბუმ, ბრიონია;

ბ) ჰამამელისი;

* გ) ფოსფორი;

დ) კარბო ვეგეტაბილის;

ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმ.

811. რომელი პრეპარატი კურნავს ფიზიკური ვარჯიშით გამოწვეულ სლოკინს?

ა) ვერაფრუქმ ალბუმ, ბრიონია;

ბ) ჰამამელისი;

გ) ფოსფორი;

* დ) კარბო ვეგეტაბილის;

ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმ.

812. რომელი პრეპარატი კურნავს კარაქიანი ჟურის მიღებით გამოწვეულ სლოკინს?

ა) ვერაფრუქმ ალბუმ, ბრიონია;

ბ) ჰამამელისი;

გ) ფოსფორი;

დ) კარბო ვეგეტაბილის;

* ე) ნაფრიუმ სულფურიკუმ.

813. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოყინის დროს, რომელიც აღინიშნება შუალდის საკვების მიღების დროს?

* ა) ოლენდერ;

ბ) კობალტი;

გ) ლიკოპოდიუმი;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმი;

ე) რუს ტოქსი.

814. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოყინის დროს, რომელიც აღინიშნება დილით დეფეკაციის შემდეგ?

ა) ოლენდერ;

* ბ) კობალტი;

გ) ლიკოპოდიუმი;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმი;

ე) რუს ტოქსი.

815. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოყინის დროს, რომელიც აღინიშნება ღვინის მიღების შემდეგ?

ა) ოლენდერ;

ბ) კობალტი;

* გ) ლიკოპოდიუმი;

დ) არგენტუმ ნიტრიკუმი;

ე) რეს ტოქსი.

816. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოფინის დროს, რომელიც აღინიშნება აღელვების შემდეგ?

- ა) ოლეანდერ;
- ბ) კობალტი;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- *დ) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- ე) რეს ტოქსი.

817. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოფინის დროს, რომელიც იწყება დაწოლილი მდგომარეობიდან აღგომისას?

- ა) ოლეანდერ;
- ბ) კობალტი;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- *ე) რეს ტოქსი.

818. რომელი პრეპარატი ინიშნება ბოფინისას, თუ იგი იწყება ყლაპვის დროს?

- *ა) აგარიკუსი;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის, პულსატილა;
- დ) ფსორინუმი;
- ე) ქინა.

819. რომელი პრეპარატი ინიშნება კომბოსტოს მიღებით გამოწვეული ბოფინის შემთხვევაში?

- ა) აგარიკუსი;
- *ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის, პულსატილა;
- დ) ფსორინუმი;
- ე) ქინა.

820. რომელი პრეპარატი ინიშნება კარაჯის მიღებით გამოწვეული ბოფინის დროს?

- ა) აგარიკუსი;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *გ) კარბო ვეგეტაბილის, პულსატილა;
- დ) ფსორინუმი;
- ე) ქინა.

821. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება აღინიშნება დილის 10 სთ-ზე?

- ა) აგარიკუსი;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის, პულსატილა;
- *დ) ფსორინუმი;
- ე) ქინა.

822. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება არის დილის 11 სთ-ზე?

- ა) აგარიკუსი;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის, პულსატილა;
- დ) ფსორინუმი;
- *ე) ქინა.

823. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება იწყება წყლის დანახვისას?

- *ა) ფოსფორი;
- ბ) კოლხიკუმი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) მოშუს;
- ე) ანტიმონიუმ კრუდუმ.

824. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება იწყება ნერწყვის ყლაპვისას?

- ა) ფოსფორი;
- *ბ) კოლხიკუმი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) მოშუს;
- ე) ანტიმონიუმ კრუდუმ.

825. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება იწყება მჟავე საკვების მიღების შემდეგ?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) კოლხიკები;
- * გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) მოშექ;
- ე) ანტიმონიუმ კრუდემ.

826. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება იწყება კოიტუსის შემდეგ?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) კოლხიკები;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- * დ) მოშექ;
- ე) ანტიმონიუმ კრუდემ.

827. რა პრეპარატი ინიშნება, თუ დებინება აღინიშნება წითელას დროს?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) კოლხიკები;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) მოშექ;
- * ე) ანტიმონიუმ კრუდემ.

828. რა პრეპარატი მოხსნის დებინებას, თუ იგი ვითარდება ხორცის მიღების შემდეგ?

- * ა) კრეოზოფუმი;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) ნუქს ვომიკა, კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) თეა;
- ე) კოკა.

829. რა პრეპარატი ინიშნება გულის წასვლით გამოწვეული დებინების დროს?

- ა) კრეოზოფუმი;
- * ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) ნუქს ვომიკა, კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) თეა;
- ე) კოკა.

830. რომელი პრეპარატი ინიშნება დებინების შემთხვევაში, რომელიც აღინიშნება მოწამველის და სიმთვრალის დროს?

- ა) კრეოზოფუმი;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- * გ) ნუქს ვომიკა, კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) თეა;
- ე) კოკა.

831. რომელი პრეპარატი ინიშნება ფორთოხლის სუნით გამოწვეული გულისრევის დროს?

- * ა) ციტრუს ველგარის;
- ბ) ოვინინი;
- გ) სილიცეა;
- დ) ანტიმონიუმ კრუდემ;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმი.

832. რომელი პრეპარატი ინიშნება ცხვრის ხორცის სუნით გამოწვეული გულისრევის დროს?

- ა) ციტრუს ველგარის;
- * ბ) ოვინინი;
- გ) სილიცეა;
- დ) ანტიმონიუმ კრუდემ;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმი.

833. რომელი პრეპარატი ინიშნება ვაქცინაციის შემდეგ განვითარებული გულისრევის დროს?

- ა) ციტრუს ველგარის;
- ბ) ოვინინი;
- * გ) სილიცეა;
- დ) ანტიმონიუმ კრუდემ;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმი.

834. რომელი პრეპარატი ინიშნება მუავე დეინის დალევით გამოწვეული გულისრევის დროს?

- ა) ციტრუს ველგარის;
- ბ) ოვინინი;
- გ) სილიცეა;
- *დ) ანტიმონუმ კრუდეტ;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმი.

835. რომელი პრეპარატი ინიშნება აღელვებით გამოწვეული გულისრევის დროს?

- ა) ციტრუს ველგარის;
- ბ) ოვინინი;
- გ) სილიცეა;
- დ) ანტიმონუმ კრუდეტ;
- *ე) კალიუმ კარბონიკუმი.

836. რომელი პრეპარატი ინიშნება კოიფუსის დროს განვითარებული გულისრევის დროს?

- *ა) სილიცეა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) ლიმინუმი;
- ე) აპისი.

837. რომელი პრეპარატი ინიშნება თევზის მიღების შემდეგ განვითარებული გულისრევის დროს?

- ა) სილიცეა;
- *ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) ლიმინუმი;
- ე) აპისი.

838. რომელი პრეპარატი ინიშნება ქლიავის ჭამის შემდეგ განვითარებული გულისრევის დროს?

- ა) სილიცეა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- *გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) ლიმინუმი;
- ე) აპისი.

839. რომელი პრეპარატი ინიშნება კვერცხის ჭამის შემდეგ განვითარებული გულისრევის დროს?

- ა) სილიცეა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *დ) ლიმინუმი;
- ე) აპისი.

840. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს შარდის ბუშტში, რომელიც აღინიშნება საღამოს მოშარდვის შემდეგ?

- *ა) სეპია;
- ბ) ბერბერის;
- გ) კარლუს მარიანუს;
- დ) აკონიტუმ, პულსატილა;
- ე) კლემატის.

841. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს შარდის ბუშტში, რომელიც ვითარდება მოძრაობის შემდეგ?

- ა) სეპია;
- *ბ) ბერბერის;
- გ) კარლუს მარიანუს;
- დ) აკონიტუმ, პულსატილა;
- ე) კლემატის.

842. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს შარდის ბუშტში მენსტრუაციის დროს?

- *ა) სეპია;
- ბ) ბერბერის;
- გ) კარლუს მარიანუს;
- დ) აკონიტუმ, პულსატილა;
- ე) კლემატის.

843. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს შარდის ბუშტში რომელიც აღინიშნება მჯდომარე მდგომარეობაში?

- ა) სეპია;
- ბ) ბერბერის;
- * გ) კარლუს მარიანუს;
- დ) აკონიტუმ, პულსატილა;
- ე) კლემატის.

844. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს შარდის ბუშტში, რომელიც ჩნდება სიარულის დროს?

- ა) სეპია;
- ბ) ბერბერის;
- გ) კარლუს მარიანუს;
- * დ) აკონიტუმ, პულსატილა;
- ე) კლემატის.

845. რომელი პრეპარატი ინიშნება შარდის ბუშტის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც განიცდის ირალიაციას ბარბაფებში?

- * ა) პულსატილა;
- ბ) კლემატის;
- გ) ბელადონა;
- დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

846. რომელი პრეპარატი ინიშნება მოშარდვის პროცესის დასაწყისში განვითარებული შარდის ბუშტის ყელში ტკიფილის დროს?

- ა) პულსატილა;
- * ბ) კლემატის;
- გ) ბელადონა;
- დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

847. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტი წვითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება დამე?

- ა) პულსატილა;
- ბ) კლემატის;
- * გ) ბელადონა;
- დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

848. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში წვითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მწოლიარე მდგომარეობაში?

- ა) პულსატილა;
- ბ) კლემატის;
- გ) ბელადონა;
- * დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;
- ე) აურუმ მეტალიკუმ.

849. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვლეტითი ტკიფილისას, რომელიც აღინიშნება სუნთქვის დროს?

- ა) პულსატილა;
- ბ) კლემატის;
- გ) ბელადონა;
- დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;
- * ე) აურუმ მეტალიკუმ.

850. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვლეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ხველის შემთხვევაში?

- * ა) კაპსიკუმ;
- ბ) ამონიუმ მურიაფიკუმ;
- გ) ბეფო;
- დ) ნუქს გომიკა;
- ე) კონიუმ.

851. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვლეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მწოლიარე მდგომარეობაში?

- ა) კაპსიკუმ;
- * ბ) ამონიუმ მურიაფიკუმ;
- გ) ბეფო;
- დ) ნუქს გომიკა;

ე) კონიუმ.

852. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მოშარდვის შემდეგ?

- ა) კაპსიკუმ;
- ბ) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- * გ) ბუფო;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კონიუმ.

853. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება სადილის შემდეგ?

- ა) კაპსიკუმ;
- ბ) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- გ) ბუფო;
- * დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) კონიუმ.

854. რომელი პრეპარატი უნდა დაგნიშნოთ შარდის ბუშტის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც სუსტლება მჯდომარე მდგომარეობაში?

- ა) კაპსიკუმ;
- ბ) ამონიუმ მურიატიკუმ;
- გ) ბუფო;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- * ე) კონიუმ.

855. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს შარდის ბუშტის არეში, როცა აღინიშნება მონაცევლეობა: გკიფილი ხან შარდის ბუშტშია, ხან სწორ ნაწლავში?

- * ა) კოლოცინგი;
- ბ) კოპაივა;
- გ) ალუმინა;
- დ) კანგარის;
- ე) არნიკა, სფაფიზაგრია.

856. რომელი პრეპარატი ინიშნება შარდის ბუშტის სპაშმის დროს, თუ ის მხოლოდ დიღაობით აღინიშნება?

- ა) კოლოცინგი;
- * ბ) კოპაივა;
- გ) ალუმინა;
- დ) კანგარის;
- ე) არნიკა, სფაფიზაგრია.

857. რომელი პრეპარატი ინიშნება შარდის ბუშტის სპაშმური ტკიფილის დროს გულმკერდის არეში გავრცელებით?

- ა) კოლოცინგი;
- ბ) კოპაივა;
- * გ) ალუმინა;
- დ) კანგარის;
- ე) არნიკა, სფაფიზაგრია.

858. რომელი პრეპარატი ინიშნება ქუნთრუშის შედეგად განვითარებული შარდის ბუშტის ანთების შემთხვევაში?

- ა) კოლოცინგი;
- ბ) კოპაივა;
- გ) ალუმინა;
- * დ) კანგარის;
- ე) არნიკა, სფაფიზაგრია.

859. რომელი პრეპარატი ინიშნება ტრავმის შედეგად განვითარებული შარდის ბუშტის ანთების შემთხვევაში?

- ა) კოლოცინგი;
- ბ) კოპაივა;
- გ) ალუმინა;
- დ) კანგარის;
- * ე) არნიკა, სფაფიზაგრია.

860. რომელი პრეპარატი ინიშნება აფაქსიის შედეგად განვითარებული შარდის შეკავების დროს?

- * ა) არგენტუმ ნიგრიკუმი;

- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- გ) აქონიტუმ, თპიუმ;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმ.

861. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ისტერიისას განვითარებული შარლის შეკავების დროს?

- ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- *ბ) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- გ) აქონიტუმ, თპიუმ;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმ.

862. რომელი პრეპარატი ინიშნება შეშინების გამო განვითარებული შარლის შეკავების დროს?

- ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- *გ) აკონიტუმ, თპიუმ;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმ.

863. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ლუდის დალევის შედეგად განვითარებული შარლის შეკავების დროს?

- ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- გ) აქონიტუმ, თპიუმ;
- *დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმ.

864. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ იმ შემთხვევაში, როცა პაციენტს არ შეუძლია მოშარლოს უცხო პირების თანდასწრებით?

- ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- გ) აქონიტუმ, თპიუმ;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- *ე) ნაფრიუმ მურიაგიკუმ.

865. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ფეხების დასველების შედეგად განვითარებული შარლის შეკავების დროს?

- *ა) ალიუმ ცეპა, რუს ტოქსი;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) კოლხიკუმი;
- დ) სენეკა;
- ე) ქაკტუსი.

866. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ ცივ იატაკზე დფომის შედეგად განვითარებული შარლის შეკავების დროს?

- ა) ალიუმ ცეპა, რუს ტოქსი;
- *ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) კოლხიკუმი;
- დ) სენეკა;
- ე) ქაკტუსი.

867. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შარლის ბუშტის სპაზმის გამო განვითარებული დიტურიის დროს?

- ა) ალიუმ ცეპა, რუს ტოქსი;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- *გ) კოლხიკუმი;
- დ) სენეკა;
- ე) ქაკტუსი.

868. რომელი პრეპარატი კურნავს დისმენორეის პერიოდში განვითარებულ დიმურიას?

- ა) ალიუმ ცეპა, რუს ტოქსი;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) კოლხიკუმი;
- *დ) სენეციო აურეუსი;
- ე) ქაკტუსი.

869. რომელი პრეპარატი კურნავს უნებლიერ შარლვას, რომელიც აღინიშნება დილის 5 საათზე?

- ა) ალიუმ ცეპა, რუს ტოქსი;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;

გ) კოლხიური;

დ) სენეკა;

* ე) კაპტური.

870. რომელი პრეპარატი კურნავს უნებლივ შარლვას, რომელიც აღინიშნება მგზავრობის დროს?

* ა) ტუია;

ბ) არნიკა, არსენიკუმ ალბუმ;

გ) ფარენტულა;

დ) კანფარისი;

ე) აცილუმ ბენზოიკუმი.

871. რომელი პრეპარატი კურნავს უნებლივ შარლვას, რომელიც აღინიშნება მშობიარობის შემდეგ?

ა) ტუია;

* ბ) არნიკა, არსენიკუმ ალბუმ;

გ) ფარენტულა;

დ) კანფარისი;

ე) აცილუმ ბენზოიკუმი.

872. რომელი პრეპარატი კურნავს შარლის ბუშტის ტენებმებს, რომლებიც აღინიშნება მენსტრუაციის დროს?

ა) ტუია;

ბ) არნიკა, არსენიკუმ ალბუმ;

* გ) ფარენტულა;

დ) კანფარისი;

ე) აცილუმ ბენზოიკუმი.

873. რომელი პრეპარატი ინიშნება დეფეკაციის შემდეგ განვითარებული შარლის ბუშტის ტენებმების დროს?

ა) ტუია;

ბ) არნიკა, არსენიკუმ ალბუმ;

გ) ფარენტულა;

* დ) კანფარისი;

ე) აცილუმ ბენზოიკუმი.

874. რომელი პრეპარატი ინიშნება თირკმლის არეში ტკივილის დროს ირალიაციით გულმკერდის არეში?

ა) ტუია;

ბ) არნიკა, არსენიკუმ ალბუმ;

გ) ფარენტულა;

დ) კანფარისი;

* ე) აცილუმ ბენზოიკუმი.

875. რომელი პრეპარატი ინიშნება თირკმლის არეში ტკივილის დროს ირალიაციით წვივებში?

* ა) ბერბერისი;

ბ) ხელიდონიუმი;

გ) ცინაბარისი;

დ) ცინკუმ მეტალიკუმი;

ე) კოკუს კაპტი.

876. რომელი პრეპარატი ინიშნება თირკმლის არეში ჩხვლეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება დილით?

ა) ბერბერისი;

* ბ) ხელიდონიუმი;

გ) ცინაბარისი;

დ) ცინკუმ მეტალიკუმი;

ე) კოკუს კაპტი.

877. რომელი პრეპარატი ინიშნება თირკმლის არეში ჩხვლეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება დილის 4 საათში?

ა) ბერბერისი;

ბ) ხელიდონიუმი;

* გ) ცინაბარისი;

დ) ცინკუმ მეტალიკუმი;

ე) კოკუს კაპტი.

878. რომელი პრეპარატი ინიშნება თირკმლის არეში ჩხვლეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება საღამოს საათებში?

ა) ბერბერისი;

ბ) ხელიდონიუმი;

გ) ცინაბარისი;

*დ) ცინკუმ მეტალიუმი;
ე) კოკეს კაპტი.

879. რომელი პრეპარატი ენიშნება პაციენტს, თუ იგი უჩივის ტკივილს პროსტატის არეში მოშარდვის შემდეგ?

- *ა) ლიკოპინიუმი, პულსაფილა;
ბ) აპისი;
გ) ოქა;
დ) ხელიდონიუმი;
ე) კოკა.

880. რომელი პრეპარატი კურნავს თირკმლის არეში ჩხვლეტით ტკივილს, რომელიც აღინიშნება საღამოს საწოლში?

- ა) პულსაფილა;
*ბ) კოკეს კაპტი;
გ) კალი ბიქრომი;
დ) ბუფო;
ე) სტაფიბაგრია.

881. რომელი პრეპარატი კურნავს თირკმლის არეში ჩხვლეტით ტკივილს, რომელიც აღინიშნება მოძრაობის დროს?

- ა) პულსაფილა;
ბ) კოკეს კაპტი;
*გ) კალი ბიქრომი;
დ) ბუფო;
ე) სტაფიბაგრია.

882. რომელი პრეპარატი კურნავს თირკმლის არეში ჩხვლეტით ტკივილს, რომელიც აღინიშნება მოშარდვის შემდეგ?

- ა) პულსაფილა;
ბ) კოკეს კაპტი;
გ) კალი ბიქრომი;
*დ) ბუფო;
ე) სტაფიბაგრია.

883. რომელი პრეპარატი კურნავს თირკმლის არეში ჩხვლეტით ტკივილს, რომელიც აღინიშნება გაცივების შემდეგ?

- ა) პულსაფილა;
ბ) კოკეს კაპტი;
გ) კალი ბიქრომი;
დ) ბუფო;
*ე) სტაფიბაგრია.

884. რომელი პრეპარატი ენიშნება პაციენტს, თუ იგი უჩივის ტკივილს პროსტატის არეში დგომისას?

- ა) კანტარისი;
*ბ) ციკლამენი;
გ) ალუმენი;
დ) კროფონ ტიგლიუმ;
ე) ფოსფორი.

885. რომელი პრეპარატი ენიშნება პაციენტს, თუ იგი უჩივის ტკივილს პროსტატის არეში ერექციის დროს?

- ა) კანტარისი;
ბ) ციკლამენი;
*გ) ალუმენი;
დ) კროფონ ტიგლიუმ;
ე) ფოსფორი.

886. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წითელი ფერის შარლის გამოყოფას საღამოს საათებში?

- *ა) სელენიუმი;
ბ) ნუქს ვომიკა;
გ) ცედრონი;
დ) აციდუმ ნიტროკუმ;
ე) ოქა.

887. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წითელი ფერის შარლის გამოყოფას ცხელების დროს?

- ა) სელენიუმი;
*ბ) ნუქს ვომიკა;
გ) ცედრონი;
დ) აციდუმ ნიტროკუმ;

ე) თეა.

888. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წითელი ფერის შარდის გამოყოფას ოფლდების დროს?

- ა) სელენიუმი;
- ბ) ნუქს ვომიკა;
- *გ) ცელრონი;
- დ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- ე) თეა.

889. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის მოღურვაზე შარდის გამოყოფას?

- ა) სელენიუმი;
- ბ) ნუქს ვომიკა;
- გ) ცელრონი;
- *დ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- ე) თეა.

890. რომელი ტიპის პაციენტს აწესებს თავის ტკიფილი დილით ერთი და იგივე დროს?

- *ა) კალი ბიქრომიკა;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) არნიკა;
- დ) მურექსი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმი.

891. რომელი ტიპის პაციენტს აწესებს თავის ტკიფილი დილით საუბრის დაგვიანების შემთხვევაში?

- ა) კალი ბიქრომიკა;
- *ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) არნიკა;
- დ) მურექსი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმი.

892. რომელი ტიპის პაციენტს აწესებს თავის ტკიფილი გაღვიძებისას 10 საათამდე გახანგრძლივებით?

- ა) კალი ბიქრომიკა;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- *გ) არნიკა;
- დ) მურექსი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმი.

893. რომელი ტიპის პაციენტს აწესებს თავის ტკიფილი უსიამოვნო სიმმრების ნახვის შემდეგ?

- ა) კალი ბიქრომიკა;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) არნიკა;
- *დ) მურექსი;
- ე) აურუმ მეტალიკუმი.

894. რომელი ტიპის პაციენტს აწესებს თავის ტკიფილი 15 საათზე?

- ა) კალი ბიქრომიკა;
- ბ) კალკარეა კარბონიკა;
- გ) არნიკა;
- დ) მურექსი;
- *ე) აურუმ მეტალიკუმი.

895. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება 17 საათზე?

- *ა) მანგანუმი;
- ბ) ფიბოსტიგმა;
- გ) ბოვისტა;
- დ) აცილუმ მურიატიკუმი;
- ე) კაუსტიკუმი.

896. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება 22 საათზე?

- ა) მანგანუმი;
- *ბ) ფიბოსტიგმა;
- გ) ბოვისტა;
- დ) აცილუმ მურიატიკუმი;
- ე) კაუსტიკუმი.

897. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება 8 საათშე?

- ა) მანგანუმი;
- ბ) ფიზოსტიგმა;
- * გ) ბოვისტა;
- დ) აცილებ მურიატიკუმი;
- ე) კაუსტიკუმი.

898. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება 13 საათშე?

- ა) მანგანუმი;
- ბ) ფიზოსტიგმა;
- გ) ბოვისტა;
- * დ) აცილებ მურიატიკუმი;
- ე) კაუსტიკუმი.

899. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება 16 საათშე?

- ა) მანგანუმი;
- ბ) ფიზოსტიგმა;
- გ) ბოვისტა;
- დ) აცილებ მურიატიკუმი;
- * ე) კაუსტიკუმი.

900. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს რომელსაც თან ახლავს შეგრძნება თითქოს წარბები აწვება?

- * ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კაკტუსი;
- გ) ტუია;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ლიზინუმი.

901. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს დრმა შესუნთქვის დროს?

- ა) კარბო ანიმალის;
- * ბ) კაკტუსი;
- გ) ტუია;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ლიზინუმი.

902. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს ზემოთ ახედვისას გაუმჯობესებით?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კაკტუსი;
- * გ) ტუია;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ლიზინუმი.

903. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს გვერდზე გახედვისას გაუმჯობესებით?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კაკტუსი;
- გ) ტუია;
- * დ) ოლეანდერ;
- ე) ლიზინუმი.

904. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს რომელიც აღინიშნება მიმდინარე წყლის ხმაურის გაგონებისას?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კაკტუსი;
- გ) ტუია;
- დ) ოლეანდერ;
- * ე) ლიზინუმი.

905. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ტრიალის შემდეგ?

- * ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კოკა;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

906. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება მთებში დიდ სიმაღლეზე ასელის შემდეგ?

- ა) კარბო ანიმალის;
- *ბ) კოკა;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

907. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელსაც ახასიათებს შემსუბუქება მოძრაობის დაწყებისას?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კოკა;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- *ე) ვალერიანა.

908. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება თავბრუსხვევის შემდეგ?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კოკა;
- *გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

909. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ჭექა-ჭეხილის დროს?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კოკა;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- *დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

910. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სუნთქვის შეკავებისას?

- ა) კარბო ანიმალის;
- *ბ) აგარიკუსი;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

911. რომელი პრეპარატი განკურნავს თავის ტკიფილს, რომელსაც აღენიშნება გაუმჯობესება ცივი ხელით დაწოლისაგან?

- ა) კარბო ანიმალის;
- ბ) კოკა;
- *გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) ნატრიუმ ფოსფორიკუმ;
- ე) ვალერიანა.

912. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის ტკიფილის დროს, რომელიციწყება მხრებით ტვირთის გადატანის შემდეგ?

- *ა) მაგნეზია სულფურიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) იოდი;
- დ) ალოე;
- ე) ლაბნანთქს.

913. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ქორეით დაავადებულ პაციენტებში?

- ა) მაგნეზია სულფურიკა;
- *ბ) აგარიკუს;
- გ) იოდი;
- დ) ალოე;
- ე) ლაბნანთქს.

914. რომელი პრეპარატი ინიშნება ქრონიკული თავის ტკიფილის დროს, რომელიც ახასიათებს მოხუცებულობის ასაქს?

- ა) მაგნეზია სულფურიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- *გ) იოდი;
- დ) ალოე;
- ე) ლაბნანთქს.

915. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის ტკიფილის დროს, რომელიც მონაცემებულობის აბლომინალურ და საშვილოსნოს

სიმპოზიუმისა?

- ა) მაგნეზია სულფურიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) იოდი;
- *დ) ალოე;
- ე) ლახნანთეს.

916. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის ტკიფილის დროს, რომელიც მონაცევლეობს ტკიფილთან გულმკერდის არეში?

- ა) მაგნეზია სულფურიკა;
- ბ) აგარიკუს;
- გ) იოდი;
- დ) ალოე;
- *ე) ლახნანთეს.

917. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ თავის ტკიფილი მონაცევლეობს ტკიფილთან ზურგის არეში?

- *ა) ჰიოსციამუსი;
- ბ) გელტემინი;
- გ) არნიკა;
- დ) ლიკოპოდიუმი;
- ე) ქინა.

918. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ თავის ტკიფილი მონაცევლეობს ტკიფილთან მენჯის სახსარში?

- ა) ჰიოსციამუსი;
- *ბ) გელტემინი;
- გ) არნიკა;
- დ) ლიკოპოდიუმი;
- ე) ქინა.

919. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ თავის ტკიფილი მონაცევლეობს სწორი ნაწლავის გამოვარდნასთან?

- ა) ჰიოსციამუსი;
- ბ) გელტემინი;
- *გ) არნიკა;
- დ) ლიკოპოდიუმი;
- ე) ქინა.

920. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ თავის ტკიფილი მონაცევლეობს შარლში წითელი ნალექის გამოყოფასთან?

- ა) ჰიოსციამუსი;
- ბ) გელტემინი;
- გ) არნიკა;
- *დ) ლიკოპოდიუმი;
- ე) ქინა.

921. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ თავის ტკიფილი მონაცევლეობს ცუდ სიმმრებთან?

- ა) ჰიოსციამუსი;
- ბ) გელტემინი;
- გ) არნიკა;
- დ) ლიკოპოდიუმი;
- *ე) ქინა.

922. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ თავის ტკიფილი ვრცელდება საფეთქლებში?

- ა) სქეილა;
- *ბ) აბარუმ;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) აციდემ აცეტიკემ;
- ე) ჰელსატილა.

923. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ თავის ტკიფილი ვრცელდება თავის ირგვლივ?

- ა) სქეილა;
- ბ) აბარუმ;
- *გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) აციდემ აცეტიკემ;
- ე) ჰელსატილა.

924. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ თავის ტკიფილი ვრცელდება კილურების გასწვრივ?

- ა) სქეილი;
- ბ) აბარუმ;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- *დ) აცილებ აცეტიკუმ;
- ე) პულსატილა.

925. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ თავის ტკივილი ვრცელდება ბეჭებში?

- ა) სქეილი;
- ბ) აბარუმ;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) აცილებ აცეტიკუმ;
- *ე) პულსატილა.

926. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის ტკივილს, რომელიც ვრცელდება ხერხემლის გასწვრივ ქვევით?

- *ა) კოკულუსი;
- ბ) ჰიპერიკუმი;
- გ) იპეკაკუანა;
- დ) სპიგელია;
- ე) ლახეზისი.

927. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის ტკივილს, რომელიც ვრცელდება ყვრიმალში?

- ა) კოკულუსი;
- *ბ) ჰიპერიკუმი;
- გ) იპეკაკუანა;
- დ) სპიგელია;
- ე) ლახეზისი.

928. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის ტკივილს, რომელიც ვრცელდება ენაში?

- ა) კოკულუსი;
- ბ) ჰიპერიკუმი;
- *გ) იპეკაკუანა;
- დ) სპიგელია;
- ე) ლახეზისი.

929. რომელი პრეპარატი იხმარება მარცხენა საფეთქელში პერიოდული ტკივილის დროს?

- ა) კოკულუსი;
- ბ) ჰიპერიკუმი;
- გ) იპეკაკუანა;
- *დ) სპიგელია;
- ე) ლახეზისი.

930. რომელი პრეპარატი იხმარება მარცხენა საფეთქელში პულსირებადი ტკივილის დროს?

- ა) კოკულუსი;
- ბ) ჰიპერიკუმი;
- გ) იპეკაკუანა;
- *დ) სპიგელია;
- ე) ლახეზისი.

931. რომელი პრეპარატი იხმარება საფეთქლებში ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის წინ?

- ა) კოკულუსი;
- ბ) ჰიპერიკუმი;
- გ) იპეკაკუანა;
- დ) სპიგელია;
- *ე) ლახეზისი.

932. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც გრძელდება 14 სთ-მდე?

- ა) გრაფიტი;
- *ბ) კლემატის;
- გ) კობბლეტი;
- დ) რუს ტოქსი;
- ე) გელზემინი.

933. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში თუ იგი იწყება 15 საათშე?

- ა) გრაფიტი;

- ბ) კლემატის;
- *გ) კობალტი;
- დ) რუს ტოქსი;
- ე) გელზემინი.

934. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, თუ იგი იწყება 17 საათშე?

- ა) გრაფიტი;
- ბ) კლემატის;
- გ) კობალტი;
- *დ) რუს ტოქსი;
- ე) გელზემინი.

935. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, თუ იგი იწყება 11 საათშე?

- ა) გრაფიტი;
- ბ) კლემატის;
- გ) კობალტი;
- დ) რუს ტოქსი;
- *ე) გელზემინი.

936. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში გონებრივი გაღამაბვის შემდეგ?

- *ა) რუს ტოქსი;
- ბ) პტელეა;
- გ) გელზემინი;
- დ) სულფური;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

937. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კეფის არეში, თუ იგი იწყება 13 სთ-ბე?

- ა) რუს ტოქსი;
- *ბ) პტელეა;
- გ) გელზემინი;
- დ) სულფური;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

938. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება 16 სთ-ბე?

- ა) რუს ტოქსი;
- ბ) პტელეა;
- *გ) გელზემინი;
- დ) სულფური;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

939. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება 2 სთ-ბე?

- ა) რუს ტოქსი;
- ბ) პტელეა;
- გ) გელზემინი;
- *დ) სულფური;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

940. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, რომელიც იწყება 3 სთ-ბე?

- ა) რუს ტოქსი;
- ბ) პტელეა;
- გ) გელზემინი;
- დ) სულფური;
- *ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

941. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კეფის არეში, რომელიც სუსტლება დვინის დაღვევის შემდეგ?

- *ა) გელზემინი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) აციდუმ მურიატიკუმი;
- დ) პეტროლეუმი;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

942. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კეფის არეში, რომელიც ძლიერდება დვინის დაღვევის შემდეგ?

- ა) გელზემინი;
- *ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;

- გ) აცილებ მურიაფიკუმი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

943. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კეფის არეში, რომელიც ძლიერდება საწოლიადი ადგომისას?

- ა) გელზემინი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- * გ) აცილებ მურიაფიკუმი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

944. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კეფის არეში, რომელიც სუსტლება თავის შენჯვალებისას?

- * ა) გელზემინი;
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- გ) აცილებ მურიაფიკუმი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

945. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც სუსტლება მუცელზე დაწოლისას?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- * ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

946. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც მატელობს მარჯვენა გვერდზე დაწოლისას?

- * ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

947. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის დამთავრების შემდეგ?

- * ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

948. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც სუსტლება უხვად მოშარლვის შემდეგ?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- * გ) გელზემინი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

949. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც სუსტლება მარათი დანიავების შემდეგ?

- * ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;
- დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

950. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება შემცირების დროს?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;
- * დ) პეტროლუმებ;
- ე) პლუმბუმი.

951. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც სუსტლება თავზე შემოჭერით?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) გრატიოლა;
- გ) გელზემინი;

დ) პეტროლუმი;
* ე) პლატბუმი.

952. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი კეფის არეში, რომელიც სუსტლება გამოძინების შემდეგ?

- * ა) აცილებ ნიტრიკუმი;
ბ) ხამომილა;
გ) იგნაცია;
დ) ლიბინუმ;
ე) ბოვისტა.

953. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში ტკივილის დროს, რომელიც სუსტლება ერთ პოზაში დგომის შემდეგ?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
* ბ) ხამომილა;
გ) იგნაცია;
დ) ლიბინუმ;
ე) ბოვისტა.

954. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტკივილისას, რომელიც აღინიშნება დეფეკაციის დროს ჭინთვის შემდეგ?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
ბ) ხამომილა;
* გ) იგნაცია;
დ) ლიბინუმ;
ე) ბოვისტა.

955. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება ნესტიან ამინდში?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
ბ) ხამომილა;
გ) იგნაცია;
* დ) ლიბინუმ;
ე) ბოვისტა.

956. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კეფის არეში, რომელიც სუსტლება თბილ თთახში?

- ა) აცილებ ნიტრიკუმ;
ბ) ხამომილა;
გ) იგნაცია;
დ) ლიბინუმ;
* ე) ბოვისტა.

957. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კეფის არეში, რომელიც სუსტლება ფიბიკური ვარჯიშის შემდეგ?

- * ა) კაპტუს;
ბ) იგნაცია;
გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
დ) მოშუს;
ე) სულფურ.

958. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება ცივ ჰაერზე ყოფნის შემდეგ?

- ა) კაპტუს;
* ბ) იგნაცია;
გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
დ) მოშუს;
ე) სულფურ.

959. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტკივილის დროს, თუ იგი მონაცვლეობს ტკივილთან საფეთქლების არეში?

- ა) კაპტუს;
ბ) იგნაცია;
* გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
დ) მოშუს;
ე) სულფურ.

960. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში ტკივილის დროს, თუ იგი მონაცვლეობს ტკივილთან შებლის არეში?

- ა) კაპტუს;
ბ) იგნაცია;
გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
* დ) მოშუს;

გ) სელფურ.

961. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კეფის არეში, თუ იგი მონაცემებს ტკიფილთან სახსრებში?

- ა) ქაქტუს;
- ბ) იგნაცია;
- გ) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- დ) მოშუს;
- *ე) სელფურ.

962. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, რომელიც ვრცელდება მთელ თავში?

- *ა) ხინა;
- ბ) ლაცეროცერატუს;
- გ) გრაფიტი;
- დ) კორნუს;
- ე) ხამომილა.

963. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი კეფის არეში, რომელიც ვრცელდება ყელში?

- ა) ხინა;
- *ბ) ლაცეროცერატუს;
- გ) გრაფიტი;
- დ) კორნუს;
- ე) ხამომილა.

964. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კეფის არეში, რომელიც ვრცელდება შკერდში?

- ა) ხინა;
- ბ) ლაცეროცერატუს;
- *გ) გრაფიტი;
- დ) კორნუს;
- ე) ხამომილა.

965. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც ვრცელდება ცხვირში?

- ა) ხინა;
- ბ) ლაცეროცერატუს;
- გ) გრაფიტი;
- *დ) კორნუს;
- ე) ხამომილა.

966. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტკიფილის დროს ქვედა ყბაში გავრცელებით?

- ა) ხინა;
- ბ) ლაცეროცერატუს;
- გ) გრაფიტი;
- დ) კორნუს;
- *ე) ხამომილა.

967. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მარცხენა მხარეს კეფაბე გაგრცელებით?

- *ა) ნატრიუმ კარბონიკა;
- ბ) სელფურ;
- გ) ლახნანტეს;
- დ) ჰლატინა;
- ე) კოკულეს.

968. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მარჯვენა მხარეს დამე?

- ა) ნატრიუმ კარბონიკა;
- *ბ) სელფურ;
- გ) ლახნანტეს;
- დ) ჰლატინა;
- ე) კოკულეს.

969. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ტკიფილის დროს ლოფაში გავრცელებით?

- ა) ნატრიუმ კარბონიკა;
- ბ) სელფურ;
- *გ) ლახნანტეს;
- დ) ჰლატინა;

ე) კოკულებს.

970. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება თვალების გადაბაბვის შემდეგ?
- ა) ნატრიუმ კარბონიტი
 - ბ) სულფურ;
 - გ) ლახნანტექს;
 - *დ) პლატინა;
 - ე) კოკულებს.

971. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება თვალების ძლიერად მოხუჭვის შემდეგ?
- ა) სელენიუმი;
 - ბ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - *გ) კოკულებს;
 - დ) ნუქს ვომიკა;
 - ე) მანგანუმი.

972. რომელი პრეპარატი კურნაფს ტკიფილს შებლის არეში, რომელიც აღინიშნება ძლიერი სუნების ზემოქმედების შემდეგ?
- *ა) სელენიუმი;
 - ბ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - გ) პლუმბუმი;
 - დ) ნუქს ვომიკა;
 - ე) მანგანუმი.

973. რომელი პრეპარატი კურნაფს ტკიფილს შებლის არეში, რომელიც აღინიშნება შენსტრუაციის შემდეგ?
- ა) სელენიუმი;
 - *ბ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - გ) პლუმბუმი;
 - დ) ნუქს ვომიკა;
 - ე) მანგანუმი.

974. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ტკიფილის დროს, თუ იგი ჩნდება საზოგადოებაში დიდხანს ყოფნის შემდეგ?
- ა) სელენიუმი;
 - ბ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - *გ) პლუმბუმი;
 - დ) ნუქს ვომიკა;
 - ე) მანგანუმი.

975. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ტკიფილის დროს, თუ იგი ჩნდება ცეცხლის ახლოს ყოფნის შემდეგ?
- ა) სელენიუმი;
 - ბ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - გ) პლუმბუმი;
 - *დ) ნუქს ვომიკა;
 - ე) მანგანუმი.

976. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკიფილი შებლის არეში შემცირების შემდეგ?
- ა) მერკურ კორობიფეს;
 - ბ) სპიგელია;
 - *გ) მანგანუმი;
 - დ) იგნაცია;
 - ე) კალკარუმ კარბონიკა.

977. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება მოგზაურობის შემდეგ?
- *ა) ნაია;
 - ბ) გელტემინი;
 - გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - დ) ბრომი;
 - ე) ჰიდრასტისი.

978. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილისას, თუ იგი ჩნდება საუმშის დროს?
- ა) ნაია;
 - *ბ) გელტემინი;
 - გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
 - დ) ბრომი;

ე) ჰიდრასტისი.

979. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს თავის მარჯვენა გვერდზე, რომელიც ჩნდება რძის დაღვევის შემდეგ?

- ა) ნაია;
- ბ) გელტემინი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- *დ) ბრომი;
- ე) ჰიდრასტისი.

980. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება წერის დროს?

- ა) ნაია;
- *ბ) გელტემინი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) ბრომი;
- ე) ჰიდრასტისი.

981. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილს, თუ იგი ჩნდება ფეხით მთაში, კიბეზე ასვლის დროს?

- ა) ნაია;
- ბ) გელტემინი;
- გ) ფერუმ მეტალიკუმი;
- დ) ბრომი;
- *ე) ჰიდრასტისი.

982. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება საუბრისას?

- ა) კაპტუსი;
- *ბ) იგნაცია;
- გ) სპიგელია;
- დ) სეპია;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

983. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება კაშკაშა სინათლეზე?

- *ა) კაპტუსი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) სპიგელია;
- დ) სეპია;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

984. რომელი პრეპარატი დანიშნავთ თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება კაშკაშა სინათლეზე?

- ა) კაპტუსი;
- ბ) იგნაცია;
- *გ) სპიგელია;
- დ) სეპია;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

985. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება დეფეკაციის პერიოდში?

- ა) კაპტუსი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) სპიგელია;
- *დ) სეპია;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

986. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება სწრაფი სიარულის დროს?

- ა) კაპტუსი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) სპიგელია;
- *დ) სეპია;
- ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

987. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს წარბებში ირალიაციით?

- ა) კაპტუსი;
- ბ) იგნაცია;
- გ) სპიგელია;
- დ) სეპია;
- *ე) ქინინუმ სულფურიკუმ.

989. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს ბეჭებში გავრცელებით?

- ა) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- *ბ) ხელიდონიუმი;
- გ) ლიბინიუმი;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმი;
- ე) აგარიკუსი.

990. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს წელის არეში ირადიაციით?

- ა) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- *გ) ლიბინიუმი;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმი;
- ე) აგარიკუსი.

991. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის მარჯვენა გვერდზე ტკიფილის დროს გავრცელებით ყურის უკან?

- ა) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- გ) ლიბინიუმი
- *დ) აციდუმ პიკრიკუმი;
- ე) აგარიკუსი.

992. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება დამის საათებში?

- ა) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- გ) ლიბინიუმი;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმი;
- *ე) აგარიკუსი.

993. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება დია ჰაერზე სიარულისას?

- ა) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- ბ) ხელიდონიუმი;
- გ) ლიბინიუმი;
- დ) აციდუმ პიკრიკუმი;
- *ე) აგარიკუსი.

994. რომელი პრეპარატი კურნაჟს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, რომელიც უარესდება დილის ძილის შემდეგ?

- ა) სპიგელია;
- *ბ) კალალიუმი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკუმი;
- დ) დულკამარა;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

995. რომელი პრეპარატი კურნაჟს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სადამოს მზის ჩასვლის შემდეგ?

- ა) სპიგელია;
- ბ) კალალიუმი;
- *გ) ნატრიუმ სულფურიკუმი;
- დ) დულკამარა;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

996. რომელი პრეპარატი კურნაჟს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სადამოს სიარულის დროს?

- ა) სპიგელია;
- ბ) კალალიუმი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკუმი;
- *დ) დულკამარა;
- ე) არსენიკუმ ალბუმ.

997. რომელი პრეპარატი კურნაჟს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, თუ იგი ჩნდება 2 საათშე?

- ა) სპიგელია;
- ბ) კალალიუმი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკუმი;
- დ) დულკამარა;
- *ე) არსენიკუმ ალბუმ.

998. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, თუ იგი აღინიშნება შეკრულობის დროს?

- * ა) იაფროპა;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კარბო ანიმალის;
- დ) სეპია;
- ე) უსტილაგო.

999. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, თუ იგი ჩნდება სლოკინის დროს?

- ა) იაფროპა;
- * ბ) ბრიონია;
- გ) კარბო ანიმალის;
- დ) სეპია;
- ე) უსტილაგო.

1000. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ცხვირიდან სისხლდენის წინ?

- ა) იაფროპა;
- ბ) ბრიონია;
- * გ) კარბო ანიმალის;
- დ) სეპია;
- ე) უსტილაგო.

1001. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის შემდეგ?

- ა) იაფროპა;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კარბო ანიმალის;
- დ) სეპია;
- * ე) უსტილაგო.

1002. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება შენობაში შესვლის შემდეგ?

- * ა) ბოვისტა;
- ბ) ტუია;
- გ) სილიცეა;
- დ) სულფური;
- ე) ჰიპერიკუმი.

1003. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება სიბნელეში?

- ა) ბოვისტა;
- ბ) ტუია;
- * გ) სილიცეა;
- დ) სულფური;
- ე) ჰიპერიკუმი.

1004. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს, თუ მდგომარეობა უმჯობესდება ოფლდენის შედეგად?

- ა) ბოვისტა;
- * ბ) ტუია;
- გ) სილიცეა;
- დ) სულფური;
- ე) ჰიპერიკუმი.

1005. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილი საფეთქლების არეში დილით ლოგინიდან ადგომის შემდეგ?

- ა) ბოვისტა;
- ბ) ტუია;
- გ) სილიცეა;
- * დ) სულფური;
- ე) ჰიპერიკუმი.

1006. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილი საფეთქლების არეში საუმშის შემდეგ?

- ა) ბოვისტა;
- ბ) ტუია;
- გ) სილიცეა;

- დ) სელფური;
* ე) ჰიპერიფერი.

1007. რომელი პრეპარატი ინიშნება დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს საფეთქლების არეში, რომელიც აღინიშნება ლეფეკაციის წინ?

- * ა) მერკურ სოლუბილის;
ბ) სილიცეა;
გ) სპიგელია;
დ) საბადილა;
ე) ალუმინა.

1008. რომელი პრეპარატი ინიშნება დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს საფეთქლების არეში, რომელიც აღინიშნება ლეფეკაციის დროს?

- * ა) მერკურ სოლუბილის;
ბ) სილიცეა;
გ) სპიგელია;
დ) საბადილა;
ე) ალუმინა.

1009. რომელი პრეპარატი ინიშნება დაწოლითი ხასიათის თავის ტკიფილის დროს საფეთქლების არეში, რომელიც აღინიშნება ლეფეკაციის შემდეგ?

- ა) მერკურ სოლუბილის;
* ბ) სილიცეა;
გ) სპიგელია;
დ) საბადილა;
ე) ალუმინა.

1010. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკიფილს საფეთქლების არეში ხმაურის დროს?

- ა) მერკურ სოლუბილის;
ბ) სილიცეა;
* გ) სპიგელია;
დ) საბადილა;
ე) ალუმინა.

1011. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ დაწოლითი ხასიათის ტკიფილის დროს საფეთქლების არეში გავრცელებით ქვემოთ?

- ა) მერკურ სოლუბილის;
ბ) სილიცეა;
გ) სპიგელია;
* დ) საბადილა;
ე) ალუმინა.

1012. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის არეში სიცხის შეგრძნება, რომელიც უმჯობესდება ხელებით დაწოლით?

- * ა) ნუქს ვომიკა;
ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
გ) გლიკომოდიუმ;
დ) გრაფიოლა;
ე) ლაუროცერაცეუს.

1013. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის არეში სიცხის შეგრძნება, რომელიც აღინიშნება ცხელი საკვების მიღების შემდეგ?

- ა) ნუქს ვომიკა;
* ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
გ) გლიკომოდიუმ;
დ) გრაფიოლა;
ე) ლაუროცერაცეუს.

1014. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის არეში სიცხის შეგრძნება, რომელიც აღინიშნება მგბავრობისას?

- ა) ნუქს ვომიკა;
ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
* გ) ლიკომოდიუმ;
დ) გრაფიოლა;
ე) ლაუროცერაცეუს.

1015. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის არეში სიცხის შეგრძნება, რომელიც აღინიშნება მუცელში ტკიფილის დროს?

- ა) ნუქს ვომიკა;

- ბ) მაგნეტია კარბონიუმ;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- *დ) გრატიოლა;
- ე) ლაუროცერასუს.

1016. რომელ პრეპარატს ახასიათებს თავის არეში სიცხის შეგრძნება, რომელიც აღინიშნება საუბრის შემდეგ?

- ა) ნუქს ვომიკა;
- ბ) მაგნეტია კარბონიუმ;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- დ) გრატიოლა;
- *ე) ლაუროცერასუს.

1017. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება შემინების შემდეგ?

- *ა) აცილუმ ფოსფორიკუმ;
- ბ) სეპია;
- გ) ამბრა გრიზეა;
- დ) სტრამონიუმ;
- ე) კალალიუმ.

1018. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში სიცხის შეგრძნებისას, რომელიც აღინიშნება შარლვის დროს?

- ა) აცილუმ ფოსფორიკუმ;
- *ბ) სეპია;
- გ) ამბრა გრიზეა;
- დ) სტრამონიუმ;
- ე) კალალიუმ.

1019. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება მუსიკის ზემოქმედებით?

- ა) აცილუმ ფოსფორიკუმ;
- ბ) სეპია;
- *გ) ამბრა გრიზეა;
- დ) სტრამონიუმ;
- ე) კალალიუმ.

1020. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება შემცირების წინ?

- ა) აცილუმ ფოსფორიკუმ;
- ბ) სეპია;
- გ) ამბრა გრიზეა;
- *დ) სტრამონიუმ;
- ე) კალალიუმ.

1021. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება პერიოდულად?

- ა) აცილუმ ფოსფორიკუმ;
- ბ) სეპია;
- გ) ამბრა გრიზეა;
- დ) სტრამონიუმ;
- *ე) კალალიუმ.

1022. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი აღინიშნება გაღვიძების წინ?

- ა) კალიუმ კარბონიკუმ;
- *ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) ლაუროცერასუს;
- დ) ტუია;
- ე) კაუსტიკუმ.

1023. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი აღინიშნება ეპილეფსიური შეჩვების წინ?

- ა) კალიუმ კარბონიკუმ;
- ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) ლაუროცერასუს;
- დ) ტუია;
- *ე) კაუსტიკუმ.

1024. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი უმჯობესდება ლოგინში წოლისას?

- *ა) კალიუმ კარბონიკუმ;
- ბ) ჰიპერიკუმ;

გ) ლაუროცერასუს;

დ) ტეიბ;

ე) კაუსტიკუმ.

1025. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი უმჯობესდება ძილის წინ?

ა) კალიუმ კარბონიკუმ;

ბ) ჰიპერიკუმ;

* გ) ლაუროცერასუს;

დ) ტეიბ;

ე) კაუსტიკუმ.

1026. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, რომელიც მონაცემებს გაშეშების შეგრძნებასთან შერების არეში?

ა) კალიუმ კარბონიკუმ;

ბ) ჰიპერიკუმ;

* გ) ლაუროცერასუს;

* დ) სპონგია;

ე) კაუსტიკუმ.

1027. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცხის შეგრძნებას კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება დილით?

* ა) სულფურ;

ბ) სუმბუკუს;

გ) აპის;

დ) კოკა;

ე) თეა.

1028. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცხის შეგრძნებას კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება საღამოს?

ა) სულფურ;

* ბ) სუმბუკუს;

გ) აპის;

დ) კოკა;

ე) თეა.

1029. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცხის შეგრძნებას კეფის არეში, რომელიც აღინიშნება თბილ შენობაში?

* ა) სულფურ;

ბ) სუმბუკუს;

გ) აპის;

დ) კოკა;

ე) თეა.

1030. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცხის შეგრძნებას კეფის არეში, რომელიც უმჯობესდება ღია ჰაერზე სეირნობისას?

* ა) სულფურ;

ბ) სუმბუკუს;

გ) აპის;

დ) კოკა;

ე) თეა.

1031. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი აღინიშნება შუალდებე?

* ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;

ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;

გ) ალუმინი;

დ) კალი კარბონიკ;

ე) მეტერუუმ.

1032. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი აღინიშნება საღამოს წერისას?

ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;

* ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;

გ) ალუმინი;

დ) კალი კარბონიკ;

ე) მეტერუუმ.

1033. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში სიცხის შეგრძნების დროს, თუ იგი აღინიშნება საღილის შემდეგ?

ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;

ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;

- * გ) ალექსანდრე გორგავაძე;
- დ) კალი კარბონიკ;
- ე) მეგერეუებ.

1034. რომელი პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში სიცხის შეგრძნებისას, თუ იგი აღინიშნება წერის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ალექსანდრე გორგავაძე;
- * დ) კალი კარბონიკ;
- ე) მეგერეუებ.

1035. რომელი პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში სიცხის შეგრძნებისას, თუ იგი აღინიშნება სიარულის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმ;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ალექსანდრე გორგავაძე;
- * დ) კალი კარბონიკ;
- ე) მეგერეუებ.

1036. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის კანის არეში ქავილის დროს, რომელიც აღინიშნება შეაღლის შემდეგ?

- * ა) სეპია;
- ბ) ხელიდონიუმ;
- გ) კალი ფოსფორ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აცილეუმ ფოსფორიკუმ.

1037. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის კანის არეში ქავილის დროს, რომელიც აღინიშნება 14 საათზე?

- ა) სეპია;
- * ბ) ხელიდონიუმ;
- გ) კალი ფოსფორ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აცილეუმ ფოსფორიკუმ.

1038. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის კანის არეში ქავილის დროს, რომელიც აღინიშნება 3-დან 5 საათამდე?

- ა) სეპია;
- ბ) ხელიდონიუმ;
- * გ) კალი ფოსფორ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აცილეუმ ფოსფორიკუმ.

1039. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის კანის არეში ქავილის დროს, რომელიც აღინიშნება ნესტიან ამინდში?

- ა) სეპია;
- ბ) ხელიდონიუმ;
- გ) კალი ფოსფორ;
- * დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აცილეუმ ფოსფორიკუმ.

1040. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის კანის არეში ქავილის დროს, რომელიც ჩნდება მოულოდნელად?

- ა) სეპია;
- ბ) ხელიდონიუმ;
- გ) კალი ფოსფორ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- * ე) აცილეუმ ფოსფორიკუმ.

1041. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში ქავილის დროს, თუ იგი ჩნდება წეიმიან ამინდში?

- * ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) საბალიდ;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) აპის.

1042. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში მტანჯველი ქავილის დროს?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- * ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) საბალიდ;

დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) აპის.

1043. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში ქავილისას, თუ იგი ჩნდება ოფლიანობის დროს?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
*გ) საბადილა;
დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) აპის.

1044. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში ქავილის დროს, თუ იგი ჩნდება მაშინ, როცა ადამიანი გახდილია?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
*ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
გ) საბადილა;
დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) აპის.

1045. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში ქავილისას, თუ იგი ჩნდება ღია ჰაერზე სეირნობის დროს?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
გ) საბადილა;
*დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) აპის.

1046. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის კანის არეში ქავილის დროს, თუ იგი ჩნდება სიცივეზე?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
*ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
გ) საბადილა;
დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) აპის.

1047. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში ღვინის დალევის შემდეგ?

- *ა) სილიცეა;
ბ) კოფეა;
გ) პეტროლეუმ;
დ) აციდუმ ფოსფორიკუმ;
ე) ნაფრიუმ კარბონიკუმ.

1048. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში სასიამოვნო მოულოდნელობის შემდეგ?

- ა) სილიცეა;
*ბ) კოფეა;
გ) პეტროლეუმ;
დ) აციდუმ ფოსფორიკუმ;
ე) ნაფრიუმ კარბონიკუმ.

1049. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში სწრაფი მოძრაობის შემდეგ?

- ა) სილიცეა;
ბ) კოფეა;
*გ) პეტროლეუმ;
დ) აციდუმ ფოსფორიკუმ;
ე) ნაფრიუმ კარბონიკუმ.

1050. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში შეშინების ან დარღის შემდეგ?

- ა) სილიცეა;
ბ) კოფეა;
გ) პეტროლეუმ;
*დ) აციდუმ ფოსფორიკუმ;
ე) ნაფრიუმ კარბონიკუმ.

1051. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში წოლისას გაუმჯობესებით?

- ა) სილიცეა;
ბ) კოფეა;
გ) პეტროლეუმ;
დ) აციდუმ ფოსფორიკუმ;

*ე) ნაგრიუმ კარბონიუმ.

1052. რომელი პრეპარატი კურნავს კონგესტიას თავის არეში, რომელიც აღინიშნება ზურგზე წოლისას?

*ა) სულფური;

ბ) აცილუმ მურეატიუმ;

გ) ამბრა გრიზე;

დ) ბელადონა;

ე) ლაკ კანინუმ.

1053. რომელი პრეპარატი კურნავს კონგესტიას თავის არეში, რომელიც აღინიშნება გვერდზე წოლისას?

ა) სულფური;

*ბ) აცილუმ მურეატიუმ;

გ) ამბრა გრიზე;

დ) ბელადონა;

ე) ლაკ კანინუმ.

1054. რომელი პრეპარატი კურნავს კონგესტიას თავის არეში, რომელიც აღინიშნება მუსიკის ზემოქმედებით?

ა) სულფური;

ბ) აცილუმ მურეატიუმ;

*გ) ამბრა გრიზე;

დ) ბელადონა;

ე) ლაკ კანინუმ.

1055. რომელი პრეპარატი კურნავს კონგესტიას თავის არეში, რომელიც აღინიშნება თავის უკან გადახრისას?

ა) სულფური;

ბ) აცილუმ მურეატიუმ;

გ) ამბრა გრიზე;

*დ) ბელადონა;

ე) ლაკ კანინუმ.

1056. რომელი პრეპარატი კურნავს კონგესტიას თავის არეში, რომელიც აღინიშნება თავის წინ გადახრისას?

ა) სულფური;

ბ) აცილუმ მურეატიუმ;

გ) ამბრა გრიზე;

დ) ბელადონა;

*ე) ლაკ კანინუმ.

1057. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში კონგესტიის დროს, თუ იგი აღინიშნება წერის დროს?

*ა) კანაბის სატივა;

ბ) ლიკოპოდიუმ;

გ) ოლეანდერ;

დ) ტუია;

ე) ლულკამარა.

1058. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში კონგესტიის დროს, თუ იგი აღინიშნება თავის აწევისას?

ა) კანაბის სატივა;

*ბ) ლიკოპოდიუმ;

გ) ოლეანდერ;

დ) ტუია;

ე) ლულკამარა.

1059. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში კონგესტიის დროს, თუ იგი აღინიშნება შენობაში შესვლისას?

ა) კანაბის სატივა;

ბ) ლიკოპოდიუმ;

*გ) ოლეანდერ;

დ) ტუია;

ე) ლულკამარა.

1060. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში კონგესტიის დროს, თუ იგი აღინიშნება ოფლდენისას?

ა) კანაბის სატივა;

ბ) ლიკოპოდიუმ;

გ) ოლეანდერ;

*დ) ტუია;

ე) ლულკამარა.

1061. რომელი პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში კონგესტიის დროს, თუ იგი აღინიშნება ფეხების დასველების შემდეგ?

ა) კანაბის სატივა;

ბ) ლიკოპოდიუმ;

გ) ოლეანდერ;

დ) ტუია;

*ე) დელგამარა.

1062. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში კონგესტიის დროს, რომელიც გვხვდება საუბრისას?

*ა) კოფეა;

ბ) ალოე;

გ) გლონოინი;

დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;

ე) სულფურ.

1063. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში კონგესტიის დროს, რომელიც გვხვდება დეფეკაციის წინ?

ა) კოფეა;

*ბ) ალოე;

გ) გლონოინი;

დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;

ე) სულფურ.

1064. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში კონგესტიის დროს, რომელიც გვხვდება კრუნჩხვების წინ?

ა) კოფეა;

ბ) ალოე;

*გ) გლონოინი;

დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;

ე) სულფურ.

1065. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში კონგესტიის დროს, რომელიც გვხვდება სიმძიმის აწევის შემდეგ?

ა) კოფეა;

ბ) ალოე;

გ) გლონოინი;

*დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;

ე) სულფურ.

1066. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში კონგესტიის დროს, რომელიც გვხვდება ვარჯიშისას?

ა) კოფეა;

ბ) ალოე;

გ) გლონოინი;

დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;

*ე) სულფურ.

1067. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში სწრაფი სიარულისას?

*ა) ფოსფორი;

ბ) ხამომილა;

გ) კალკარეა არსენიკოსა;

დ) კროტონ ტიგლიუმ;

ე) ხინა.

1068. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში გაუმჯობესებით სიარულის დროს?

ა) ფოსფორი;

*ბ) ხამომილა;

გ) კალკარეა არსენიკოსა;

დ) კროტონ ტიგლიუმ;

ე) ხინა.

1069. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში ეპილეფსიური შეტევის წინ?

ა) ფოსფორი;

ბ) ხამომილა;

*გ) კალკარეა არსენიკოსა;

დ) კროტონ ტიგლიუმ;

ე) ხინა.

1070. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში მუცლიდან გავრცელებით?

- ა) ფოსფორი;
- ბ) ხამომიღა;
- გ) კალკარეა არსენიკოსა;
- *დ) კროტონ ტიგლიუმ;
- ე) ხინა.

1071. რომელ პრეპარატს ახასიათებს კონგესტია თავის არეში ზურგიდან გავრცელებით?

- *ა) ფოსფორი;
- ბ) ხამომიღა;
- გ) კალკარეა არსენიკოსა;
- დ) კროტონ ტიგლიუმ;
- ე) ხინა.

1072. რას დანიშნავთ კეფის არეში სიმსუბუქის შეგრძნების დროს?

- ა) სეპია;
- *ბ) სეპალე კორნეტუმ;
- გ) აპის;
- დ) კოკა;
- ე) თება.

1073. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნებას, თუ იგი აღინიშნება საღამოს ლოგინში?

- *ა) რანუნკულეს ბულბოსუს;
- ბ) აკონიფუმ;
- გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) აპის.

1074. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნებას, თუ იგი აღინიშნება სიარულის დროს?

- ა) რანუნკულეს ბულბოსუს;
- ბ) აკონიფუმ;
- *გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) აპის.

1075. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნებას, თუ იგი უმჯობესდება სითბოში?

- ა) რანუნკულეს ბულბოსუს;
- *ბ) აკონიფუმ;
- გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) აპის.

1076. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება თავის არეში დილით?

- *ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) პლაგინი;
- დ) ნატრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელიდონიუმ.

1077. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება თავის არეში წილისას?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- *ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) პლაგინი;
- დ) ნატრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელიდონიუმ.

1078. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება თავის არეში მენსტრუაციის დროს?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- *გ) პლაგინი;
- დ) ნატრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელიდონიუმ.

1079. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება თავის არეში საღილის შემდეგ?

- * ა) კარბო ვეგეტაციულის;
- ბ) მერკურ სოლუბილის;
- გ) პლატინა;
- დ) ნაფრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელილონიუმ.

1080. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება შებლის არეში საღამოს?

- ა) კარბო ვეგეტაციულის;
- ბ) მერკურ სოლუბილის;
- გ) პლატინა;
- * დ) ნაფრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელილონიუმ.

1081. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება შებლის არეში საღამოს თბილ შენობაში?

- ა) კარბო ვეგეტაციულის;
- ბ) მერკურ სოლუბილის;
- * გ) პლატინა;
- დ) ნაფრიუმ არსენიკომუმ;
- ე) ხელილონიუმ.

1082. რომელ პრეპარატს ახასიათებს დაბუქების შეგრძნება თავის მარჯვენა გვერდზე?

- ა) კარბო ვეგეტაციულის;
- ბ) მერკურ სოლუბილის
- გ) პლატინა;
- დ) ნაფრიუმ არსენიკომუმ;
- * ე) ხელილონიუმ.

1083. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვლეფის შეგრძნების დროს მარცხენა მხარეს?

- * ა) კალადიუმ;
- ბ) კონიუმ;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) ოპიუმ;
- ე) აპის.

1084. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვლეფის შეგრძნების დროს ჭამის შემდეგ?

- ა) კალადიუმ;
- * ბ) კონიუმ;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) ოპიუმ;
- ე) აპის.

1085. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვლეფის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება მწოდიარე მდგომარეობაში?

- ა) კალადიუმ;
- ბ) კონიუმ;
- * გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) ოპიუმ;
- ე) აპის.

1086. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვლეფის შეგრძნების დროს გადაბმული ქეიფის შემდეგ?

- ა) კალადიუმ;
- ბ) კონიუმ;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- * დ) ოპიუმ;
- ე) აპის.

1087. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სისაცსის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება 12-დან 14 საათამდე?

- * ა) აცილებ პიკრიკუმ;
- ბ) აილანგუს;
- გ) ბორაქს;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- ე) კონიუმ.

1088. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სისაცსის შეგრძნების დროს, რომელიც აღინიშნება დვინის დალევის შემდეგ?

- ა) აცილებმ პიკრიკუმ;
- *ბ) აილანგუს;
- გ) ბორაქს;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- ე) კონიუმ.

1089. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სისაცსის შეგრძნებისას, რომელიც აღინიშნება ქვემოთ მოძრაობის დროს?

- ა) აცილებმ პიკრიკუმ;
- ბ) აილანგუს;
- *გ) ბორაქს;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- ე) კონიუმ.

1090. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სისაცსის შეგრძნებისას, რომელიც აღინიშნება ჭამის დროს?

- ა) აცილებმ პიკრიკუმ;
- ბ) აილანგუს;
- გ) ბორაქს;
- დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- *ე) კონიუმ.

1091. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში სისაცსის შეგრძნების დროს, რომელიც უარესდება მოძრაობის შემდეგ?

- ა) აცილებმ პიკრიკუმ;
- ბ) აილანგუს;
- გ) ბორაქს;
- *დ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- ე) კონიუმ.

1092. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სისაცსის შეგრძნებას, რომელიც აღინიშნება წოლისას?

- *ა) ნაია;
- ბ) გლონოინ;
- გ) ბრომ;
- დ) გინსენგი;
- ე) ხინიუმ სულფურიკუმ.

1093. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სისაცსის შეგრძნებას, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის წამოსედისას?

- ა) ნაია;
- *ბ) გლონოინ;
- გ) ბრომ;
- დ) გინსენგი;
- ე) ხინიუმ სულფურიკუმ.

1094. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სისაცსის შეგრძნებას, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის წინ?

- ა) ნაია;
- ბ) გლონოინ;
- *გ) ბრომ;
- დ) გინსენგი;
- ე) ხინიუმ სულფურიკუმ.

1095. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სისაცსის შეგრძნებას, რომელიც აღინიშნება სადილის შემდეგ?

- ა) ნაია;
- ბ) გლონოინ;
- გ) ბრომ;
- *დ) გინსენგი;
- ე) ხინიუმ სულფურიკუმ.

1096. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სისაცსის შეგრძნებას, რომელიც აღინიშნება წერისას?

- ა) ნაია;
- ბ) გლონოინ;
- გ) ბრომ;
- დ) გინსენგი;
- *ე) ხინიუმ სულფურიკუმ.

1097. რომელ პრეპარატს ახასიათებს სისაცსის შეგრძნება შებლის არეში კითხვის დროს?

- ა) კონიუმ;

- *ბ) ინდიგო;
- გ) მილეფოლიუმ;
- დ) ფოსფორი;
- ე) გინსენგი.

1098. რომელ პრეპარატს ახასიათებს სისაცსის შეგრძნება შებლის არეში დახრისხს?

- *ბ) აკონიფუმ;
- ბ) ინდიგო;
- გ) მილეფოლიუმ;
- დ) ფოსფორი;
- ე) გინსენგი.

1099. რომელ პრეპარატს ახასიათებს სისაცსის შეგრძნება შებლის არეში კოიტუსის შემდეგ?

- ა) აკონიფუმ;
- ბ) ინდიგო;
- გ) მილეფოლიუმ;
- *დ) ფოსფორი;
- ე) გინსენგი.

1100. რომელი პრეპარატი კურნავს ოფლიანობას თავის არეში დიღით ადგომისას?

- *ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) პეტროლეუმ;
- დ) რუს ტოქსიკოლენდრონ;
- ე) ფიტოსტიგმა.

1101. რომელი პრეპარატი კურნავს ოფლიანობას თავის არეში შეადლის წინ?

- ა) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- *ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) პეტროლეუმ;
- დ) რუს ტოქსიკოლენდრონ;
- ე) ფიტოსტიგმა.

1102. რომელი პრეპარატი კურნავს ოფლიანობას თავის არეში საღამოს დაწოლის შემდეგ?

- ა) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *გ) პეტროლეუმ;
- დ) რუს ტოქსიკოლენდრონ;
- ე) ფიტოსტიგმა.

1103. რომელი პრეპარატი კურნავს ოფლიანობას თავის არეში შეაღამებენ?

- ა) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) პეტროლეუმ;
- *დ) რუს ტოქსიკოლენდრონ;
- ე) ფიტოსტიგმა.

1104. რომელი პრეპარატი კურნავს ოფლიანობას თავის არეში, რასაც თან ახლავს თავის ტკივილი?

- ა) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) პეტროლეუმ;
- დ) რუს ტოქსიკოლენდრონ;
- *ე) ფიტოსტიგმა.

1105. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვლეფითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება დღისით?

- *ბ) სულფური;
- ბ) ალუმინია;
- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აგარიკუსი.

1106. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვლეფითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება 14 საათზე?

- ა) სულფური;
- *ბ) ალუმინია;

- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აგარიკესი.

1107. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება ჩაძინებისას?

- ა) სულფური;
- *ბ) ალუმინა;
- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აგარიკესი.

1108. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება 18 საათზე?

- ა) სულფური;
- ბ) ალუმინა;
- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- *დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აგარიკესი.

1109. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება აღგომის შემდეგ?

- ა) სულფური;
- ბ) ალუმინა;
- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *ე) აგარიკესი.

1110. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება თვალების მოძრაობის შემდეგ?

- *ბ) დრობერა;
- ბ) ალუმინა;
- გ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;
- დ) არნიკა;
- ე) იპეკაკუანა.

1111. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება ჩაძინებისას?

- ა) დრობერა;
- *ბ) ალუმინა;
- გ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;
- დ) არნიკა;
- ე) იპეკაკუანა.

1112. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება სადილის შემდეგ?

- ა) დრობერა;
- ბ) ალუმინა;
- *გ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;
- დ) არნიკა;
- ე) იპეკაკუანა.

1113. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება შემწივნებისას?

- ა) დრობერა;
- ბ) ალუმინა;
- გ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;
- *დ) არნიკა;
- ე) იპეკაკუანა.

1114. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეტითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება შეხების შემდეგ?

- ა) დრობერა;
- ბ) ალუმინა;
- გ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;
- დ) არნიკა;
- *ე) იპეკაკუანა.

1115. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს დაბანის შემდეგ?

- *ა) გრაფიტი;
- ბ) ბრიონია;

- გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
ღ) პტელეა;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1116. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს თუ იგი აღინიშნება საწოლში წოლისას?

ა) გრაფიტი;
*ბ) ბრიონია;
გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
ღ) პტელეა;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1117. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს თუ იგი აღინიშნება გაღვიძებისას?

ა) გრაფიტი;
ბ) ბრიონია;
*გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
ღ) პტელეა;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1118. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობისას დეფეკაციის დროს?

ა) გრაფიტი;
ბ) ბრიონია;
გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
*ღ) პტელეა;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1119. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს ცივ ჰაერზე ყოფნისას?

ა) გრაფიტი;
ბ) ბრიონია;
გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
ღ) პტელეა;
*ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1120. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს თუ იგი აღინიშნება კითხვისას?

ა) გრაფიტი;
*ბ) ნატრიუმ სულფურიკუმ;
გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
ღ) პტელეა;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1121. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ოფლიანობის დროს ეპილეფსიური შეტევის წინ?

ა) გრაფიტი;
ბ) ბრიონია;
გ) აცილებ ფოსფორიკუმ;
*ღ) კაუსტიკუმ;
ე) კალკარუბ კარბონიკა.

1122. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ოფლიანობის დროს, რომელიც აღინიშნება დილით დოგინში?

*ა) სტაფიბაგრია;
ბ) ფიტოსტიგმა;
გ) სტანუმ;
ღ) ნექს ვომიკა;
ე) დიოსკორეა.

1123. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ოფლიანობის დროს, რომელიც აღინიშნება დილით დოგინში?

ა) სტაფიბაგრია;
*ბ) ფიტოსტიგმა;
გ) სტანუმ;
ღ) ნექს ვომიკა;
ე) დიოსკორეა.

1124. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ოფლიანობის დროს, რომელიც აღინიშნება 4 საათზე?

ა) სტაფიბაგრია;
ბ) ფიტოსტიგმა;
*გ) სტანუმ;

- დ) ნუქს ვომიკა;
ე) დიოსკორეა.

1125. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში თფლიანობის დროს, რომელიც აღინიშნება 6 საათშე?

- ა) სტაფიბაგრია;
ბ) ფიტოსტიგმა;
გ) სტანუმ;
*დ) ნუქს ვომიკა;
ე) დიოსკორეა.

1126. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში თფლიანობის დროს, რომელიც აღინიშნება 8 საათშე?

- ა) სტაფიბაგრია;
ბ) ფიტოსტიგმა;
გ) სტანუმ;
დ) ნუქს ვომიკა;
*ე) დიოსკორეა.

1127. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება ხმამაღლა საუბრისას?

- *ა) სულფური;
ბ) ბოვისტა;
გ) ქინა;
დ) ალუმინა;
ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1128. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება შუქის ზემოქმედებით?

- ა) სულფური;
*ბ) ბოვისტა;
გ) ქინა;
დ) ალუმინა;
ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1129. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება მჯდომარე ძლიერი არებაში?

- ა) სულფური;
ბ) ბოვისტა;
*გ) ქინა;
დ) ალუმინა;
ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1130. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება მზის შუქისაგან?

- ა) სულფური;
*ბ) ბოვისტა;
გ) ქინა;
დ) ალუმინა;
ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1131. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც აღინიშნება დგომისას?

- ა) სულფური;
ბ) ბოვისტა;
გ) ქინა;
*დ) ალუმინა;
ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1132. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ შებლის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც უმჯობესდება თბილი საფენებისაგან?

- ა) სულფური;
ბ) ბოვისტა;
გ) ქინა;
დ) ალუმინა;
*ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1133. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეჭითი ტკივილის დროს, რომელიც უმჯობესდება ჯანმრთელ მხარეზე წლილისას?

- *ა) მაგნეზია კარბონიკა;
ბ) ციკლამენ;

- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მანგანუმი;
- ე) ეუფრატია.

1134. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება მენსტრუაციის დაწყებისას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- *ბ) ციკლამენ;
- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მანგანუმი;
- ე) ეუფრატია.

1135. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება თავის აწევით?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ციკლამენ;
- *გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მანგანუმი;
- ე) ეუფრატია.

1136. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება შენობაში?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ციკლამენ;
- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- *დ) მანგანუმი;
- ე) ეუფრატია.

1137. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება გაუნძრევლად დაგომისას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ციკლამენ;
- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- *დ) მანგანუმი;
- ე) ეუფრატია.

1138. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ჩხვდეტითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება ცივი ხელის მიღებისას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ციკლამენ;
- გ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- დ) მანგანუმი;
- *ე) ეუფრატია.

1139. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება დამე?

- ა) აცილეუმ ნიტრიკუმი;
- *ბ) დიგიტალისი;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმი;
- დ) დროტერა;
- ე) ამონიუმ კარბონიკუმი.

1140. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება დია ჰაერზე?

- ა) აცილეუმ ნიტრიკუმი;
- ბ) დიგიტალისი;
- *გ) ნატრიუმ მურიატიკუმი;
- დ) დროტერა;
- ე) ამონიუმ კარბონიკუმი.

1141. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილის დროს, თუ იგი ჩნდება თვალების მოძრაობისგან?

- ა) აცილეუმ ნიტრიკუმი;
- ბ) დიგიტალისი;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმი;
- *დ) დროტერა;
- ე) ამონიუმ კარბონიკუმი.

1142. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილის დროს, თუ იგი უმჯობესდება დია ჰაერზე?

- ა) აცილეუმ ნიტრიკუმი;

- ბ) დიგიფალის;
- გ) ნატრიუმ მურიაგიკემი;
- დ) ლრომერა;
- *ე) ამონიუმ კარბონიკემი.

1143. რომელი პრეპარატი კურნავს შებლის არეში ოფლიანობას, თუ იგი ჩნდება საღამოს დაწოლის შემდეგ?

- *ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ხინა;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ვალერიანა.

1144. რომელი პრეპარატი კურნავს შებლის არეში ოფლიანობას, თუ იგი ჩნდება საღამოს წერის დროს?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- *ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ხინა;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ვალერიანა.

1145. რომელი პრეპარატი კურნავს შებლის არეში ოფლიანობას, თუ იგი ჩნდება საღამოს სიარულის დროს?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- *გ) ხინა;
- დ) ოლეანდერ;
- ე) ვალერიანა.

1146. რომელი პრეპარატი კურნავს შებლის არეში ოფლიანობას, თუ იგი ჩნდება 18სთ-გე და 30 წთ-გე?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ხინა;
- *დ) ოლეანდერ;
- ე) ვალერიანა.

1147. რომელი პრეპარატი კურნავს შებლის არეში ოფლიანობას, თუ იგი ჩნდება მოძრაობის დროს?

- ა) კარბო ვეგეტაბილის;
- ბ) რანუნკულუს ბულბოსუს;
- გ) ხინა;
- დ) ოლეანდერ;
- *ე) ვალერიანა.

1148. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსაცია თავის არეში ყოველ დილით, რომელიც გრძელდება მთელი დღე?

- *ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) აცილეუმ ნიტრიკემ;
- გ) არგენტუმ ნიტრიკემ;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) სილიცეა.

1149. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსაცია თავის არეში, რომელიც ჩნდება თანდათანობით და გადის საუმის დროისთვის?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- *ბ) აცილეუმ ნიტრიკემ;
- გ) არგენტუმ ნიტრიკემ;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) სილიცეა.

1150. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსაცია თავის არეში, რომელიც აიძულებს დამე ადგეს?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) აცილეუმ ნიტრიკემ;
- *გ) არგენტუმ ნიტრიკემ;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) სილიცეა.

1151. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსაცია თავის არეში ლოგინში ძილის წინ?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) აცილეუმ ნიტრიკემ;

გ) არგენტინი ნიფრიკუმ;

*დ) ხელიდონიუმ;

ე) სილიცეა.

1152. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსაცია თავის არეში, რომელიც ჩნდება დამე გულისრევითა და დებინებით?

ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) აცილემ ხიფრიკუმ;

გ) არგენტინი ნიფრიკუმ;

დ) ხელიდონიუმ;

*ე) სილიცეა.

1153. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება შესეწოჭქვისას?

*ა) კარბო ვეგეტაბილის;

ბ) სულფურ;

გ) კოკულუს;

დ) ფოსფორ;

ე) ხინა.

1154. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება ხერვიზულობისას?

ა) კარბო ვეგეტაბილის;

*ბ) სულფურ;

გ) კოკულუს;

დ) ფოსფორ;

ე) ხინა.

1155. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება ჭამის წინ?

ა) კარბო ვეგეტაბილის;

ბ) სულფურ;

*გ) კოკულუს;

დ) ფოსფორ;

ე) ხინა.

1156. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება ლეჭვისას?

ა) კარბო ვეგეტაბილის;

ბ) სულფურ;

გ) კოკულუს;

*დ) ფოსფორ;

ე) ხინა.

1157. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება სისხლის დაკარგვის შემდეგ?

ა) კარბო ვეგეტაბილის;

ბ) სულფურ;

გ) კოკულუს;

დ) ფოსფორ;

*ე) ხინა.

1158. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება ცხვირიდან სისხლდენის შემდეგ?

*ა) ბორაქს;

ბ) სეპია;

გ) პულსატილა;

დ) ბრომ;

ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

1159. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება ზურგბე წოლისას?

ა) ბორაქს;

*ბ) სეპია;

გ) პულსატილა;

დ) ბრომ;

ე) ნაფრიუმ მურიატიკუმ.

1160. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება მენსტრუაციის დათრგუნვის დროს?

ა) ბორაქს;

ბ) სეპია;

*გ) პულსატილა;

- დ) ბრომ;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1161. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, თუ იგი უმჯობესდება თვალების მოძრაობით?

- *ა) კალიუმ იოდატი;
ბ) აცილუმ კარბონიკუმ;
გ) ამბრა გრიზეა;
დ) კაუსტიკუმი;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

1162. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, თუ იგი უმჯობესდება თავის შეხვევის შემდეგ?

- ა) კალიუმ იოდატი;
*ბ) აცილუმ კარბონიკუმ;
გ) ამბრა გრიზეა;
დ) კაუსტიკუმი;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

1163. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, თუ იგი უმჯობესდება წამოწლისას?

- ა) კალიუმ იოდატი;
ბ) აცილუმ კარბონიკუმ;
*გ) ამბრა გრიზეა;
დ) კაუსტიკუმი;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

1164. რომელი პრეპარატი ინიშნება თავის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება ხელების მოძრაობის შემდეგ?

- ა) კალიუმ იოდატი;
ბ) აცილუმ კარბონიკუმ;
გ) ამბრა გრიზეა;
*დ) კაუსტიკუმი;
ე) ნატრიუმ მურიატიკუმი.

1165. რომელი პრეპარატისათვის დამახასიათებელი მჭრელი თავის ტკიფილი უმჯობესდება ღამე?

- ა) აცილუმ კარბონიკუმი;
*ბ) დიგიფალისი;
გ) ამბრა გრიზეა;
დ) სტრამონიუმი;
ე) ლახეზისი.

1166. რომელი პრეპარატისათვის დამახასიათებელი მჭრელი თავის ტკიფილი უმჯობესდება ჩაძინების შემდეგ?

- ა) აცილუმ კარბონიკუმი;
ბ) დიგიფალისი;
გ) ამბრა გრიზეა;
*დ) სტრამონიუმი;
ე) ლახეზისი.

1167. რომელი პრეპარატისათვის დამახასიათებელი მჭრელი თავის ტკიფილი უმჯობესდება სითბოს გემოქმედებით?

- ა) აცილუმ კარბონიკუმი;
ბ) დიგიფალისი;
გ) ამბრა გრიზეა;
დ) სტრამონიუმი;
*ე) ლახეზისი.

1168. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ღამე?

- ა) გლონინი;
*ბ) სიფილინუმი;
გ) კალკარეა კარბონიკა;
დ) ქინა;
ე) კალი ბიქრომიკა.

1169. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება სიარელის შემდეგ?

- ა) გლონინი;
ბ) სიფილინუმი;
*გ) კალკარეა კარბონიკა;
დ) ქინა;

ე) კალი ბიქრომიკა.

1170. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, რომელიც უარესდება მოძრაობის შემდეგ?
- ა) გლონონი;
 - ბ) სიფილინგმი;
 - გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - *დ) ქინა;
 - ე) კალი ბიქრომიკა.

1171. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ კეფის არეში მჭრელი ტკიფილის დროს, რომელიც უარესდება დახრისას?
- ა) გლონონი;
 - ბ) სიფილინგმი;
 - გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - *დ) ქინა;
 - ე) კალი ბიქრომიკა.

1172. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შუბლის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის დროს?
- *ა) აპისი;
 - ბ) კაუსტიკუმი;
 - გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - დ) აკონიტი;
 - ე) მაგნეზია სულფურიკა.

1173. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შუბლის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება დახრისას?
- ა) აპისი;
 - *ბ) კაუსტიკუმი;
 - გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - დ) აკონიტი;
 - ე) მაგნეზია სულფურიკა.

1174. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შუბლის არეში მჭრელი ხასიათის ტკიფილი, რომელიც უარესდება სიარულის დროს?
- ა) აპისი;
 - ბ) კაუსტიკუმი;
 - *გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - დ) აკონიტი;
 - ე) მაგნეზია სულფურიკა.

1175. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შუბლის არეში ჰუდსირებადი მჭრელი ხასიათის ტკიფილი?
- ა) აპისი;
 - ბ) კაუსტიკუმი;
 - გ) კალკარეა კარბონიკა;
 - *დ) აკონიტი;
 - ე) მაგნეზია სულფურიკა.

1176. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ადგომისას?
- *ა) მანგანუმი;
 - ბ) ბელადონა;
 - გ) ნექს ვომიკა;
 - დ) სანგვინარია;
 - ე) ამონიუმ კარბონიკუმი.

1177. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ზეწოლის გამო?
- ა) მანგანუმი;
 - *ბ) ბელადონა;
 - გ) ნექს ვომიკა;
 - დ) სანგვინარია;
 - ე) ამონიუმ კარბონიკუმი.

1178. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ყავის დალევის შემდეგ?
- ა) მანგანუმი;
 - ბ) ბელადონა;
 - *გ) ნექს ვომიკა;
 - დ) სანგვინარია;

ე) ამონიუმ კარბონიტუმი.

1179. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მაშინ, როცა
პაციენტი იყინება?

- ა) მანგანუმი;
- ბ) ბელადონა;
- გ) ნუქს ვომიკა;
- *დ) სანგვინარია;
- ე) ამონიუმ კარბონიტუმი.

1180. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება სადილის დროს?

- ა) მანგანუმი;
- ბ) ბელადონა;
- გ) ნუქს ვომიკა;
- დ) სანგვინარია;

*ე) ამონიუმ კარბონიტუმი.

1181. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება სადილის
შემდეგ?

- *ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- ბ) დრობერა;
- გ) ხამომილა;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სეპია.

1182. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება წერის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- *ბ) დრობერა;
- გ) ხამომილა;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სეპია.

1183. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება გაღვიძებისას?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- ბ) დრობერა;
- *გ) ხამომილა;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სეპია.

1184. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება გონებრივი
გადაძაბვის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- ბ) დრობერა;
- გ) ხამომილა;
- *დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სეპია.

1185. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება საღამოს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- ბ) დრობერა;
- გ) ხამომილა;
- *დ) ნუქს ვომიკა;
- ე) სეპია.

1186. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება თვალების
დახუჭვის დროს?

- ა) ცინკუმ მეტალიკუმი;
- ბ) დრობერა;
- გ) ხამომილა;
- დ) ნუქს ვომიკა;
- *ე) სეპია.

1187. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურღვითი ხასიათის ტკიფილი საფეთქლების არეში შეაღლემდე?

- *ა) ალუმინა;

- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- დ) კალი ბიქრომი;
- ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1188. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურლვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში შეაღდებე?

- ა) ალუმინია;
- *ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- დ) კალი ბიქრომი;
- ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1189. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურლვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში 17 სო-ზე?

- ა) ალუმინია;
- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- *გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- დ) კალი ბიქრომი;
- ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1190. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურლვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში 22 სო-ზე?

- ა) ალუმინია;
- *ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- დ) კალი ბიქრომი;
- ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1191. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურლვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში ხველების შემდეგ?

- ა) ალუმინია;
- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- *დ) კალი ბიქრომი;
- ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1192. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ბურლვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში მენსტრუაციის წინ?

- ა) ალუმინია;
- ბ) არგენტუმ ნიტრიკემი;
- გ) ნატრიუმ სულფურიკემი;
- დ) კალი ბიქრომი;
- *ე) ანტიმონიუმ კარბონიკემი.

1193. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურლვითი ხასიათის ტკივილის დროს, რომელიც ადინიშნება როცა პაციენტს სცივა?

- *ა) სანგვინარია;
- ბ) დრობერა;
- გ) ლელემი;
- დ) კოლხიკემი;
- ე) ბისმუტი.

1194. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურლვითი ხასიათის ტკივილის დროს, რომელიც ადინიშნება წერისას?

- ა) სანგვინარია;
- *ბ) დრობერა;
- გ) ლელემი;
- დ) კოლხიკემი;
- ე) ბისმუტი.

1195. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურლვითი ხასიათის ტკივილის დროს, რომელიც ადინიშნება კითხვისას?

- ა) სანგვინარია;
- ბ) დრობერა;
- *გ) ლელემი;
- დ) კოლხიკემი;
- ე) ბისმუტი.

1196. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურლვითი ხასიათის ტკივილის დროს, რომელიც უმჯობესდება ზეწოლის შემდეგ?

- ა) სანგვინარია;
- ბ) დრობერი;
- გ) ლელუმი;
- *დ) კოლხიკუმი;
- ე) ბისმუტი.

1197. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება მოძრაობისას?

- ა) სანგვინარია;
- ბ) დრობერი;
- გ) ლელუმი;
- დ) კოლხიკუმი;
- *ე) ბისმუტი.

1198. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში ბურღვითი ხასიათის ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება ცივი აძლიკაციებით?

- ა) სანგვინარია;
- ბ) დრობერი;
- გ) ლელუმი;
- *დ) კოლხიკუმი;
- ე) ბისმუტი.

1199. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება დილით გაღვიძებისას?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- *ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ტარენტულა;
- დ) ნაია;
- ე) არემ ტრიფილუმი.

1200. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება დამე?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- *გ) ტარენტულა;
- დ) ნაია;
- ე) არემ ტრიფილუმი.

1201. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება ცივი დია ჰაერისგან?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ტარენტულა;
- *დ) ნაია;
- ე) არემ ტრიფილუმი.

1202. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკიფილი, რომელიც აღინიშნება ზემოთ ახელვისას?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმი;
- გ) ტარენტულა;
- დ) ნაია;
- *ე) არემ ტრიფილუმი.

1203. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება რძის დაღვევის შემდეგ?

- ა) ბორაქს;
- ბ) სეპია;
- გ) პელსაგილა;
- *დ) ბრომი;
- ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1204. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი უმჯობესდება ოფლდენის შემდეგ?

- ა) ბორაქს;
- ბ) სეპია;
- გ) პელსაგილა;
- დ) ბრომი;
- *ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1205. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება გაციფების წინ?

- *ა) ლახების;
- ბ) სანგვინარია;
- გ) იგნაცია;
- დ) სეპია;
- ე) აცილებ თქმალიკუმ.

1206. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი უმჯობესდება ძილის შემდეგ?

- ა) ლახების;
- *ბ) სანგვინარია;
- გ) იგნაცია;
- დ) სეპია;
- ე) აცილებ თქმალიკუმ.

1207. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციისას, თუ იგი აღინიშნება დეფეკაციის დროს ჭინთვისას?

- ა) ლახების;
- ბ) სანგვინარია;
- *გ) იგნაცია;
- დ) სეპია;
- ე) აცილებ თქმალიკუმ.

1208. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი აღინიშნება დვინის დალევის შემდეგ?

- ა) ლახების;
- ბ) სანგვინარია;
- გ) იგნაცია;
- დ) სეპია;
- *ე) აცილებ თქმალიკუმ.

1209. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თავის არეში პულსაციის დროს, თუ იგი უმჯობესდება სიბნელეში?

- ა) ლახების;
- ბ) სანგვინარია;
- გ) იგნაცია;
- *დ) სეპია;
- ე) აცილებ თქმალიკუმ.

1210. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება დილით გაღვიძებისას?

- *ა) ლახების;
- ბ) გლონოინუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1211. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება საღამოს სიარულის დროს?

- ა) ლახების;
- *ბ) გლონოინუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1212. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება სიცხეში?

- ა) ლახების;
- *ბ) გლონოინუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1213. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება ხველებისას?

- ა) ლახების;
- ბ) გლონოინუმ;
- *გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1214. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება მწოლიარე მდგომარეობაში?

- ა) ლაბების;
- ბ) გლონონუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- *დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1215. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება მენსტრუაციის წინ?

- *ა) ლაბების;
- ბ) გლონონუმ;
- გ) ჰეპარ სულფურის;
- დ) ნაია;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1216. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება მთქნარების შემდეგ?

- *ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) აპისა;
- გ) ბერბერისი;
- დ) ჰელებორუსი;
- ე) ნატრიუმ კარბონიკუმი.

1217. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის დროს?

- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- *ბ) აპისა;
- გ) ბერბერისი;
- დ) ჰელებორუსი;
- ე) ნატრიუმ კარბონიკუმი.

1218. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის შემდეგ?

- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) აპისა;
- *გ) ბერბერისი;
- დ) ჰელებორუსი;
- ე) ნატრიუმ კარბონიკუმი.

1219. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება კრუნჩხუების დროს?

- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) აპისა;
- გ) ბერბერისი;
- *დ) ჰელებორუსი;
- ე) ნატრიუმ კარბონიკუმი.

1220. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება ფიზიკური ვარჯიშის დროს?

- ა) ბარიტა კარბონიკა;
- ბ) აპისა;
- გ) ბერბერისი;
- დ) ჰელებორუსი;
- *ე) ნატრიუმ კარბონიკუმი.

1221. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც უმჯობესდება საღამოს?

- ა) სეპია;
- *ბ) კალი ბიქრომი;
- გ) ალუმინი;
- დ) კალმია;
- ე) მანგანუმი.

1222. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის თავის ტკივილი, რომელიც აღინიშნება ყოველ გადადგმულ ნაბიჯზე?

- *ა) სეპია;
- ბ) კალი ბიქრომი;
- გ) ალუმინი;
- დ) კალმია;
- ე) მანგანუმი.

1223. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ხასიათის ტკივილი საფეთქლების არეში, თუ იგი აღინიშნება დილით გაღვიძებისას?

- ა) სეპია;
- ბ) კალი ბიქრომი;
- * გ) ალუმინია;
- დ) კალმიკ;
- ე) მანგანუმი.

1224. რომელი პრეპარატს ახასიათებს ფეხვითი ხასიათის ტკიფილი საფეთქლების არეში, თუ იგი აღინიშნება 10 სთ და 30 წთ-ზე?

- ა) სეპია;
- ბ) კალი ბიქრომი;
- გ) ალუმინია;
- * დ) კალმიკ;
- ე) მანგანუმი.

1225. რომელი პრეპარატს ახასიათებს ფეხვითი ხასიათის ტკიფილი საფეთქლების არეში, თუ იგი აღინიშნება ხველისას?

- ა) სეპია;
- ბ) კალი ბიქრომი;
- გ) ალუმინია;
- დ) კალმიკ;
- * ე) მანგანუმი.

1226. რომელი პრეპარატი კურნავს საფეთქლების არეში ტეხვით ტკიფილს, თუ იგი აღინიშნება დეფეკაციის დროს?

- * ა) ლიკოპორდიუმი;
- ბ) აკონიფი;
- გ) ნაია;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) რუს ტოქსი.

1227. რომელი პრეპარატი კურნავს საფეთქლების არეში პულსირებად ტეხვით ტკიფილს?

- ა) ლიკოპორდიუმი;
- * ბ) აკონიფი;
- გ) ნაია;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) რუს ტოქსი.

1228. რომელი პრეპარატი კურნავს საფეთქლების არეში ტეხვით ტკიფილს, თუ იგი უმჯობესდება ღია ჰაერზე?

- ა) ლიკოპორდიუმი;
- ბ) აკონიფი;
- * გ) ნაია;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) რუს ტოქსი.

1229. რომელი პრეპარატი კურნავს საფეთქლების არეში ტეხვით ტკიფილს, თუ იგი უმჯობესდება ბეწოდის შემდეგ?

- ა) ლიკოპორდიუმი;
- ბ) აკონიფი;
- გ) ნაია;
- * დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) რუს ტოქსი.

1230. რომელი პრეპარატი კურნავს საფეთქლების არეში ტეხვით ტკიფილს, თუ იგი უარესდება სიცხეში?

- ა) ლიკოპორდიუმი;
- ბ) აკონიფი;
- გ) ნაია;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- * ე) რუს ტოქსი.

1231. რომელი პრეპარატი ინიშნება საფეთქლების არეში ტეხვითი ტკიფილის დროს, რომელიც უარესდება წოლისას?

- * ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) სპიგელია;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) კანაბის ინდიკა;
- ე) ციმიციფეგა.

1232. რომელი პრეპარატი ინიშნება საფეთქლების არეში ტეხვითი ტკიფილის დროს, რომელიც უარესდება ცივ ჰაერზე ყოფნისას?

- ა) კალი ბიქრომი;

- *ბ) სპიგელია;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) კანაბის ინდიკა;
- ე) ციმიციფუგა.

1233. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტეხვითი ტკივილის დროს, რომელიც თუ იგი აღინიშნება საღამოს?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) სპიგელია;
- *გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) კანაბის ინდიკა;
- ე) ციმიციფუგა.

1234. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტეხვითი ტკივილის დროს საფეთქლებში გავრცელებით?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) სპიგელია;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *დ) კანაბის ინდიკა;
- ე) ციმიციფუგა.

1235. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში ტეხვითი ტკივილის დროს ზურგის გასწვრივ ქვემოთ გავრცელებით?

- ა) კალი ბიქრომი;
- ბ) სპიგელია;
- გ) მაგნეზია კარბონიკა;
- დ) კანაბის ინდიკა;
- *ე) ციმიციფუგა.

1236. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ტკივილი შებლის არეში დილით?

- *ა) ირის ვერბიკოლორ;
- ბ) კონიუმი;
- გ) მაგნეზია მურიატიკა;
- დ) სულფური;
- ე) მანგანუმი.

1237. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ტკივილი შებლის არეში შეადლებენ?

- ა) ირის ვერბიკოლორ;
- *ბ) კონიუმი;
- გ) მაგნეზია მურიატიკა;
- დ) სულფური;
- ე) მანგანუმი.

1238. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ტკივილი შებლის არეში საღამოს?

- ა) ირის ვერბიკოლორ;
- ბ) კონიუმი;
- *გ) მაგნეზია მურიატიკა;
- დ) სულფური;
- ე) მანგანუმი.

1239. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ტკივილი შებლის არეში დამე ლოგინში?

- ა) ირის ვერბიკოლორ;
- ბ) კონიუმი;
- გ) მაგნეზია მურიატიკა;
- *დ) სულფური;
- ე) მანგანუმი.

1240. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტეხვითი ტკივილი შებლის არეში ლია ჰაერზე?

- ა) ირის ვერბიკოლორ;
- ბ) კონიუმი;
- გ) მაგნეზია მურიატიკა;
- დ) სულფური;
- *ე) მანგანუმი.

1241. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება შემცივნების წინ?

- ა) ლახეგის;
- ბ) გლონონინუმ;

- გ) ჰეპარ სულფურის;
დ) ნაია;
*ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1242. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება კიბეზე ასვლისას?

ა) ლახების;
*ბ) გლონონინუმ;
გ) ჰეპარ სულფურის;
დ) ნაია;
ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1243. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება შეტევითად?

ა) ლახების;
*ბ) გლონონინუმ;
გ) ჰეპარ სულფურის;
დ) ნაია;
ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1244. რომელი პრეპარატი კურნავს პულსაციას საფეთქლებში, თუ იგი აღინიშნება გაღვიძებისას?

ა) ლახების;
ბ) გლონონინუმ;
გ) ჰეპარ სულფურის;
დ) ნაია;
*ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1245. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება დღე?

*ა) პეტროლეუმ;
ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
გ) ალოე;
დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
ე) მაგნეზია მურიატიკა.

1246. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება შუალდის შემდეგ?

ა) პეტროლეუმ;
*ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
გ) ალოე;
დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
ე) მაგნეზია მურიატიკა.

1247. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება ზურგზე წოლისას?

*ა) პეტროლეუმ;
ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
გ) ალოე;
დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
ე) მაგნეზია მურიატიკა.

1248. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც უმჯობესდება მოძრაობისას?

ა) პეტროლეუმ;
ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
*გ) ალოე;
დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
ე) მაგნეზია მურიატიკა.

1249. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება დახრისას?

ა) პეტროლეუმ;
ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
გ) ალოე;
*დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
ე) მაგნეზია მურიატიკა.

1250. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება თბილ შენობაში?

ა) პეტროლეუმ;
ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
გ) ალოე;

დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
* ე) მაგნებია მურიატიპა.

1251. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც ვრცელდება მთელ თავში?

- ა) ჰეტროლუქუმ;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) ალოე;
- დ) ფერუმ მეტალიკუმ;
- * ე) მაგნებია მურიატიპა.

1252. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება დეფეკაციისას?

- ა) გლონონიუმ;
- ბ) ქამფორა;
- * გ) იგნაცია;
- დ) კალი ბრომ;
- ე) ფერუმ მეტალიკუმ.

1253. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც შეტევითი ხასიათისაა?

- * ა) გლონონიუმ;
- ბ) ქამფორა;
- გ) იგნაცია;
- დ) კალი ბრომ;
- ე) ფერუმ მეტალიკუმ.

1254. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც უმჯობესდება დგომისას?

- ა) გლონონიუმ;
- * ბ) ქამფორა;
- გ) იგნაცია;
- დ) კალი ბრომ;
- ე) ფერუმ მეტალიკუმ.

1255. რომელი პრეპარატი ინიშნება კეფის არეში პულსაციის დროს, რომელიც უარესდება დია პაერზე სიარულისას?

- ა) გლონონიუმ;
- ბ) ქამფორა;
- გ) იგნაცია;
- * დ) კალი ბრომ;
- ე) ფერუმ მეტალიკუმ.

1256. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება შეადლები?

- * ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) პულსაცილა;
- დ) კოკულეს;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1257. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება 14 საათზე?

- ა) ლიკოპოდიუმ;
- * ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) პულსაცილა;
- დ) კოკულეს;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1258. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება 15 საათზე?

- * ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) პულსაცილა;
- დ) კოკულეს;
- ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1259. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც აღინიშნება ვერტიკალურ მდგომარეობაში?

- ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) პულსაცილა;
- დ) კოკულეს;

*ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1260. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც ალინიშნება კითხვისას?

*ა) ლიკოპორიუმ;

ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;

გ) პულსაცილა;

დ) კოკულუქ;

ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1261. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც უმჯობესდება მოძრაობისას?

ა) ლიკოპორიუმ;

ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;

*გ) პულსაცილა;

დ) კოკულუქ;

ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1262. რომელი პრეპარატი ინიშნება შებლის არეში პულსაციის დროს, რომელიც უარესდება საუბრისას?

ა) ლიკოპორიუმ;

ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;

გ) პულსაცილა;

*დ) კოკულუქ;

ე) კალიუმ კარბონიკუმ.

1263. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სიცარიელის შეგრძნებას შეაღინიშვნენ?

*ა) ნექს მოშატა;

ბ) კოკულუქ;

გ) სპიგელია;

დ) ციკლამენ;

ე) აპის.

1264. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სიცარიელის შეგრძნებას გაუმჯობესებით ლოგინში ჩათბუნების შემდეგ?

ა) ნექს მოშატა;

*ბ) კოკულუქ;

გ) სპიგელია;

დ) ციკლამენ;

ე) აპის.

1265. რომელი პრეპარატი კურნავს თავის არეში სიცარიელის შეგრძნებას ჯდომისას?

ა) ნექს მოშატა;

ბ) კოკულუქ;

*გ) სპიგელია;

დ) ციკლამენ;

ე) აპის.

1266. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცარიელის შეგრძნებას საფეთქლების არეში?

ა) ნექს მოშატა;

ბ) კოკულუქ;

გ) სპიგელია;

*დ) ციკლამენ;

ე) აპის.

1267. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შეგრძნება თითქოს თავია გაფართოვებული შებლის არეში?

*ა) ნექს მოშატა;

ბ) კოკულუქ;

გ) კობალტ;

დ) გლონონიკუმ;

ე) აპის.

1268. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შეგრძნება თითქოს თავია გაფართოვებული დეფეკაციის დროს?

ა) ნექს მოშატა;

ბ) კოკულუქ;

*გ) კობალტ;

დ) გლონონიკუმ;

ე) აპის.

1269. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში დილით გაუმჯობესებით?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- *დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1270. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში დილით აღვომის შემდეგ?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- *ე) ლიკოპოდიუმ.

1271. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ყლაპფისეგან გამოწვეული მოჭერის შეგრძნება თავის არეში?

- *ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1272. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუარესებით დგომისას?

- *ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1273. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით წოლისას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- *ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1274. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში როცა ჩამთბარია?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- *გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1275. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით როცა თავზე არ აქვთ დახურული?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- *გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1276. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში საუბრისას?

- ა) მაგნეზია კარბონიკა;
- *ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კარბო ვეგეტაბილის;
- დ) გლონოინ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1277. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით დია ჰაერშე მოძრაობისას?

- *ა) აკონიტუმ;
- ბ) ბოვისტა;
- გ) მეზერეუმ;
- დ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1278. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით საუზმის შემდეგ?

ა) აკონიტუმ;

*ბ) ბოვისტი;

გ) მეტერეუმ;

დ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1279. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გურგჩე წოლის გამო?

ა) აკონიტუმ;

ბ) ბოვისტა;

*გ) მეტერეუმ;

დ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1280. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში დაბანის შემდეგ?

ა) აკონიტუმ;

ბ) ბოვისტა;

გ) მეტერეუმ;

*დ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1281. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში საღილის შემდეგ?

ა) აკონიტუმ;

ბ) ბოვისტა;

გ) მეტერეუმ;

დ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ;

*ე) ბარიტა კარბონიკა.

1282. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში შემცივნებისას?

*ა) ფარენტულა;

ბ) ფოსფორ;

გ) სტანუმ;

დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;

ე) ასარუმ.

1283. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს პერიოდულად აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში?

ა) ტარენტულა;

*ბ) ფოსფორ;

გ) სტანუმ;

დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;

ე) ასარუმ.

1284. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით დებინების შემდეგ?

ა) ტარენტულა;

ბ) ფოსფორ;

*გ) სტანუმ;

დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;

ე) ასარუმ.

1285. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუარესებით ჯდომისას?

ა) ტარენტულა;

ბ) ფოსფორ;

გ) სტანუმ;

*დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;

ე) ასარუმ.

1286. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში გაუმჯობესებით ჯდომისას?

ა) ტარენტულა;

ბ) ფოსფორ;

გ) სტანუმ;

დ) აციდუმ ფლუორიკუმ;

*ე) ასარუემ.

1287. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში სიცილისას?

*ა) ირის ვერზიკოლორ;

ბ) კოლოცინგი;

გ) სულფურ;

დ) სტრონციუმ;

ე) აგნეს კასტუს.

1288. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში დეფეკაციის დროს?

ა) ირის ვერზიკოლორ;

*ბ) კოლოცინგი;

გ) სულფურ;

დ) სტრონციუმ;

ე) აგნეს კასტუს.

1289. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში ნესფიან ამინდში გაუარესებით?

ა) ირის ვერზიკოლორ;

ბ) კოლოცინგი;

*გ) სულფურ;

დ) სტრონციუმ;

ე) აგნეს კასტუს.

1290. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში სითბოში გაუმჯობესებით?

ა) ირის ვერზიკოლორ;

ბ) კოლოცინგი;

გ) სულფურ;

*დ) სტრონციუმ;

ე) აგნეს კასტუს.

1291. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება თავის არეში კითხვისას?

ა) ირის ვერზიკოლორ;

ბ) კოლოცინგი;

გ) სულფურ;

დ) სტრონციუმ;

*ე) აგნეს კასტუს.

1292. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება საფეთქლების არეში დილით?

*ა) სულფურ;

ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

გ) ლიკოპოდიუმ;

დ) ნაია;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1293. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება კეფის არეში ყლაპვისას?

ა) სულფურ;

*ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

გ) ლიკოპოდიუმ;

დ) ნაია;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1294. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება კეფის არეში წერისას?

ა) სულფურ;

ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

*გ) ლიკოპოდიუმ;

დ) ნაია;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1295. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება კეფის არეში დგომისას?

ა) სულფურ;

*ბ) მაგნეზია კარბონიკა;

გ) ლიკოპოდიუმ;

დ) ნაია;

ე) ბარიტა კარბონიკა.

1296. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება შებლის არეში დილით?

- ა) სელფურ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- *დ) ნაია;
- ე) ბარიტ კარბონიკა.

1297. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს მოჭერის შეგრძნება შებლის არეში ჭამის შემდეგ?

- ა) სელფურ;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- დ) ნაია;
- *ე) ბარიტ კარბონიკა.

1298. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტს აწესებს ასტიგმატიზმი?

- *ა) ტებერკელინუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1299. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტს აქვს მხედველობის ნერვის ატროფია თამბაქოს გადამეტებული წევის შედეგად?

- ა) ტებერკელინუმ;
- *ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1300. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება დილით სიარულისას?

- ა) ტებერკელინუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- *გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1301. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება 5 საათზე?

- ა) ტებერკელინუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) პულსატილა;
- *დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1302. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება 7 საათზე?

- ა) ტებერკელინუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- *გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1303. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება 4 საათზე გაღვიძებისას?

- ა) ტებერკელინუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- *ე) ნუქს ვომიკა.

1304. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება 13 საათზე?

- ა) ტებერკელინუმ;
- *ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) პულსატილა;
- დ) სტანქმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1305. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების ტკიფილს 8-დან 9 საათამდე?

- *ა) ხინა;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) ხელიდონიუმი;
- ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1306. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების ტკიფილს 15 საათზე?

- ა) ხინა;
- *ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) ხელიდონიუმი;
- ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1307. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების ტკიფილს 16-დან 20 სთ-მდე?

- ა) ხინა;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- *გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) ხელიდონიუმი;
- ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1308. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების ტკიფილს, რომელიც უმჯობესდება საღამოს?

- ა) ხინა;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- *დ) ხელიდონიუმი;
- ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1309. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების ტკიფილს ბინდში?

- ა) ხინა;
- ბ) მაგნეზია კარბონიკა;
- გ) ლიკოპოდიუმი;
- დ) ხელიდონიუმი;
- *ე) ნატრიუმ მურიატიკუმ.

1310. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი საღამოს სიარულისა და მგზავრობის დროს?

- *ა) პლანტაგო;
- ბ) ნატრიუმ არსენიკომტუმი;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) სპიგელია;
- ე) სეპია.

1311. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი საღამოს წერისა და კითხვის დროს?

- ა) პლანტაგო;
- *ბ) ნატრიუმ არსენიკომტუმი;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) სპიგელია;
- ე) სეპია.

1312. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი შუაღამეს?

- ა) პლანტაგო;
- ბ) ნატრიუმ არსენიკომტუმი;
- *გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) სპიგელია;
- ე) სეპია.

1313. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი შუაღამისას 3 საათშე?

- ა) პლანტაგო;
- ბ) ნატრიუმ არსენიკომტუმი;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- *დ) სპიგელია;
- ე) სეპია.

1314. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი ჭექა-ჭეხილის დროს?

- ა) პლანტაგო;
- ბ) ნატრიუმ არსენიკომტემ;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) სპიგელია;
- * ე) სეპია.

1315. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების ტკიფილი, რომელიც უმჯობესდება მარცხენა გვერდზე წლილის?

- ა) პლანტაგო;
- * ბ) ნატრიუმ არსენიკომტემ;
- გ) მერკურ სოლუბილის;
- დ) სპიგელია;
- ე) სეპია.

1316. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი შემცივნების დროს?

- * ა) სენეგა;
- ბ) კალმია;
- გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) სულფურ.

1317. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი მზის ამოსელიდან ჩასვლამდე?

- ა) სენეგა;
- * ბ) კალმია;
- გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) სულფურ.

1318. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი დეფეკაციის დროს?

- ა) სენეგა;
- ბ) კალმია;
- * გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) სულფურ.

1319. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი დეფეკაციის შემდეგ?

- ა) სენეგა;
- ბ) კალმია;
- გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- * დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) სულფურ.

1320. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი მათი სიმშრალით?

- ა) სენეგა;
- ბ) კალმია;
- გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- * ე) სულფურ.

1321. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თვალების ტკიფილი გაუარესებით თბილ ამინდში?

- ა) სენეგა;
- ბ) კალმია;
- გ) კროტონ ტიგლიუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- * ე) სულფურ.

1322. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკიფილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება 5 საათზე?

- * ა) სტან्टებ;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ბარიტ კარბონიკა;
- ე) სულფურ.

1323. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკიფილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება 16 საათზე

კოველდლიურად?

- ა) სტანჯმ;
- *ბ) სილიცეა;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ბარიტ კარბონიკა;
- ე) სულფურ.

1324. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ბინდუნდში?

- ა) სტანჯმ;
- ბ) სილიცეა;
- *გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ბარიტ კარბონიკა;
- ე) სულფურ.

1325. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება გვერდზე გახელვისას?

- ა) სტანჯმ;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- *დ) ბარიტ კარბონიკა;
- ე) სულფურ.

1326. რომელი პრეპარატი კურნავს დაწოლითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ჭამის შემდეგ?

- ა) სტანჯმ;
- ბ) სილიცეა;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ბარიტ კარბონიკა;
- *ე) სულფურ.

1327. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება მხოლოდ დღისით კითხვის დროს?

- *ა) აცილეუმ სულფურიკუმ;
- ბ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ციკლამენ.

1328. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება 12 საათისა და 30 წუთში?

- ა) აცილეუმ სულფურიკუმ;
- *ბ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ციკლამენ.

1329. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება საბარიტოს და ჰაერზე?

- ა) აცილეუმ სულფურიკუმ;
- ბ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- *გ) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ციკლამენ.

1330. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება საბარიტოს დაწოლისგან გაუმჯობესებით?

- ა) აცილეუმ სულფურიკუმ;
- ბ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- გ) კალიუმ ბიქრომიკუმ;
- *დ) ნატრიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ციკლამენ.

1331. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება საბარიტოს წერის დროს

- *ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;

- ბ) კალიუმ ბიქრომიკებ;
- გ) ნატრიუმ კარბონიკებ;
- დ) ციკლამენ.

1332. რომელი პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის წევითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება დამე ლოგინში კითხვისას?

- ა) აცილეუმ სულფურიკებ;
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკებ;
- გ) კალიუმ ბიქრომიკებ;
- დ) ნატრიუმ კარბონიკებ;

*ე) ციკლამენ.

1333. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება დღისით?

- *ა) ციმიციფეუგა;
- ბ) ჰელებორუს;
- გ) სეპია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) გელზემინიუმ.

1334. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება დილით გაღვიძების შემდეგ?

- ა) ციმიციფეუგა;
- *ბ) ჰელებორუს;
- გ) სეპია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) გელზემინიუმ.

1335. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება საღამოს სურდოს ლროს?

- ა) ციმიციფეუგა;
- ბ) ჰელებორუს;
- *გ) სეპია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) გელზემინიუმ.

1336. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება საღამოს შუქჩე შეხელვის ლროს?

- ა) ციმიციფეუგა;
- ბ) ჰელებორუს;
- გ) სეპია;
- *დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) გელზემინიუმ.

1337. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფითი ხასიათის ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება თავის ტკივილის შემდეგ?

- ა) ციმიციფეუგა;
- ბ) ჰელებორუს;
- გ) სეპია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- *ე) გელზემინიუმ.

1338. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვლეფით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ჭამის შემდეგ?

- *ა) ლიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) არნიკა.

1339. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვლეფით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ჩაძინებისას?

- ა) ლიგიტალის;
- *ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;

დ) კალკარეა კარბონიკა;
ე) არნიკა.

1340. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ხველისძი?

- ა) დიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- *გ) სენეგა;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) არნიკა.

1341. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება დაწოლისძის?

- *ა) დიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) არნიკა.

1342. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება მენსტრუაციის დროს?

- ა) დიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;
- *დ) კალკარეა კარბონიკა;
- ე) არნიკა.

1343. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება ლოგინში?

- ა) დიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- *ე) არნიკა.

1344. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტით ტკივილს თვალების არეში, რომელიც აღინიშნება სითბოსგან?

- ა) დიგიტალის;
- ბ) ფოსფორი;
- გ) სენეგა;
- დ) კალკარეა კარბონიკა;
- *ე) არნიკა.

1345. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ყრუ ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება მარცხენა თვალში?

- *ა) აგარიკუს;
- ბ) ნაია;
- გ) სტაფიბაგრია;
- დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- ე) მანგანუმ.

1346. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ყრუ ტკივილის დროს, თუ იგი უმჯობესდება საუმშის შემდეგ?

- ა) აგარიკუს;
- *ბ) ნაია;
- გ) სტაფიბაგრია;
- დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- ე) მანგანუმ.

1347. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ყრუ ტკივილის დროს, თუ იგი აღინიშნება შეადლის შემდეგ?

- ა) აგარიკუს;
- ბ) ნაია;
- *გ) სტაფიბაგრია;
- დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- ე) მანგანუმ.

1348. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება საღამოს დაწმულის შემდეგ?

- ა) აგარიკუს;
- ბ) ნაია;
- გ) სტაფიბაგრია;
- *დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- ე) მანგანუმ.

1349. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, თუ იგი აღინიშნება ახლოს მოთავსებულ საგნებზე შეხედვის დროს?

- ა) აგარიკუს;
- ბ) ნაია;
- გ) სტაფიბაგრია;
- დ) კარბო ვეგეტაბილის;
- *ე) მანგანუმ.

1350. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება ზემოთ ახედვისას?

- *ა) ხელიდონიუმ;
- ბ) სენეგა;
- გ) ვერატრუმ ალბუმ;
- დ) კოლოცინტი;
- ე) კალკარუმ ფლუორიკა.

1351. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება ღია ჰაერზე?

- ა) ხელიდონიუმ;
- *ბ) სენეგა;
- გ) ვერატრუმ ალბუმ;
- დ) კოლოცინტი;
- ე) კალკარუმ ფლუორიკა.

1352. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მგზავრობისას?

- ა) ხელიდონიუმ;
- ბ) სენეგა;
- *გ) ვერატრუმ ალბუმ;
- დ) კოლოცინტი;
- ე) კალკარუმ ფლუორიკა.

1353. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება დახრისას?

- ა) ხელიდონიუმ;
- ბ) სენეგა;
- გ) ვერატრუმ ალბუმ;
- *დ) კოლოცინტი;
- ე) კალკარუმ ფლუორიკა.

1354. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ თვალების არეში ყრუ ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება წერისას?

- ა) ხელიდონიუმ;
- ბ) სენეგა;
- გ) ვერატრუმ ალბუმ;
- დ) კოლოცინტი;
- *ე) კალკარუმ ფლუორიკა.

1355. რომელი პრეპარატი კურნავს ქვიშის შეგრძნებას მარჯვენა თვალში?

- *ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1356. რომელი პრეპარატი კურნავს ქვიშის შეგრძნებას თვალებში შეადლის შემდეგ?

- ა) სეპია;
- *ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1357. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ქაჩვითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება მხოლოდ დღისით?

- ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- *გ) კალმია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1358. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ქაჩვითი ტკიფილის დროს, რომელიც აღინიშნება დამე?

- ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- *დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1359. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ქაჩვითი ტკიფილის დროს, რომელიც უმჯობესდება დია ჰაერზე?

- *ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1360. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ქაჩვითი ტკიფილისას, რომელიც უარესდება თვალების დახუჭვის დროს?

- ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- *დ) ლიკოპოდიუმ;
- ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1361. რომელი პრეპარატი ინიშნება თვალების არეში ქაჩვითი ტკიფილისას, რომელიც აღინიშნება კეფაში ტკიფილის დროს?

- ა) სეპია;
- ბ) ბრიონია;
- გ) კალმია;
- დ) ლიკოპოდიუმ;
- *ე) კარბო ვეგეტაბილის.

1362. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს გუგების გაფართოვება კბილის ტკიფილის დროს?

- *ა) მანგანუმ;
- ბ) ლიკოპოდიუმ;
- გ) გლონიონი;
- დ) აციდემ ფოსფორიკუმ;
- ე) აკონიფუმ.

1363. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს გუგების გაფართოვება მენსტრუაციის წინ?

- ა) მანგანუმ;
- *ბ) ლიკოპოდიუმ;
- გ) გლონიონი;
- დ) აციდემ ფოსფორიკუმ;
- ე) აკონიფუმ.

1364. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს გუგების გაფართოვება მენსტრუაციის დროს?

- ა) მანგანუმ;
- ბ) ლიკოპოდიუმ;
- *გ) გლონიონი;
- დ) აციდემ ფოსფორიკუმ;
- ე) აკონიფუმ.

1365. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს გუგების გაფართოვება გაუარესებით კითხვისას?

- ა) მანგანუმ;
- ბ) ლიკოპოდიუმ;
- გ) გლონიონი;
- *დ) აციდემ ფოსფორიკუმ;
- ე) აკონიფუმ.

1366. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავიდს თვალების არეში დილით ლოგინიდან ადგომის დროს?

- * ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1367. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს თვალების არეშიდია პაერზე გაუმჯობესებით?

- ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- * ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1368. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს თვალების არეშიმხედველობის დამაბვისას?

- ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) ჰელსატილა;
- * გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1369. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს თვალების არეში სურდოს დროს?

- ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- * დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1370. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს თვალების არეში საღილის შემდეგ?

- ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- * ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1371. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს თვალების არეში გაუმჯობესებით ცივი აპლიკაციების გამოყენების შემდეგ?

- ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- * ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1372. რომელი პრეპარატი კურნავს წარბების ქავილს დილით?

- * ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- ბ) ჰელსატილა;
- გ) რუს ტოქსი;
- დ) კაპსიკუმ;
- ე) მაგნეზია კარბონიკა.

1373. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების სიწითლე დღისით?

- * ა) სულფურ;
- ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) მენიანთეს;
- დ) გლონიონი;
- ე) მერკერ სოლუბილის.

1374. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების სიწითლე 4 საათზე?

- ა) სულფურ;
- * ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) მენიანთეს;
- დ) გლონიონი;
- ე) მერკერ სოლუბილის.

1375. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების სიწითლე 9-დან 15 სთ-მდე?

- ა) სულფურ;

- ბ) ჰიპერიკუმ;
- * გ) მენიანთეს;
- დ) გლონოინი;
- ე) მერკურ სოლუბილის.

1376. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების სიწითლე მენისფრუაციის წინ?

- ა) სულფურ;
- ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) მენიანთეს;
- * დ) გლონოინი;
- ე) მერკურ სოლუბილის.

1377. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს ქუთუთოების სიწითლე დამით?

- ა) სულფურ;
- ბ) ჰიპერიკუმ;
- გ) მენიანთეს;
- დ) გლონოინი;
- * ე) მერკურ სოლუბილის.

1378. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს მარჯვენა თვალის შეშეპება?

- * ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) კოლოცინგი;
- გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) აპის.

1379. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს მარცხენა თვალის შეშეპება?

- ა) ლიკოპოდიუმ;
- * ბ) კოლოცინგი;
- გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) აპის.

1380. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების შეშეპება დილით თავის ტკივილის შემდეგ?

- ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) კოლოცინგი;
- * გ) კოკუს კაკტი;
- დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) აპის.

1381. რომელი პრეპარატის ტიპის პაციენტს ახასიათებს თვალების შეშეპება დამე?

- ა) ლიკოპოდიუმ;
- ბ) კოლოცინგი;
- გ) კოკუს კაკტი;
- * დ) ჰეპარ სულფურის;
- ე) აპის.

1382. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფონის დილით საწოლიდან აღგომისას?

- * ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმ;
- გ) სულფური;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- ე) ციკუტა.

1383. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფონის 18-დან 20 საათამდე?

- ა) კალკარეა კარბონიკა;
- * ბ) კაუსტიკუმ;
- გ) სულფური;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- ე) ციკუტა.

1384. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფონის სადილის შემდეგ?

- * ა) კალკარეა კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმ;

- 8) სელფური;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- ვ) ციკუტა.

1385. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფობის თბილ ამინდში?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმ;
- *გ) სელფური;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- ვ) ციკუტა.

1386. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფობის გაუარესებით თბილ შენობაში?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმ;
- გ) სელფური;
- *დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- ვ) ციკუტა.

1387. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის ფოტოფობის ნისლიან ამინდში?

- ა) კალკარებ კარბონიკა;
- ბ) კაუსტიკუმ;
- გ) სელფური;
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ;
- *ე) ციკუტა.

1388. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების სიმშრალეს ცრემლდენის შემდეგ?

- *ა) სელფური;
- ბ) ნატრიუმ სელფურიკუმ;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აპის.

1389. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების სიმშრალეს შეადლის შემდეგ?

- ა) სელფური;
- *ბ) ნატრიუმ სელფურიკუმ;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აპის.

1390. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების სიმშრალეს დამე?

- ა) სელფური;
- ბ) ნატრიუმ სელფურიკუმ;
- *გ) ლიკოპოდიუმ;
- დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აპის.

1391. რომელ პრეპარატს იხმართ, თუ პაციენტი უჩივის თვალების სიმშრალეს მენსიტრუაციის დროს?

- ა) სელფური;
- ბ) ნატრიუმ სელფურიკუმ;
- გ) ლიკოპოდიუმ;
- *დ) მაგნეზია კარბონიკა;
- ე) აპის.

1392. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცივის შეგრძნებას მარცხენა თვალში?

- *ა) ტარენტულა;
- ბ) ლიკოპოდიუმ;
- გ) ტუა;
- დ) თეა;
- ე) კოკა.

1393. რომელი პრეპარატი კურნავს სიცივის შეგრძნებას თვალებში საღამოს?

- ა) ტარენტულა;
- *ბ) ლიკოპოდიუმ;
- გ) ტუა;

დ) თეა;

ე) კოპა.

1394. რომელი პრეპარატი ქურნავს სიცივის შეგრძნებას ავალმყოფ თვალში?

ა) ტარენტულა;

ბ) ლიკოპოლიუმ;

*გ) ტუია;

დ) თეა;

ე) კოპა.

1395. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ხედავს მბრწყინავ თბილქებს თავბრუსხვევის დროს?

*ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) კონიუმ;

გ) იგნაცია;

დ) ციკლამენ;

ე) ხელილონიუმ.

1396. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ხედავს მბრწყინავ ვარსკვლავებს?

ა) კალკარეა კარბონიკა;

*ბ) კონიუმ;

გ) იგნაცია;

დ) ციკლამენ;

ე) ხელილონიუმ.

1397. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ხედავს მბრწყინავ ზიფზაგებს?

ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) კონიუმ;

*გ) იგნაცია;

დ) ციკლამენ;

ე) ხელილონიუმ.

1398. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ხედავს მბრწყინავ ნემსებს?

ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) კონიუმ;

გ) იგნაცია;

*დ) ციკლამენ;

ე) ხელილონიუმ.

1399. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი ხედავს მბრწყინავ თბილქებს - წერტილებს?

ა) კალკარეა კარბონიკა;

ბ) კონიუმ;

გ) იგნაცია;

დ) ციკლამენ;

*ე) ხელილონიუმ.

1400. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი უჩივის გაორებას თვალებში დამე?

*ა) აცილეუმ ნიგრიკუმ;

ბ) კაუსტიკუმ;

გ) გელბემოუმ;

დ) ბელადონა;

ე) კუპრუმ მეტალიკუმ.

1401. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტი უჩივის გაორებას თვალებში ზემოთ ახედვისას?

ა) აცილეუმ ნიგრიკუმ;

*ბ) კაუსტიკუმ;

გ) გელბემოუმ;

დ) ბელადონა;

ე) კუპრუმ მეტალიკუმ.

1402. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწეხებს ტკივილი ფერების არეში დღე და დამე?

*ა) ჰელებორუს;

ბ) მაგნეზია სულფურიკა;

გ) ჰიდრასტის;

დ) გრაფიტი;

ე) ხინინუმ სულფურიკუმ.

1403. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 10 სთ-გე?

ა) ჰელებორუს;

*ბ) მაგნეზია სულფურიკა;

გ) ჰიდრასტის;

დ) გრაფიტი;

ე) ხინინუმ სულფურიკუმ.

1404. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 10საათსა და 30 წუთგე?

ა) ჰელებორუს;

ბ) მაგნეზია სულფურიკა;

*გ) ჰიდრასტის;

დ) გრაფიტი;

ე) ხინინუმ სულფურიკუმ.

1405. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 13 სთ-გე?

ა) ჰელებორუს;

ბ) მაგნეზია სულფურიკა;

გ) ჰიდრასტის;

*დ) გრაფიტი;

ე) ხინინუმ სულფურიკუმ.

1406. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 14 სთ-გე?

ა) ჰელებორუს;

ბ) მაგნეზია სულფურიკა;

გ) ჰიდრასტის;

დ) გრაფიტი;

*ე) ხინინუმ სულფურიკუმ.

1407. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 15 სთ-გე?

*ა) ფიზოსტიგმა;

ბ) ბერბერის;

გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;

დ) ნექს ვომიკა;

ე) ფოსფორი.

1408. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 17 სთ-გე?

ა) ფიზოსტიგმა;

*ბ) ბერბერის;

გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;

დ) ნექს ვომიკა;

ე) ფოსფორი.

1409. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში 20 სთ-გე?

ა) ფიზოსტიგმა;

ბ) ბერბერის;

*გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;

დ) ნექს ვომიკა;

ე) ფოსფორი.

1410. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში ქარში და წვიმაში მოხვედრისას?

ა) ფიზოსტიგმა;

ბ) ბერბერის;

გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;

*დ) ნექს ვომიკა;

ე) ფოსფორი.

1411. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკივილი ყერების არეში გაუმჯობესებით ცივი ჰაერისგან?

ა) ფიზოსტიგმა;

ბ) ბერბერის;

გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;

დ) ნექს ვომიკა;

*ე) ფოსფორი.

1412. რომელი პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ტკივილი ყერების არეში წერისას?

- * ა) ფიზისტიგმა;
- ბ) ბერბერის;
- გ) ნაფრიუმ სულფურიკუმ;
- დ) ნექს ვომიკა;
- ე) ფოსფორი.

1413. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს ფურებში ჭამის დროს?

- * ა) ლახნანთექს;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) აკონიტუმ;
- დ) ლახების;
- ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1414. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს ფურებში მგბავრობის შემდეგ?

- ა) ლახნანთექს;
- * ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) აკონიტუმ;
- დ) ლახების;
- ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1415. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს ფურებში მთქნარებისას?

- ა) ლახნანთექს;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- * გ) აკონიტუმ;
- დ) ლახების;
- ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1416. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს ფურებში ხველისას?

- ა) ლახნანთექს;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) აკონიტუმ;
- * დ) ლახების;
- ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1417. რომელი პრეპარატი კურნავს ჩხვლეფით ქავილს ფურებში?

- ა) ლახნანთექს;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) აკონიტუმ;
- * დ) ლახების;
- ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1418. რომელი პრეპარატი კურნავს ქავილს ფურებში წოლისას?

- ა) ლახნანთექს;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) აკონიტუმ;
- დ) ლახების;
- * ე) კალიუმ ფოსფორიკუმ.

1419. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თეთრი გამონალენი მარცხენა ნესტოლან?

- * ა) გრაფიგი;
- ბ) ციმიციფეგა;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) პლანტაგო.

1420. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწესებს თეთრი გამონალენი ცხვირიდან დღისით?

- ა) გრაფიგი;
- * ბ) ციმიციფეგა;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) პლანტაგო.

1421. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს წყლისმაგრი გამონალენი მარცხენა ნესტოლან დამე?

- ა) გრაფიტი;
- ბ) ციმიციფება;
- * გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ჰლანტიგო.

1422. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს წყლისმაგრი გამონალენი მარცხენა ნესტოლან 5 სთ-ზე?

- ა) გრაფიტი;
- ბ) ციმიციფება;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- * დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- ე) ჰლანტიგო.

1423. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს ყვითელი გამონალენი მარჯვენა ნესტოლან?

- ა) გრაფიტი;
- ბ) ციმიციფება;
- გ) კალკარეა სულფურიკა;
- დ) არსენიკუმ ალბუმ;
- * ე) ჰლანტიგო.

1424. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან გაზაფხულზე?

- * ა) კონიუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) სეპია;
- დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ჰეპარ სულფურის.

1425. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან დვინის დალევის შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- * ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) სეპია;
- დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ჰეპარ სულფურის.

1426. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან ბუასილის დროს?

- ა) კონიუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- * გ) სეპია;
- დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ჰეპარ სულფურის.

1427. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან ჭამის შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) სეპია;
- * დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- ე) ჰეპარ სულფურის.

1428. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან შემცივნების შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) სეპია;
- დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- * ე) ჰეპარ სულფურის.

1429. რომელი პრეპარატი ინიშნება, თუ პაციენტს აწევებს სისხლდენა ცხვირიდან სიმდერის შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ;
- გ) სეპია;
- დ) ამონიუმ კარბონიკუმ;
- * ე) ჰეპარ სულფურის.

1430. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწევებს ასთმური სუნთქვა 10-დან 11 სთ-მდე?

- * ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბრიონია;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) არსენიკუმ იოდ.

1431. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ასთმური სუნთქვა შეადლებე?

- ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- * ბ) ლობელია;
- გ) ბრიონია;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) არსენიკუმ იოდ.

1432. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ასთმური სუნთქვა 21 სთ-ბე?

- ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- ბ) ლობელია;
- * გ) ბრიონია;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) არსენიკუმ იოდ.

1433. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ასთმური სუნთქვა 23 სთ-ბე მოშარდვის დროს?

- ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბრიონია;
- * დ) ხელიდონიუმ;
- ე) არსენიკუმ იოდ.

1434. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ასთმური სუნთქვა 23-დან 2 სთ-მდე

- ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბრიონია;
- დ) ხელიდონიუმ;
- * ე) არსენიკუმ იოდ.

1435. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტს აწესებს ასთმური სუნთქვა მოშარდვის დროს?

- ა) ფერუქმ მეტალიკუმ;
- ბ) ლობელია;
- გ) ბრიონია;
- * დ) ხელიდონიუმ;
- ე) არსენიკუმ იოდ.

1436. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას დღე ან დამე, რომელიც აღვიძებს პაციენტს?

- * ა) სეპია;
- ბ) მერკურ სოლუბილის;
- გ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- დ) კარ्बონიკუმ;
- ე) სილიცია.

1437. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას მხოლოდ დამე?

- ა) სეპია;
- * ბ) მერკურ სოლუბილის;
- გ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- დ) კარ्बონიკუმ;
- ე) სილიცია.

1438. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას 6-დან 18 სთ-მდე?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკურ სოლუბილის;
- * გ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- დ) კარ्बონიკუმ;
- ე) სილიცია.

1439. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას დილით და დამე?

- ა) სეპია;

- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- *ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1440. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას დილიდან 18 სთ-მდე?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- *გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1441. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას 7-დან 10 სთ-მდე?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- *ჟ) სილიცება.

1442. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას 8-დან 9სთ-მდე?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- *ჟ) სილიცება.

1443. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას დილით 9 სთ-მდე?

- *ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1444. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას 20-დან 21 სთ-მდე?

- *ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1445. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას ყიფანახველის დროს თუ იგი აღინიშნება მხოლოდ შუალდემდე?

- *ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1446. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას, რომელიც აღინიშნება მხოლოდ დაწოლისას?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- *ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1447. რომელი პრეპარატი კურნავს მტანჯავ, აუტანელ ხველას დილით გაღვიძებისას?

- ა) სეპია;
- ბ) მერკერ სოლუბილის;
- გ) კალკარებ ფოსფორიკა;
- *ღ) კაუსტიკუმ;
- ჟ) სილიცება.

1448. რომელი პრეპარატი კურნავს ხველას, რომელიც აღინიშნება პერიოდულად ყოველ მეორე დამეს?

- ა) სეპია;
- *ბ) მერკერ სოლუბილის;

- გ) კალეარება ფოსფორიკა;
- დ) კარ्बონატები;
- ე) სილიცია.

1449. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი მარცხენა სარძევე ჯირკვლებში ხველის დროს?

- *ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1450. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში დილით?

- ა) კონიუმ;
- *ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1451. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში შუალდის შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- *გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1452. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში ორსულობის დროს?

- ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- *დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1453. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში ხველების დროს?

- *ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1454. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში შემცირების შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- *ე) იგნაცია.

1455. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი სარძევე ჯირკვლებში ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას?

- *ა) კონიუმ;
- ბ) ლილიუმ ტიგრინუმ;
- გ) სანგვინარია;
- დ) სეპია;
- ე) იგნაცია.

1456. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი გულის არეში დილით გადეიძებისას?

- *ა) ტარენტულა;
- ბ) ტუია;
- გ) ფიტოლაკა;
- დ) დიგიტალის;
- ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1457. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწესებს ტკიფილი გულის არეში შუალდემდე?

- ა) ტარენტულა;
- *ბ) ტუია;
- გ) ფიტოლაკა;

დ) დიგიტალის;

ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1458. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკიფილიგულის არეში ამოსუნთქვის დროს?

ა) ტარენტულა;

ბ) ტუია;

*გ) ფიტოლაკა;

დ) დიგიტალის;

ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1459. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკიფილიგულის არეში ხველისას?

*ა) ტარენტულა;

ბ) ტუია;

გ) ფიტოლაკა;

დ) დიგიტალის;

ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1460. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკიფილიგულის არეში კოიტუსის შემდეგ?

ა) ტარენტულა;

ბ) ტუია;

გ) ფიტოლაკა;

*დ) დიგიტალის;

ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1461. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკიფილიგულის არეში შარლის ბუშტი ტკიფილის შემდეგ?

ა) ტარენტულა;

ბ) ტუია;

გ) ფიტოლაკა;

დ) დიგიტალის;

*ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1462. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ,თუ პაციენტს აწებებს ტკიფილიგულის არეში მოშარდვის წინ?

ა) ტარენტულა;

ბ) ტუია;

გ) ფიტოლაკა;

დ) დიგიტალის;

*ე) ლითოუმ მეტალიკუმ.

1463. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება 6 სთ-ბე?

*ა) პულსატილა;

ბ) ლაბების;

გ) არსენიკუმ ალბუმ;

დ) აგარიკუს;

ე) სენეგა.

1464. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება დამე?

ა) პულსატილა;

*ბ) ლაბების;

გ) არსენიკუმ ალბუმ;

დ) აგარიკუს;

ე) სენეგა.

1465. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება შეადამიდან დილამდე?

ა) პულსატილა;

ბ) ლაბების;

*გ) არსენიკუმ ალბუმ;

დ) აგარიკუს;

ე) სენეგა.

1466. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება დაწოლის შემდეგ?

*ა) პულსატილა;

ბ) ლაბების;

გ) არსენიკუმ ალბუმ;

დ) აგარიკუს;

ე) სენეგა.

1467. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება საღილის შემდეგ?
- ა) ჰელსაგილა;
 - ბ) ლაბეგის;
 - გ) არსენიკუმ ალბუმ;
 - *დ) აგარიკეს;
 - ე) სენეგა.

1468. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება გვერდებიდან საღილის შემდეგ?

- ა) ჰელსაგილა;
- ბ) ლაბეგის;
- გ) არსენიკუმ ალბუმ;
- დ) აგარიკეს;
- *ე) სენეგა.

1469. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება გვერდებიდან საღილის შემდეგ?

- ა) ჰელსაგილა;
- ბ) ლაბეგის;
- გ) არსენიკუმ ალბუმ;
- *დ) აგარიკეს;
- ე) სენეგა.

1470. რომელი პრეპარატი კურნავს წვითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდის არეში, რომელიც აღინიშნება გვერდებიდან მჯდომარე პოზიციაში?

- ა) ჰელსაგილა;
- ბ) ლაბეგის;
- გ) არსენიკუმ ალბუმ;
- დ) აგარიკეს;
- *ე) სენეგა.

1471. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში რომელიც აღინიშნება დღით ადგომისას?

- *ა) რანჟინკულეს ბულბოტუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1472. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება შეადლებდე?

- ა) რანჟინკულეს ბულბოტუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- *დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1473. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება გენსტრუაციის წინ?

- ა) რანჟინკულეს ბულბოტუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ;

1474. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება შემოღვომაშე?

- ა) რანჟინკულეს ბულბოტუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1475. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება ამინდის შეცვლისს?

- *ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1476. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება ცივ ჰაერზე?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1477. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება მარცხენა გეერლიდან და ვრცელდება ყელში?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- *გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1478. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება მარცხენა მხარეს ცივ ჰაერთან შეხების შემდეგ?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1479. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს გულმკერდში, რომელიც აღინიშნება მარცხენა მხარეს და ვრცელდება ყბისქვეშა ჯირკვლებში?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1480. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება მკერდის ძვალში 16 სო-ტე?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- *ე) ლიკოპოდიუმ.

1481. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება მკერდის ძვალში დაბაბის დროს?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- *დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1482. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდეტითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება მკერდის ძვალში სიმძიმის აწევისას?

- ა) რანჟინკულუს ბულბომუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- *დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპოდიუმ.

1483. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ლავიწქვეშა მთლამოში შესუნთქვისას?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- *ე) ლიკოპორდიუმ.

1484. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ლავიწქვეშა მთლამოში მორნაბობისას?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- *ე) ლიკოპორდიუმ.

1485. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ლავიწქვეშა მთლამოში ხევლებისას?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- *ე) ლიკოპორდიუმ.

1486. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება ლავიწქვეშა მთლამოში პულსაციით?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- *ე) ლიკოპორდიუმ.

1487. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სარძევე ჯირკვლები რძის გამოსვლისას?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპორდიუმ.

1488. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სარძევე ჯირკვლების ქეეშ შეაღდის შემდეგ?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპორდიუმ.

1489. რომელ პრეპარატს დანიშნავთ, თუ პაციენტი უჩივის ჩხვდლეჭითი ხასიათის ტკიფილს, რომელიც აღინიშნება სარძევე ჯირკვლების ქეეშ სიმძიმის აწევის შემდეგ?

- ა) რანჟინქულუს ბულბორგუს;
- *ბ) კალიუმ კარბონიკუმ;
- გ) კალკარეა კარბონიკა;
- დ) კაუსტიკუმ;
- ე) ლიკოპორდიუმ.

1490. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკიფილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება მარცხენა შხარეს?

- *ა) კონიუმ;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიკუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1491. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება ქარიან ამინდში?

- ა) კონიუმ;
- *ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1492. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება ზემოთ ახელვისას?

- ა) კონიუმ;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- *გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1493. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება ყლაპვისას?

- ა) კონიუმ;
- *ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1494. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება ღრმა სუნთქვისას?

- ა) კონიუმ;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- *დ) ხელიდონიუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1495. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება ჭამის შემდეგ?

- ა) კონიუმ;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- *ე) ნუქს ვომიკა.

1496. რომელი პრეპარატი კურნავს ტკივილს კისრის არეში, რომელიც აღინიშნება საღილის შემდეგ?

- *ა) კონიუმ;
- ბ) კალკარეა ფოსფორიკა;
- გ) გრაფიტი;
- დ) ხელიდონიუმ;
- ე) ნუქს ვომიკა.

1497. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი ხერხემლის არეში, რომელიც აღინიშნება ხველის ღროს?

- *ა) ბელადონა;
- ბ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ლახების;
- ე) ფოსფორი.

1498. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი ხერხემლის არეში, რომელიც აღინიშნება კოიფუსის შემდეგ?

- ა) ბელადონა;
- *ბ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ლახების;
- ე) ფოსფორი.

1499. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტკივილი ხერხემლის არეში, რომელიც აღინიშნება მწოლიარე მდგომარეობაში?

- ა) ბელადონა;
- ბ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- *გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- დ) ლახების;
- ე) ფოსფორი.

1500. რომელ პრეპარატს ახასიათებს პულსირებადი ტკივილი ხერხემლის არეში?

- ა) ბელადონა;
- ბ) აცილუმ ნიტრიკუმ;
- გ) ნატრიუმ მურიატიკუმ;
- *დ) ლახების;
- ე) ფოსფორი.

დამატებითი საკითხები

1502. ავადმყოფს ძლიერი გულისრევის შეგრძნებით აქვს ცალმხრივი თავის ტკივილი თვალის ზემოთ. ფერმერთაღია, თავში ისეთი შეგრძნება აქვს, თითქოს ძვლები დამსხვრეულია.

- ა) ბელადონა
- ბ) რანუნკულუს ბელადოზუს
- *გ) იპეპაპუანა
- დ) ბაპტიზია
- ე) სანგვინარია

1503. პაციენტს აქვს გამუდმებული ძლიერი გულისრევის შეგრძნება პირიდან სისხლდენით. სისხლი ალისფერია, ღებინების მცდელობა, სახე ფერმერთაღი, სისუსტე, ძილიანთბა. გულისრევა რჩება ღებინების შემდეგაც

- ა) ბაპტიზია
- ბ) ტებერჯულინუმი
- გ) არგენტუმ ნიტრიკუმი
- *დ) იპეკაკუანა
- ე) არნიკა

1504. პაციენტს აქვს შეგრძნება, თითქოს საჭმლის მონელება შენელებული აქვს, გრძნობს, რომ კუჭში საჭმელი დიდხანს რჩება; სიმძიმე კუჭში, გულმარვა ჭამის მერვ, ანუსის შეკუმშვის შეგრძნება.

- *ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ
- ბ) ჰელსატილა
- გ) კარბო ვეგეტაბილის
- დ) ლიკოპოდიუმი
- ე) ხელიდონიუმი

1505. პაციენტს აქვს ტკივილი ეპიგასტრიუმში. ტკივილი ეწყება ჭამიდან ნახევარი საათის შემდეგ და აღინიშნება ტკივილის გადაცემა ყველა მიმართილებით. დარწმუნებულია, რომ ტკივილი გაუვლის ღებინების შემდეგ, ბევრს ეწევა, აქვს ხან მჟავე ბოყინი, ხან მწარე, ძლიერი გულისრევის შეგრძნება.

- ა) იპეკაკუანა
- *ბ) ნუქს ვომიკა
- გ) ლიკოპოდიუმი
- დ) ხელიდონიუმი
- ე) მერკური

1506. პაციენტი უჩივის ტკივილს კუჭის არეში ჭამიდან 3-4 საათის შემდეგ; ტერფები უოფლიანდება, თფლი მყრალი

- *ა) კრეობოტუმ
- ბ) აბიეს ნიგრა
- გ) ლიკოპოდიუმი
- დ) ნუქს ვომიკა
- ე) ჰელსატილა

1507. პაციენტი უჩივის მწვავე ჩხვლეტითი ხასიათის ტკივილს ღვიძლის არეში. ღვიძლობს დიდი რაოდენობით აღოპათიურ წამალს, აქვს გაზების დაგროვება და შეგრძნება, თითქოს ნაწლავები “ისრისება” ქვებს შორის

- ა) კარბო ვეგეტაბილის
- ბ) კოლოცინგი
- *გ) ნუქს ვომიკა
- დ) ლიკოპოდიუმი
- ე) ხელიდონიუმი

1508. პაციენტს აქვს ფადარათი. განავალი ფაფისებური, ყვითელი ფერის. უკავშირებს შიშს. თვალის გუგები გაფართოვებულია, ხელები უქანკალების. პაციენტი აპათიურია, შენელებული მოძრაობებით.

- ა) კარბო ვეგეტაბილის
- ბ) ბელადონა
- *გ) გელზემინუმ
- დ) ნუქს ვომიკა
- ე) აღუმინა

1509. პაციენტს აქვს უკითხელი ფერის ფალარათი. ძლიერი ძილიანობა, უამრო გამოხედვა. ჰგაეს მთერალს, მაღალი სიცხვე. შარლი და ოფლი მყრალია, საუბრისას დროდადრო იძინებს.

- ა) კარბო ვეგეტაბილის
- ბ) ბელადონა
- გ) ოპიტო
- *დ) ბაპტიზია
- ე) ჰიოსკიამუს

1510. პაციენტი უჩივის ტკივილებს კუჭის არეში, რომელიც ძლიერდება ჭამისას, ირადიაციით ხერხემალში. შეგრომნება, თითქოს რაღაც აწვება მუცელის ქვედა ნაწილზე, თითქოს მისი შიგთავსი საშოღან ლამობს გამოვარდნას.

- *ა) ბელადონა
- ბ) ნუქს ვომიკა
- გ) ლიკოპოდიუმი
- დ) ხელიდონიუმი
- ე) ანაკარდიუმი

1511. მოწყენილი, აპათიური პაციენტი უჩივის ფალარათს, რომელიც მეორდება დღეგამოშევებით. ნაწლავები და კუჭი საცხე აქვს გამოიყოფილი მდგომარეობას არ აუმჯობესებს. განსაკუთრებით უღიაბინდება ხილის მიღების შემდეგ. აქვს მჟავე საკვების მოთხოვნილება. ძლიერ გამოხატული სისუსტე. ძილის დროს მთელი ტანი უოფლიანდება.

- ა) დიგიტალისი
- *ბ) ხინა
- გ) კალკარეა კარბონიკა
- დ) კარბო ვეგეტაბილის
- ე) ლიკოპოდიუმი

1512. პაციენტი უჩივის ფალარათიანობას. განავალი მწვანე ფერის, მჟავე სუნით. აღნიშნავს როგორც ამ ჩივილის, ისე საერთო მდგომარეობის გაუარესებას ნესტიან ამინდში. გაუარესებას კუჭ-ნაწლავის მხრიდან ხმირად ერთვის კანზე გამოხაყარი.

- ა) ბეფო რანა
- ბ) რანუნკულუს ბელბოზუს
- *გ) ლულკამარა
- დ) არსენიკუმ ალბუმ
- ე) რუს ტოქსიკოდენდრონ

1513. ყბბობა, გამოწვეული სწორი ნაწლავის სრული აფონიით აღენიშნება პაციენტს, რომელსაც საერთოდ არ აქვს დეფეკაციის სერვილი და უხევება ძლიერი და ხანგრძლივი ჭინთვა. ახასიათებს ძლიერი ბოყინი წლების განმავლობაში. ძმრიანის, მარილისა და წიწაკის მიღება მაშინვე იწვევს ხველებას.

- ა) გელტემინი
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- გ) სელფური
- დ) ბრიონია
- *ე) ალუმინა

1514. პაციენტს აქვს შეკრულობა მკერივი, შავი ფერალური მასებით. ძლიერი უშედეგო ჭინთვებისაგან ავალმყოფს ასხამს ცივი თველი. შეიძლება გელიც წაუკიდეს.

- *ა) ვერაფრუმ ალბუმ
- ბ) კუპრუმ
- გ) ბრიონია
- დ) ალუმინა
- ე) ბეფო რანა

1515. პაციენტს დეფეკაციის წინ ეწყება ტკივილი მუცელის არეში. კუჭში გადის სწრაფად, დიდი რაოდენობის მომწვანო წყალწყალა ფერალური მასებით. ამ დროს პაციენტი ისეთ სისუსტეს გრძნობს, თითქოს გული უნდა წაუკიდეს. ტანში გრძნობს სიცივეს, ასხამს ცივი თველი, განსაკუთრებით შებლზე.

- ა) დედლამარა
- ბ) არსენიკუმ ალბუმ
- *გ) ვერაფრუმ ალბუმ
- დ) ბეფო რანა
- ე) ალუმინა

1516. პაციენტი ძალიან ფერმკრთალია, ცივი მონაცრისფრო-ყვითელი სახით. კუჭსა და ნაწლავებში გამოიყოფილი სიჭარბეა. ბოყინი აძლევს შევებას მცირე დროით. აქვს შეგრომნება, რომ ნაწლავები გაუსკლება. კიდურები ცივი, მიუხედავად ამისა, სულ ითხოვს რომ უნივერსუალური მასებით (მარაოთი ან სხვა რამით). ცივი თველი, “ცივი სუნითქვა”. ძლიერმარება უარესდება საღამოს და თბილ ნესტიან ამინდში, ცხიმისგან.

- ა) ბრომი

*ბ) კარბო ვეგეტაბილის

გ) ხინა

დ) ბაპტიზია

ე) პულსატილა

1517. სუსტი პაციენტი, ფერმკრთალი, თვალები ჩაცვენილი, დაღლილი. კუჭში და ნაწლავებში დიდი რაოდენობით გაზები. ბოყინი შვერისა არ აძლევს. გაუარესება ხილისგან. გაუმჯობესება დახრილ მდგომარეობაში. ფალარათი.

*ა) ხინა

ბ) კარბო ვეგეტაბილის

გ) კოლოცინტი

დ) ბაპტიზია

ე) ლიკოპოლიუმი

1518. 45 წლის ქალს არ შეუძლია სიარული სიბრუნვები ან დახუჭული თვალებით. აწებებს გამონაყარი, რომელიც ძლიერდება ლოგინის სითხოსგან. აქვს მოთხოვნილება ჭამოს ცარცი და ყავის ნალექი.

ა) არგენტუმ ნიტრიკუმი

*ბ) ალუმინია

გ) გელბემინუმი

დ) სულფური

ე) კალკარუმ კარბონიკა

1519. მომდერალს ეხლისჩება ხმა დიდაობით. აქვს ტკივილები მკერდის ძვლის უკან. გაუარესება მშრალ, ცივ ამინდში. ტკივილი მწველი, ფხაჭნის შეგრძნებით. იწვევს მშრალ ხველის. ხველა უმსუბუქდება ცივი წყლის დალევის შემდეგ. ზედა ჭეთუთოვების დაშვება - ბოლომდე ვერ აღებს თვალებს.

ა) ბრიონია

ბ) ფოსფორი

*გ) კაუსტიკუმი

დ) კალი კარბონიკი

ე) არსენიკუმ ალბუმ

1520. პაციენტს ეხრიწება ხმა საღამოობით. თან ახლავს ტკივილები ხორბში. გასდის ცივ ჰაერზე და ცივი წყლისგან. უყვარს ცივი საჭმელა-სასმელია, ნაყინი.

ა) ბრიონია

ბ) კაუსტიკუმ

გ) არუმ ტრიფილუმ

*დ) ფოსფორი

ე) გრაფიტი

1521. თეპრის მომდერალს აქვს ქრონიკული ლარინგიტი, ხშირად სიმდერისს უფყდება ხველა, ახველებს ასევე მმრის, მარილის, წიწავის მიღების მერვ. გაუარესება აქვს ცივი ჰაერისგან, ბამთარში, ახასიათებს გაუმჯობესება - ნესტიან ამინდში.

*ა) ალუმინია

ბ) კაუსტიკუმი

გ) არგენტუმ მეტალიკუმ

დ) არუმ ტრიფილუმ

ე) კალი ბიქრომიკუმ

1522. მომდერალს აწებებს ხმის დაკარგვა. აქვს ცხვირის დაცობის შეგრძნება მიუხედავად სურდოსი. გამონალენი ცხვირიდან წყალწყალა, ძალის მწველი, ძლიზიანებს კანს. აცემინებს განსაკუთრებით დამე.

ა) კაუსტიკუმ

ბ) არგენტუმ ნიტრიკუმ

*გ) არუმ ტრიფილუმ

დ) სამბუქუს

ე) ფოსფორი

1523. ქედმაღალი, ეგლიცენტრული ქალი უზივის სპაზმურ ტკივილს ჰიპოგასტრიუმის არეში. გარეთა სასქესო ორგანოები ცივი, მგრძნობიანება გასინჯვის მიმართ. აქვს სექსუალური აგზნება

ა) ამბრა გრიზება

*ბ) პლაფინა

გ) ნექს ვომიკა

დ) ფოსფორი

ე) იგნაცია

1524. პაციენტი მორცხვია, აღვიღად წითლდება, ნერვიულობს ნებისმიერი მიზეზით, თუმცა ამაზე უხალისოდ დაპარაკობს. შიში ჩვეული მოვალეობის შესრულების დაწყებამდე. შიშის უკავშირებს განცდილ დამცირებას: პროფესორს არ მოეწონა მისი

ნამუშევარი. ეპრ იტანს სხვა პირების ყოფნას დეფეაციის ან მოშარდვის დროს. ბოლო კეირის მანძილზე უჩივის ხველას დამდამობით, გაუარესებით ხმამდალი საუბრისა და მუსიკისაგან.

- ა) კარცინოზინუმი
- ბ) იგნაცია
- გ) პლატინი
- დ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- *ე) ამბრა გრიტეა

1525. პაციენტი უჩივის ლეიკორეას პროფეტული, სუნიანი გამონალენით, წვის შეგრძნებით გენიტალიებში, რაც მსუბუქდება გარეთა სასქესო ორგანოების ცივი წყლით დაბანით. სუიციდისადმი მიღრეკილება დანის დანახვისას.

- ა) ანაკარდიუმი
- ბ) არსენიუმ ალბუმ
- *გ) ალუმინია
- დ) არგენტუმ ნიტრიკუმ
- ე) პლატინი

1526. პაციენტის აწეხებს კვერცხის ცილის მაგარი ლეიკორეა. შეგრძნებით, თითქოს გენიტალიებში ცხელი სითხე ჩამოედინება. ძლიერ ნერვიულობს მომავალზე. ალვილად შინდება, ძალიან მგრძნობიარეა მოუღოლენელი ხმაურის მიმართ.

- *ა) ბორაქსი
- ბ) ვიოლა ტრიკოლორ
- გ) კოკა
- დ) ლილიუმ ტიგრინუმ
- ე) ნუქს მოშატა

1527. პაციენტის აწეხებს თეთრი ლეიკორეა, რომელიც შემდგომ ფერს იცვლის და მწვანე ხდება. მენტესი არარეგულარულია, პროფეტული. აქვს მარილის ძლიერი სურვილი. წყურვილი, სვამს ცივ წყალს და ამის შემდეგ თავს კარგად გრძნობს.

- ა) ბორაქსი
- ბ) ვიოლა ტრიკოლორ
- *გ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- დ) კოკა
- ე) ლაკ კანინუმ

1528. პაციენტის აწეხებს საშვილოსნოს პროლაფსის შეგრძნება. აღინიშნება საკერცხებისა და ფალოპის მიღების ანთება. გარეთა სასქესო ორგანოები ზემგრძნობიარეა. პაციენტი ისტერიული პიროვნებაა. სპაზმური ხასიათის ტკივილი მატულობს ნელა და ასევე ნელა ქრება.

- *ა) პლატინია
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- გ) ბორაქსი
- დ) თება
- ე) კოკა

1529. პაციენტს აქვს ლეიკორეა მენტესის სანაცვლოდ. რძისმსგავსი, სუნიანი ლეიკორეა მოშარდვის დროს. დამე ძლიერი თვლიანობა მარგო თავზე.

- ა) პლატინია
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- გ) ლიკოპოდიუმ
- *დ) სილიცეა
- ე) კონიუმი

1530. პაციენტს აწეხებს რძისმსგავსი, სუნიანი ლეიკორეა მოშარდვის დროს. ვულფისა და საშოს ინფენიური ქავილი. გარეთა სასქესო ორგანოები ძალიან მგრძნობიარეა. ფეხების ტერფები უყარს თფლისგან.

- ა) პლატინია
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- გ) სეპია
- *დ) სილიცეა
- ე) ლიკოპოდიუმ

1531. პაციენტს აქვს ლეიკორეა მენტესის სანაცვლოდ. სისხლის გამოყოფა მენსტრუალურ პერიოდებს მორის. იგი ანემიურია, აღვილად ცივდება. დამე თვლიანობს თავის და სახის არეში; მუჭეს თავვები შევარდნილი აქვს.

- ა) პლატინია
- ბ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ
- გ) ლიკოპოდიუმი
- *დ) სილიცეა
- ე) სარსაპარილა

1532. პაციენტი უჩივის ხშირად განმეორებად ჩირქეოვან კულვიტს, საშვილოსნო კონგესტიურია და ძალიან მძიმე. პრობლემები მოულოდნელად და ძლიერად იწყება. ტკივილი ჩნდება მოულოდნელად და ქრება ასევე მოულოდნელად. თავი წითელია, ცხელი, ენა მშრალი და მკვეთრად წითელი. იცხე მაღალი, ბოლვა.

- ა) კოპა
- ბ) სფრამონიუმი
- გ) ნაფრიუმ მურიაფიკუმ
- *დ) ბელადონა
- ე) ბაპტიზია

1533. პაციენტი უჩივის საშვილოსნოდან დია წითელი სისხლის გამოყოფას, რაც ცხლად შეიგრძნობა ბარბაფებზე, საშვილოსნოს კოლიკს. ძლიერ ქვემოთ მქაჩავ ტკივილებს. პრობლემები მოულოდნელად და ძლიერად იწყება. ტკივილი ჩნდება მოულოდნელად და ქრება ასევე მოულოდნელად. თავი წითელია, ცხელი, ენა მშრალი და მკვეთრად წითელი. მაღალი ტემპერატურის დროს იცის ბოლვა, შიში.

- ა) ხამომილი
- ბ) სეპია
- გ) ნაფრიუმ მურიაფიკუმ
- *დ) ბელადონა
- ე) ბაპტიზია

1534. პაციენტი უჩივის ძლიერ, მსროლავი ხასიათის ტკივილს საშვილოსნოს არეში საშვილოსნოს ლრუდან მოულოდნელი ძლიერი სისხლდენით. აღინიშნება ენდომეტრიუმისა და სისქესთ ორგანოების სხვა ნაწილების ანთება მეორადი ინფექციის გამო. პრობლემები მოულოდნელად და ძლიერად იწყება. ტკივილი ჩნდება მოულოდნელად და ქრება ასევე მოულოდნელად მაღალი სიცხე, თავი წითელია, ცხელი, ენა მშრალი და მკვეთრად წითელი. პაციენტი აგზნებულია, აგრესიული. უნდა ვინჩე ცემოს.

- ა) სენეციო
- ბ) კოლოცინტი
- გ) ლაბეტისი
- *დ) ბელადონა
- ე) ბაპტიზია

1535. პაციენტი უჩივის მოულოდნელ და ძლიერ სისხლდენის. საშვილოსნოდან კულვიტისკენ ბეჭოლოთი ხასიათის ტკივილს, თითქოს საშვილოსნო საშროან უნდა გამოიფარდეს. პრობლემები მოულოდნელად და ძლიერად იწყება. ტკივილი ჩნდება მოულოდნელად და ქრება ასევე მოულოდნელად. თავი წითელია, ცხელი, ენა მშრალი და მკვეთრად წითელი.

- ა) სეპია
- ბ) კოლოცინტი
- გ) ნაფრიუმ მურიაფიკუმ
- *დ) ბელადონა
- ე) ბაპტიზია

1536. პაციენტის აწუხებს სპაზმური დისმენორეას. უჩივის ტკივილს მუცილის ქვედა ნაწილში, რაც ჩვეულებრივ მენსტრუაციის პირველ დღეს იწყება და ვრძელდება მენტესის ჩათავებამდე. ყველა მენთალური, ისევე როგორც ფიტიკური სიმპტომი ძლიერდება მენსტრუაციის დროს. შეხებით მგრძნობიარეა გულმკერდის მე-4, მე-5 და მე-8 მაღები.

- ა) ბელადონა
- *ბ) აქტერა რაცემობა
- გ) კოლოცინტი
- დ) კოპა
- ე) ბაპტიზია

1537. პაციენტი უჩივის ქაჩვით შეგრძნებას დაწოლითი ხასიათის ტკივილით საშვილოსნოს არეში. ტკივილი გადაინაცვლებს ერთი ბარბაფებან მეორეში. ყველა მენთალური, ისევე როგორც ფიტიკური სიმპტომი ძლიერდება მენსტრუაციის დროს. შეხებით მგრძნობიარეა გულმკერდის მე-4, მე-5 და მე-8 მაღები.

- ა) ბელადონა
- *ბ) ციმიციფეგბ
- გ) კოლოცინტი
- დ) კოპა
- ე) ბაპტიზია

1538. პაციენტი უჩივის კუნთების ტკივილს საშვილოსნოს პრობლემებთან ასოციაციაში, სპაზმურ დისმენორეას. ყველა მენთალური, ისევე როგორც ფიტიკური სიმპტომი ძლიერდება მენსტრუაციის დროს. შეხებით მგრძნობიარეა გულმკერდის მე-4, მე-5 და მე-8 მაღები.

- ა) ბელადონა
- *ბ) ციმიციფეგბ
- გ) კოლოცინტი

- დ) კოქა
ე) ბაპტიზმი

1539. პაციენტი უჩივის წვითი ხასიათის ტკივილს მარცხენა საკვერცხის არეში. ტკივილი უმჯობესდება ძლიერი ზეწოლითა და სითბოთი, ორად მოხრის შემდეგ.

- *ა) კოლოცინტი
ბ) სეკალე
გ) ალუმინი
დ) ლახებისი
ე) სტაფიბაგრია

1540. პაციენტი უჩივის დისმენორეას უხევი სისხლდენით. დაზიანებული ნაწილების დაბუკებას. კოლიკისმსგავს ტკივილს მუცელში ჭამის შემდეგ. ტკივილი მსუბუქდება ორად მოხრის შემდეგ ან მუცელშე დაწოლისას.

- *ა) კოლოცინტი
ბ) ბაპტიზმი
გ) ალუმინი
დ) ვერატრუმ ალბუმ
ე) კაუსტიკუმი

1541. ქერა პაციენტს აქვს ჰაერის უკმარისობა შეგრძნებით, რომ ფილტებში არ შედის საკმაო რაოდენობის ჰაერი, რადგან ისინი საცეა ლორწოთი, რომლის ამოხველებაც შეუძლებელია; ხორხის სპაზმი; აქვს ხორხში სიცივის შეგრძნება ჰაერის შესუნთქვისას.

- ა) იოდი
ბ) კარბო ვეგეტაბილის
გ) კალკარუმი
*დ) ბრომიტუმი
ე) ლობელია

1542. პაციენტს აწუხებს ყელში გამუღმებული წვა, საყლაპავის ტკივილი მაშინაც კი, როცა არ ყლაპავს; პაციენტი სტაჟიანი მწეველია; აქვს ძლიერი წყურვილი, მაგრამ სითხის მიღების შემდეგ ეწყება კანკალი.

- *ა) კასიკუმ
ბ) ლახების
გ) ლობელია
დ) გელბემინი
ე) არუმ ფრიფილუმ

1543. ბავშვს აქვს სპაზმური ხასიათის ხველა, ხშირი ერთმანეთს მიყოლებული შეტყვებით; თიხოვს ცივ წყალს, რის შემდეგაც ხველა რაღაც დროით უზერდება.

- ა) ფილფორი
ბ) სპონგია
*გ) კუპრუმი
დ) იპეკაკუანა
ე) ჰიოსკიამუსი

1544. ასთენიური პაციენტი უჩივის ხშირ აშლილობას მყრალი სუნით; სწორ ნაწლავში აქვს შეგრძნება, თითქოს პატარა ჩაქუტები ურტყამენო; ანუსის სფინქტერი ძალიან გადიბინებულია; დაუდგინდა საკვერცხების ჩირქოვანი ანთება; მენსტრუალური სისხლი შეგი ფერის, მყრალი სუნით.

- ა) სეპია
ბ) ვერატრუმ ალბუმ
გ) სპონგია
დ) ლაპის ალბუმ
*ე) ლახებისი

1545. ბავშვს აწუხებს მყეფავი ხასიათის ხველა, მოგუდვის შეგვევით ძილის დროს; ნახევლი მცირე; კისერზე ხელის მიკარებისას აღინიშნება მომატებული მგრძნობელობა; მიღრუებილია ცრუ კრუპისადმი.

- ა) ბელადონა
*ბ) სპონგია
გ) იპეკაკუანა
დ) ბრიონია
ე) ჰიოსკიამუსი

1546. პაციენტი მაღალი სიცხით, მენინგეალური სიმპტომატიკით ძილში წამოიყირებს; 1 კვირის წინ მას ჰქონდა გამონაყარი, რომელიც “დათოგუნებს” მაღამოებით; ენა ძალიან მშრალი და მგკივნეული აქვს; ტკივა მთელი პირი; ენის წვერზე და გვერდებზე აქვს პატარა ბუშტუკები; სიმპტომების გაუმჯობესება ცივისგან.

- ა) რესტორანი
- ბ) ბელადონა
- * გ) აპისი
- დ) პირსციამუსი
- ე) ჰეპარ სულფურის

1547. ბავშვს აქვს მოვარდისფრო-მოთეთო გამონაყარი, რომელიც მოგვაგონებს ნაწილურებს; ქავილი აუთანელი, მწველი, მტკიცნეული; აქვს სიცხვის წყურვილის გარეშე; მდგომარეობა უმჯობესდება ცივისაგან.

- ა) რესტორანი
- ბ) სილიცეა
- გ) ფსორინუმი
- * დ) აპისი
- ე) ურანიკა ურენს

1548. ბავშვს აქვს წვრილი ჰერპესული გამონაყარი, რომელიც ალაგ-ალაგ შერწყმულია დიდ წარმონაქმნებად; ძალიან ძლიერი თვლიანობა უსიამოვნო მუკვე სუნით; მგრძნობიარე, მტკიცნეული კანი; ნებისმიერი სახის მცირედი დაძაბვისასაც კი უმაღლეს თვლიანობას; თვლი მუკვე უსიამოვნო სუნით; არ უყვარს სიცივე, ცივი საჭმელ-სასმელი.

- ა) აპისი
- * გ) ჰეპარ სულფურის
- ბ) ბრიონია
- დ) რესტორანი
- ე) დულკამარა

1549. პაციენტს აწესებს ჰერპესული გამონაყარი პირის გარშემო და ნიკაპზე. ენა მშრალი, წითელი, მტკიცნეული, დახეთქილი კბილების ანაბეჭდებით; ძლიერი წყურვილი; სიმშრალე პირში, ყელში, ხახაში.

- ა) აპისი
- ბ) ჰეპარ სულფურის
- * გ) რესტორანი
- დ) ბელადონა
- ე) ბრიონია

1550. პაციენტს ეწყება ფალარათი მანქანების ხმაურისაგან; ტკივდება თავიც; დეფეკაცია ძალიან მტკიცნეულია; ხშირად იძულებულია უკან გადახაროს განი, განავალი კურკლივით.

- * ა) მედორინუმი
- ბ) ბრიონია
- გ) ოპიუმი
- დ) ნატრიუმ მურიატიკუმ
- ე) ალუმინია

1551. მცივანა პაციენტს, რომელსაც ეშინია თონირის, ნებისმიერი ნაკაწრი უჩირქდება; აქვს ქრონიკული სურდო, რომელიც უმძაფრდება ნესტიან ამინდში; ტკივილი შებლის არეში; სურდო წვავს ცხვირს და ნესტოებს, უწყლელებს კანს; აქვს მყრალი ყველის სუნი.

- * ა) მერკურ სოლუბილის
- ბ) ჰეპარ სულფურის
- გ) რესტორანი
- დ) დულკამარა
- ე) ბრიონია

1552. მსუქანი, მოუვლელი, ძალიან მცივანა პაციენტი უჩივის ცხვირის გაჭედვის ძილის დროს, სიცივეში, გამთარში, აღვილად ცივდება, ამიგომ აქვს დია ჰაერის ბიბლი, არ უყვარს ბანაობა, ბევრს ლაპარაკობს; აცემინებს დილით საწოლში, გაღვიძებისას; დაბანის შემდეგ კანი იფარება წითელი ლაქებით; სუნიქვის გაჩერება ჩაძინებისთავე, იძულებულია აღგეს და იაროს.

- ა) ფოსფორი
- ბ) ჰელსატილა
- * გ) ამონიუმ კარბონიკუმ
- დ) იოდი
- ე) სულფური

1553. რომელი პრეპარატი უნდა დაგუნიშნოთ პაციენტს, რომელიც აღვილად ეთანხმება სხვის აბრს მაშინაც კი, როცა შინაგანად არ ეთანხმება მას?

- ა) არნიკა
- ბ) ბრიონია
- * გ) სილიცეა
- დ) აკონიტი
- ე) სტაფიბაგრია

1554. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ცისტიტი, რომელიც იწყება პირველი სექსუალური კონტაქტის ან ყოველი კოიტუსის შემდეგ?

- * ა) სტაფიტაგრია
- ბ) კონიუმი
- გ) ბელადონა
- დ) აკონიტი
- ე) საბინა

1555. რომელ პრეპარატს ახასიათებს შემდეგი: ვერ იტანს სხვა აღამიანების სუნს, მაგრამ მოსწონს საჯუთარი სხვეულის სუნი?

- ა) სილიცეა
- * ბ) სულფური
- გ) აქონიტი
- დ) ბელადონა
- ე) პლატინა

1556. რომელ პრეპარატს ახასიათებს ტერფების წვა, როცა პაციენტი ფქხებს ყოფს საბნიდან ან მოუსვენრად ეძებს ცივ აღგილს გეწარჩე?

- ა) სილიცეა
- * ბ) სულფური
- გ) ლელუმი
- დ) სეკალე
- ე) კონიუმი

1557. სად უნდა ვეძებოთ მიზები, თუ არ ხდება მდგომარეობის გაუმჯობესება კარგად შერჩეული პრეპარატის გამოყენების შემდეგ?

- * ა) პაციენტის ცხოვრების წესში და მის გარემოცვაში
- ბ) მაგერია მედიკაში
- გ) რეპერატორიუმში
- დ) პაციენტის გენიალოგიაში
- ე) მიღებული პომეოპათიური პრეპარატის რაოდენობაში

1558. პაციენტი უჩივის მენორაგიას; მენისტრუაცია არარეგულარულია, საშვილოსნო გადიდებულია და გამკვრივებული; ძლიერი სისქესტე მენინგის დროს, ტკიფილი მარჯვენა საკვერცხის არეში; სხეულის ჯირკვლების უმეტესობა ჰიპერენტოფირებულია, მკრავი და კანძოვანი; პაციენტი სულ მშიერია

- ა) საბინა
- ბ) ფოსფორი
- გ) ბელადონა
- * დ) იოდოციდი
- ე) კაკტუსი

1559. პაციენტს დაუსვეს ქრონიკული ენდომეტრიტის დიაგნოზი; აწესებს დისფუნქციური სისხლდენა საშვილოსნოდან; მენინგი იწყება ნაალრევად და მწირია, მაგრამ გრძელდება დიღხანს; სისხლი მუქი წითელია და არ დედლება; აქვს ცივი წყლის სერვილი; აღნიშნავს ხშირ სისხლდენას ცხვირიდან.

- ა) ჰელსატილა
- * ბ) ფოსფორი
- გ) ლაკ კანინუმ
- დ) ნუქს ვომიკა
- ე) სეპია

1560. პაციენტს აწესებს ძლიერი ტკიფილი საკვერცხეების არეში, რომელიც გაღაეცემა ქვემოთ ბარიაფების შიგნითა მხარეს პირველ ტრიმესტრში. მენინგი იწყება ნაალრევად და მწირია, მაგრამ გრძელდება დიღხანს; სისხლი მუქი წითელია და არ დედლება; პაციენტს ემინია ჭექა-ჭეხილის

- ა) გრაფიტი
- * ბ) ფოსფორი
- გ) სილიცეა
- დ) ბელადონა
- ე) კარცინომინუმი

1561. მეტემურ დედას აწესებს მენორაგია, წვითი ტკიფილი საშვილოსნოს არეში. მენინგი იწყება ნაალრევად და მწირია, მაგრამ გრძელდება დიღხანს; სისხლი მუქი წითელია და არ დედლება; თავს ცედად გრძნობს ჭექა-ჭეხილის დროს.

- ა) გრაფიტი
- * ბ) ფოსფორი
- გ) სილიცეა

დ) კარცინოზინუმ

ე) ნაფრიუმ კარბონიკუმ

1562. პაციენტს აწებებს მენტორაგია ენდომეტრიალური პოლიის გამო; წვა; მენტესი ნაადრევია, ხანგრძლივი, გამონადენი შავია და სუნიანი; ლეიკონური მენტესის წინ; ფირის მუსიკის გაფონებისას; შეუძლია მოშარდვა მხოლოდ მწოლიარე მდგომარეობაში.

ა) გრაფიტი

ბ) ტეია

* გ) კრეომიტი

დ) აპისი

ე) კანგარისი

1563. პაციენტს აწებებს ასთმა; აქვს “ტყვიასავით მმიმე ფეხები”; გაყინული კილურები; კარგად გრძნობს თავს ბლვაზე, ნესტში; ძინავს მუცელზე; აქვს სექსუალური აგზნება

ა) ნაფრიუმ სულფურიკუმ

ბ) კაუსტიკუმ

გ) ნაია

* დ) მედორინუმი

ე) იოდი

1564. პაციენტს აწებებს სუნთქვის გაჩერება როგორც კი ჩაიძინებს; ლოგორება; მოჭერილი და მოტკეცილი ტანსაცემელი აწებებს; შარდის ბუმტში აქვს მოძრავი ბურთის შეგრძნება; წინასწარმეტყველებს.

* ა) ლახებისი

ბ) ფოსფორი

გ) გლონონი

დ) კარბო ვეგეტაბილის

ე) ამონიუმ კარბონიკუმ

1565. პაციენტს აწებებს ქავილი გარეთა სასქესო ორგანოების არეში; წვა და შეშტაპება; ლეიკოლედა ინფექციის გამო. ფირის მესიკის გაგონებისას; შეუძლია მოშარდვა მხოლოდ მწოლიარე მდგომარეობაში.

ა) გრაფიტი

ბ) კაუსტიკუმი

* გ) კრეომიტი

დ) აპისი

ე) ბარიტა კარბონიკა

1566. პაციენტს აწებებს სუნთქვის გაჩერება ძილის დროს; ხშირად მოსდის ცხვირიდან სისხლი როცა იანს სახეს და ხელებს; დამე იძულებულია ისუნთქოს პირით, რადგან ცხვირი ლორწოთი აქვს საქსე; უკეთესად გრძნობს თავს როცა წევს მუცელზე.

ა) კარბო ვეგეტაბილის

ბ) ლახებისი

* გ) ამონიუმ კარბონიკუმ

დ) პულსატილა

ე) მედორინუმ

1567. სერიოზულ, დარღიან, უძილო პაციენტს გონებრივი გადაბაბვის დროს აქვს სიცივის შეგრძნება გულის არეში; მწარე პირი; კარგად გრძნობს თავს მარხვის დროს; ყველა სიმპტომი უმჯობესდება ოფლის მოდენის შემდეგ.

* ა) ნატრიუმ მურიატიკუმ

ბ) აურუმ

გ) ბელადონა

დ) ლახების

ე) აკონიფი

1568. პაციენტს აწებებს პოსტოპერაციული ვაგინიტი; ლეიკოლედა ყვითელია, მწვანე ხორბლის სუნით. ფირის მუსიკის გაგონებისას; შეუძლია მოშარდვა მხოლოდ მწოლიარე მდგომარეობაში.

ა) გრაფიტი

ბ) არგენტუმ ნიტრიკუმი

* გ) კრეომიტი

დ) აპისი

ე) მედორინუმი

1569. პაციენტს აქვს რევმატიზმი ტკივილებით ყველა კიდერში, რომლებიც უარესდება ცივი ჩესტიანი ქარის დროს და მოსვენებულ მდგომარეობაში; არ შეუძლია ძილი თუ ფეხები არ გადააჯვარედინა; ემინია ჭექა-ჭეხილის; მის დროს და წინ აქვს სიმპტომების გაუარესება.

ა) ფოსფორი

* ბ) როდოლენდრონი

- გ) რეს ტოქსი
- დ) აკონიტი
- ე) დულკამარა

1570. პაციენტს აქვს სუიციდური აზრები, რელიგიური მანიით; არ აქვს გადარჩენის იმედი; სიკვდილის შიში, ცედი წინათვარების; ღამე აღვიძებს შიმშილი, რამე უნდა შეჭამოს; ბოყინი ღამე კვერცხის გემოთი; მცივანა.

- ა) ლიკოპოდიუმი
- ბ) სულფური
- გ) პელსაგილა
- დ) აურუმი
- * ე) ფსორინუმი

1571. პაციენტი ძალიან მცივანა; სულ ახურავს ქუდი, ლოგინშიც კი; კანი თითქოს ჭუჭყიანია, სულ იბანს, მაგრამ მაინც უსიამოვნო სუნი ასდის ფანილან.

- ა) სულფური
- * ბ) ფსორინუმ
- გ) ჰეპარ სულფურის
- დ) კარბო ვეგეტაბილის
- ე) კაფსიკუმი

1572. პაციენტი სულ ჩქარობს, სულწასულია; აქვს წინათვარები, ბრამიანია; უყვარს ალკოჰოლი, მევახე ხილი; ჭამს ყინულს; მოუსვენარი ფეხები; ტერფები გაყინულია, მაგრამ ეწვის.

- ა) ცინკუმ მეტალიუმი
- ბ) სულფური
- * გ) მედორინუმი
- დ) ლიკოპოდიუმი
- ე) ფოსფორი

1573. პაციენტს აქვს პოლაგრული წარამარტები ფეხის თითებზე; რევმატიზმი; ტკივილები ნესტიანი ქარისა და ჭექა-ჭეხილის ლროს უმძაფრდება; არ შეუძლია ძილი, თუ ფეხები არ გადაჯვარედინა.

- * ა) როდოლენდრონი
- ბ) ფოსფორი
- გ) ბორაქსი
- დ) რეს ტოქსი
- ე) დულკამარა

1574. პაციენტს აწუხებს უხვი ხანგრძლივი სისხლდენბი საშვილოსნოდან წვითი ტკივილით; სუნიანი ლეიკორება წინ უძღვის სისხლდენბის; თაგა უკეთ გრძნობს თბილ თოახში; პაციენტი აგზებულია და ადვილად დიტიანდება; ეშინია სიკვდილის, მარტო დარჩენის; აქვს აუტანელი წყურეფილი, სეპას მცირე რაოდენობით ცივ წყალს მოკლე ინტენციულებში.

- ა) სეპია
- ბ) კალკარეა ფლუორიკა
- გ) აბროგანუმი
- დ) აკონიტი
- * ე) არსენიკუმ ალბუმ

1575. პაციენტს აქვს შეგრძნება, რომ მუცელში რაღაც ცოცხალი მოძრაობს, თითქოს ნაყოფის ხელიათ შიგ; აქვს ფალარათი ყავის, ცხიმიანის და ხახვისგან.

- ა) სულფური
- ბ) სფაფიბაგრია
- * გ) ტუია
- დ) ნექს მოშაგა
- ე) ალოე

1576. მამაკაცის აქვს ძლიერი თფლიანობა ძილში; თფლიანობა წყლება გადეიძებისთანავე; სასქესო თრგანოებზე თფლს აქვს თაფლის სუნი.

- * ა) ტუია
- ბ) სილიცეა
- გ) კალკარეა კარბონიკა
- დ) კამფორა
- ე) ლიკოპოდიუმი

1577. პაციენტს, რომელსაც გადატანილი აქვს ჰინორეა აწუხებს მჭრელი ტკივილი ურეთრაში შარდვის ბოლოს; სასქესო თრგანოებზე აქვს თფლი თაფლის სუნით.

- ა) მედორინუმი

- ბ) სულფური
- გ) კანგარისი
- დ) კონიუმი
- *ე) ტუია

1578. ასთენიურ პაციენტს აწუხებს დამასცესტებელი დამის ოფლიანტბა, რომელიც წყლება გაღვიძებისთანავე; უოფლიანტბა სხეულის მხოლოდ ის ნაწილები, რომლებიც დაფარული აქვს; ოფლს შეავე სუნი აქვს.

- *ა) ტუია
- ბ) სილიცეა
- გ) კალკარეა კარბონიკა
- დ) მედორინუმი
- ე) ლიკოპოდიუმი

1579. პაციენტს აქვს შეგრძნება, რომ რაღაც ცოცხალი მოძრაობს მუცელში, თითქოს ნაყოფი ხელს ურგეამსო; მენსტრუაციის ნაცვლად აქვს ლეიკორეა.

- ა) ტუია
- ბ) სულფური
- *გ) ნუქს მოშატა
- დ) კარბო ვეგეტაბილის
- ე) ვერატრუმ ალბუმ

1580. ბავიან მოწესრიგებულ პაციენტს აწუხებს საშოს სიმშრალე და ქავილი; მშრალი გამონაფარი კანზე ეწვის როგორც ცეცხლში. თავს უკეთ გრძნობს თბილ ოთახში; პაციენტი აგზნებულია და აღვილად დიზიანტბა; ეშინია სიკვდილის, მარცო დარჩენის; ბალიან ბრუნავს თავის ჯანმრთელობაშე, სულ დადის ექიმებში.

- ა) აპისი
- ბ) კალკარეა ფლუორიკა
- გ) ბელადონა
- დ) აკონიჭი
- *ე) არსენიკუმ ალბუმ

1581. ბავშვს, რომელიც არის ბალიან ჭირვეული, სულ ტირის, წყნარდება მხოლოდ თუ კალთაში ჩაისვამენ და ეფერებიან, აქვს ფალარათი დამე წყალწყალა მომწვანო-მოყვითალი მასებით; ფალარათი ეწყება ასევე ნაყინისგან ან ცივი წყლისაგან.

- ა) ქინა
- ბ) ვერატრუმ ალბუმ
- გ) არსენიკუმ ალბუმ
- დ) ბრიონია
- *ე) პულსატილა

1582. პაციენტს აწუხებს ყაბბობა; განავალი ჭინთვის შედეგად ნაწილობრივ გამოდის ანუსიდან და უმაღ ისევ უკან ბრუნდება; მუცელში აქვს შეგრძნება, თითქოს რაღაც ცოცხალი მოძრაობს.

- *ა) ტუია
- ბ) სილიცეა
- გ) სანიკელა
- დ) ნუქს მოშატა
- ე) სულფური

1583. ისტერიულ ქალს ეჩვენება, რომ ორსულადაა, რაღაც მუცელში აქვს შეგრძნება, რომ ნაყოფი ურგეამს, თუმცა იცის, რომ ეს გამორიცხულია; საშვილოსნო სავსე აქვს გაბებით; ენა ისეთი მშრალი აქვს, რომ ეწეპება სასაზე; წყურვილი არ აქვს.

- ა) პულსატილა
- *ბ) ნუქს მოშატა
- გ) ტუია
- დ) ლახებისი
- ე) ბრიონია

1584. პაციენტს ემლება მუცელი ორსულობის მესამე თვეზე; აქვს თაგვების შიში - ეზვენება, რომ ისინი მაგიდის ქვეშ დარბიან.

- ა) საბინა
- *ბ) აქტება რაცემობა
- გ) სეპია
- დ) ლახებისი
- ე) ეტება

1585. პაციენტი უჩივის უძილობის, დაქავშირებულს პოტენციის დაქვეითებასთან, რაც მისთვის კატასტროფაა, რაღაც სურვილი ძლიერი აქვს, ხოლო ერექცია ძალიან სუსტი; გენიტალიუმი ცივი, მოღენებული; ქამარს ვერ გუობს.

- ა) სეპია

- ბ) აგნუს კასტეს
- * გ) ლიკოპილიუმი
- დ) პულსატილა
- ე) მედორინუმი

1586. პაციენტს დასმული აქვს საშვილოსნოს ყელის ერთზის დიაგნოზი; უჩივის უხვ მენორაფის, ლეიკორეას და სასტიკ წვას. თავს უკეთ გრძნობს თბილ ოთახში; ეშინია სიკვდილის, მარტო დარჩენის; დამე მარტო დარჩენისას ეწყება შფოთვა, ვერ ინელებს ნაყინს.

- ა) ბრიონია
- ბ) კალკარეა ფლუორიკა
- გ) აბროგანუმი
- დ) პულსატილა
- * ე) არსენიკუმ ალბუმ

1587. მეძუმურ დედას უცებ შეუწყდა ლაქტაცია; საშოლან გამოიყოფა გაზები; აქვს თაგვების აკვიატებული შიში, ეჩვენება, რომ ისინი მაგიდის ქვეშ დარბიან; აქვს ყელის ტკიფილი განსაკუთრებით ყლაპვისას.

- ა) ბრომი
- ბ) ლიკოპილიუმი
- * გ) ლაკ კანინუმი
- დ) სანგვინბარია
- ე) ლახებისი

1588. გულმავიწყ პაციენტს აქვს არეული დროის შეგრძნება; მისთვის დროს ძალიან იწულება; დაწყებულ ამრს ვერ ამთავრებს, რაღაც ამრი ეფანტება; ერთდროულად რამდენიმე ამრი უფრიალებს თავში; აქვს მოახლოებული სიკვდილის შეგრძნება.

- * ა) ოპიუმი
- ბ) ნუქს ვომიკა
- გ) სტრამონიუმი
- დ) მეტერეუმ
- ე) სეპია

1589. მეძუმურ დედას, რომელმაც დაკარგა რძე, სულ ეჩვენება, “სელედვის” სუნი; არის სევდიანი, გონია, რომ მაღვ მოკვდება.

- ა) ლაკ კანინუმ
- * ბ) აგნუს კასტი
- გ) აქონია
- დ) ოპიუმი
- ე) აურუმი

1591. პაციენტს აქვს აპათია სექსუალური ფუნქციის დაკარგვის გამო; არ აქვს ერექცია, არც სურვილი, გადატანილი აქვს გონიოება; სასქესო თრგანოები ციფი, მოლუნებული.

- ა) ლიკოპილიუმი
- ბ) მედორინუმი
- * გ) აგნუს კასტი
- დ) სილიცეა
- ე) კონიუმი

1592. პაციენტი უჩივის სუნიან, მწველ, მაღამოს მსგავს ლეიკორეას მენტესის წინ; მენტესის დროს გამოიყოფა მუქი, შედედებული სისხლი; ბურგის ტკიფილი; პაციენტს ნახეთქი აქვს ქვედა ტუბის შუაში; აღვილად ტირის, აღვილად წენარდება. .

- ა) სელენიუმი
- * ბ) პულსატილა
- გ) სეპია
- დ) პლატინა
- ე) ლახებისი

1593. ისტერიულ ქალს აქვს ცრუ თრსულობა; მენსტრუაციის დროს სისხლის ნაცვლად აქვს ლეიკორეა /უავე თრი წელია/, ახლადახასს კი დაეწყო შეგრძნება, რომ მუცელში რაღაც ცოცხალია, თითქოს ნაყოფი ურთყამს; საშვილოსნო მკვრივი, გადიდებულია, საცსე გაზებით; ამიტომ ეჩვენება, რომ მუცელი გაემარდა.

- ა) სტრამონიუმი
- ბ) სელფური
- გ) ტუიბ
- * დ) ნუქს მოშატა
- ე) პულსატილა

1594. პაციენტს აქვს თაგვების აკვიატებული შიში; ეჩვენება, რომ ისინი მაგიდის ქვეშ დარბიან; ნერვიულობის ან განცდის დროს მენსტრუაცია ითრგუნება; აწუხებს საკვერცხეები.

- * ა) აქტები რაცემობა
- ბ) ლახებისი
- გ) ეტუტა
- დ) სეპია
- ე) სელენიუმი

1595. პაციენტს აქვს ძლიერი ნოსტალგია; აწუხებს ყელის ისეთი ტკიფილები, თითქოს წიწაკით დაეწვა; უმძაფრდება ყლაპვისას; ხველისას აქვს ტკიფილი სხვადასხვა აღვილებში: ყურებში, მუხლებში, შარლის ბუშტში.

- ა) მერკურ სოლებილისი
- ბ) კრეოზოფუმი
- გ) აპისი
- * დ) კაფსიუმი
- ე) ბელადონა

1596. შარიან მობარდს აქვს სუიციდური ამონები, ხშირად ფიქრობს სიკვდილზე; თვლის რომ ელაპარაკება ღმერთს; დეპრესია

- ა) ანაკარდიუმი
- * ბ) აურუმ მეტალიკები
- გ) ნუქს ვომიკა
- დ) სეპია
- ე) ჟელსაზილა

1597. მობარდ ბიჭს აქვს პიროვნების გაორება; ეჩვენება, რომ ვიდაც აიძულებს ჩაიდინოს ცუდი საქციელი; უხეშობს, ჩხუბობს, იწყევლება, ხმარობს უწმაწურ სიყვებს.

- ა) ხამომილა
- ბ) ლიკოპოდიუმი
- გ) მერკურ სოლებილის
- * დ) ანაკარდიუმ თრიენტალე
- ე) ნუქს ვომიკა

1598. პაციენტს, რომელსაც გადაფანილი აქვს სიფილისი, აწუხებს ოფორეა; სისხლდენა ხველისას, განსაკუთრებით დამის ძილისას; ნესტოფები კიდია სქელი, შედელებული სისხლის ძაფები; უყვარს იარაღი, სროლა.

- ა) მედორინუმი
- * ბ) მერკურ სოლებილის
- გ) სიფილინუმი
- დ) ფოსფორი
- ე) სელფური

1599. პაციენტი უჩივის ამენორეას ფეხების დასველების შემდეგ. პაციენტს ნახეთქი აქვს ქვედა ტუჩის შუაში; სევდიანია, ბგირალა, უყვარს დაწერანუმა.

- ა) აქტება რაცემობა
- * ბ) ჰელსაზილა
- გ) ნუქს მოშატა
- დ) პლატინა
- ე) ლილიუმ ტიგრინუმი

1600. პაციენტი უჩივის სუნიან, წვით დეიკორეას; დასმული აქვს ენდომეტრიტის დიაგნოზი; მჭრელი ტკიფილები მუცილის არეში დეფეკციის მოთხოვნით. პაციენტს ნახეთქი აქვს ქვედა ტუჩის შუაში; იოლად ტირის.

- ა) ლიკოპოდიუმი
- * ბ) ჰელსაზილა
- გ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ
- დ) პლატინა
- ე) კოლოცინგი

1601. ახალგაზრდა მემუტურ ქალს მოულოდნელად გაუქრა რძე; სარძეები ჯირებელები შეშუპებულია და გამაგრებული; სპამშური ტკიფილი მუცილის არეში. აქვს ფალარათი ხილის, ნაყინის და ციფი სასმელისაგან.

- ა) ბელადონა
- * ბ) ჰელსაზილა
- გ) სეპია
- დ) პლატინა
- ე) თპიუმი

1602. პაციენტს აწუხებს მუდშივი სიცივის შეგრძნება მუხლებსა და ფეხებში. აქვს ქვემო კიდერების ვენების გაგანიერება. აწუხებს ბესილი; კუჭნაწლადაში დიდი რაოდებით გაბები, თითქოს ეხლა გასკდებათ. უყვარს ჯდომისას ფეხების შემოწყობა მაგიდაზე; დამე ელვიძება კიდერების სიცივისაგან.

- ა) ფსორინუმ
- ბ) სილიცეა
- * გ) კარბო ვეგეტაბილის
- დ) კაუსტიკუმ
- ე) ცინა

1603. პაციენტს აწებებს ძლიერი ტკიფილები კუჭში, რომელიც გასდის ჭამის შემდეგ; ეზიზდება ცხიმიანი საკვები და ხორცი; მქავე კომბოსტო იწვევს ფალარათს; აქვს ხშირი თაგბრუსხვევა, რომელიც ძლიერდება ზემოთ ახელვისას.

- * ა) პეტროლუმ
- ბ) კოქულუს
- გ) არნიკა
- დ) სანგვინარია
- ე) ანაკარლიუმ

1604. პაციენტს აწებებს თავის ტკიფილები თითქოს ჩაქერი ურტყავს, გონია რომ თავი გაუსკლება, პულსციით; განსაკუთრებით ძლიერდება ნაშავადამევს; სახე უწითლდება, ტერფები უციფლება; იძულებულია დაწვეს; ეზიზდება საჭმელიც და სასმელიც; ჩვეულებრივ პაციენტი ძალიან ფერმკრთალია.

- ა) სანგვინარია
- ბ) ბელადონა
- გ) ჰელსაფილა
- * დ) ფერუმ მეტალიკუმ
- ე) ცინა

1605. პაციენტი უჩივის ძლიერ თავგბრუსხვევას თითქოს არხევსო, რომელიც ეწყება სიმაღლიდან ქვემოთ დაშვებისას ან ხილები გადასცლისას; პაციენტი უფერულია, განსაკუთრებით ფერმკრთალი აქვს ტუჩები, სკლერუბი და სახე, მაგრამ ოდნავი აღელვების ან დაძაბისაგან უმაღლეს უწითლდება.

- ა) ცინა
- * ბ) ფერუმ მეტალიკუმ
- გ) კარბო ვეგეტაბილის
- დ) კამფორა
- ე) ჰელებორუს

1606. პაციენტი უჩივის ტკიფილებს სახის ნერვის არეში; აქვს ნევრალგია; ტკიფილის შემსუბუქების მიზნით პაციენტი დგება გეხლებზე და შებლს მიაბჯენს იაგაკს.

- * ა) სანგვინარია
- ბ) ცინკუმ მეტალიკუმ
- გ) ლაბეგის
- დ) არსენიკუმ ალბუმ
- ე) სტიქტა ალბუმ

1607. პაციენტს აწებებს ძლიერი ტკიფილები მარჯვენა დელტოიდურ კუნთში და მარჯვენა ხელში; არ შეუძლია ხელის აწევა, განსაკუთრებით ძლიერდება ტკიფილები დამე.

- ა) ფერუმ მეტალიკუმ
- * ბ) სანგვინარია
- გ) კალი ფისფორიკუმ
- დ) ფოსფორი
- ე) ეუფრაზია

1608. კლიმაქტიული ასაკის ქალბატონს აწებებს ალები, წვა ხელის და ფეხის გულებში; დამე იხდის საბანს; მკერდი გადიდებული და მტკიფნეულია; ლოფებზე წითელი ლაქები აქვს.

- * ა) სანგვინარია
- ბ) ჰელსაფილა
- გ) არსენიკუმ ალბუმ
- დ) ლაკოპორიუმი
- ე) სეპია

1609. ბავშვი, რომელიც არის ბრაზიანი, ჯიუტი, დაუმორჩილებელი. ყვირის, ირგუმევინუბა, არავის არ იკარებს; დამე ბალიში უსველდება ოფლისაგან, აწებებს ფალარათ; განავალი ქაფიანია, გავს ათქვეფილ კვერცხის ცილას, ბალანისფერი; დფომის შედეგად მწვანდება, ემსგავსება ხიბილალას.

- ა) ბუფო რბნა
- ბ) პოლოფილუმი
- * გ) სანიკელა
- დ) სარსაპარილა
- ე) ვერატრუმ ალბუმ

1610. ბავშვს აქვს მოხუცის სახე, დიდი ზუკელი, მშრალი კანი; ახასიათებს წამოყვირება მოშარდვამდე და მოშარდვის მერვ.

- ა) ამონიუმ კარბონიკუმ
- ბ) კაუსტიკუმ
- გ) კანგარის
- *დ) სარსაპარილა
- ე) ტუა

1611. პაციენტს სულ ეძინება; ცხელ ამინდში უცებ მოწყვეტა იცის; ძალიან ეშინია თრპირის, წებისმიერ ამინდში; სისუსტის შეგრძნება ხერხემალში; ხშირად ლოთობს, იმპოფენიდა სურვილის შენარჩუნებით.

- *ა) სელენიუმ
- ბ) ლიკოპოდიუმი
- გ) ტუა
- დ) მედორინუმი
- ე) კალკარეა კარბონიკა

1612. პაციენტს აქვს მგლეჯავი ტკიფილები სწორ ნაწლავში დეფეკაციის შემდეგ, რომელიც 2-3 საათი გრძელდება, შეგრძნებით, თითქოს ნაწლავი და ანუსი სკლება და იგლიჯება; სწორი ნაწლავის ნახეთქება, სისხლლენები ფიზიკური დაბაძვის მერვ;

მოშარდვისას აქვს სიცივის შეგრძნება საშარლე გბებში, ცხენის შარდის სუნით.

- ა) ალუმინი
- ბ) ამონიუმ მურიატიკუმ
- გ) პოლოფილუმ
- *დ) აცილუმ ნიფრიკუმ
- ე) კროტონ ტიგლიუმ

1613. მეძუძურ დედას აქვს ტკიფილები მკერდში იმ მხარეს, რომელსაც აწოვებს, ირალიაციით ბეჭჭი; როგორც კი თავს დებს ბალიშებე, ეწყება ხევლა დახრმატის გრძნობით, იძულებულია აღგეს და იაროს, იძინოს საფარმელში.

- ა) ფოსფორი
- *ბ) კროტონ ტიგლიუმ
- გ) პულსაცილა
- დ) დრობერა
- ე) დიოსკორეა

1614. სუსტი, დაუძლეურებული, ფერმკრთალი ბავშვი არ იღებს რძეს, მაშინვე აღებინებს უკან; ეწყება ტკიფილები; მოვლითი ხასათის ტკიფილები მუკელში; განაგალი მქავე სუნით, მწვანე/ბალახისფერი/ რძის ჩანართებით, პირში აქვს წყლულები; ბავშვს უდის მქავე სუნი.

- ა) ბუფო რანბა
- ბ) ქინა
- გ) კინბო ვეგეტაბილის
- დ) ბარიტ კარბონიკა
- *ე) მაგნებია კარბონიკა

1615. ბავშვი არის მოდუნებული, სუსტი, დატანჯული სახე აქვს; აწებებს სპაზური მშრალი ხველა, განსაკუთრებით დამჟ; არ შეუძლია წოლა; ხევლა დაეწყო ცივ აუგში ფეხების დასველების შემდეგ.

- *ა) მაგნებია ფოსფორიკა
- ბ) კარცინომინუმ
- გ) ჰეპარ სულფურის
- დ) ბრიონიდა
- ე) კორალიუმ რუბრუმ

1616. პაციენტს ეშინია ოთახში მარგო დარჩენის, თვალების დახუჭვის, რაღაც ხედავს საგნებს, როგორც კი თვალებს გაახელს, ისინი ქრებან.

- ა) სტრამონიუმი
- *ბ) კალკარეა კარბონიკა
- გ) ვალერიანა
- დ) კოკა
- ე) ჰიოსციამუსი

1617. პაციენტს აქვს თავის ტკიფილები, თითქოს თავის მარჯვენა მხარეში ლურსმანს უჭედებენ; უარესდება ორპირი ქარისგან, სიცივებე, ცივი საჭმელ-სასმელისგან, შეხებისგან მტკივან აღგილტე.

- ა) იგნაცია
- ბ) ტუა
- გ) ბელადონა
- *დ) ჰეპარ სულფურის

ე) ოპიტი

1618. წერვიული, მგრძნობიარე ქალი უჩივის იშიაშს; აქვს შეგრძნება, თითქოს ყელში ძაფი აქვს ჩაკიდებული.

ა) იგნაცია

ბ) ლაბების

*გ) ვალერიანა

დ) ბრომიუბ

ე) ლილიუმ ტიგრინუბ

1619. პაციენტს აქეხებს ძლიერი თფლიანობა ძილის ღროს; გაღვიძებისას წყდება; უთფლიანდება სხეულის მხოლოდ ის ნაწილები, რომლებიც არ არის დაფარული; თფლს მუკვე სუნი აქვს.

ა) სილიცეა

ბ) ბელადონა

გ) კალკარეა კარბონიკა

*დ) ჰეპარ სულფურის

ე) კამფორა

1620. პაციენტი გულგრილია ყველაფრის მიმართ, ხშირად ტირის; ადარდებს თავისი ჯანმრთელობა; ფიქრობს, რომ ავად არის განუკურნებელი სენით; მენსტრუალური სისხლი მუქი, უსიამოვნო სუნით, მცირე რაოდენობით; მოლის მხოლოდ მოძრაობის დროს; მოძრაობის შეწყვეტისას კი ჩერდება

*ა) ლილიუმ ტიგრინუბ

ბ) სეპია

გ) სპონგია

დ) სენეციო

ე) ლაბების

1621. პაციენტს აქვს სურვილი იჩეუბოს, იწყებოს, აწეუბებს შეგრძნება, თითქოს საშვილოსნო და მცირე მენჯის შიგთავსი ლამობს გამოვარდნას; სულ რაღაც უნდა აკეთოს, რომ დათრგუნთს მოჭარბებული სექსუალურობა.

ა) სეპია

ბ) მურექს

*გ) ლილიუმ ტიგრინუბ

დ) ლაკ კანინუბ

ე) ლაბების

1622. პაციენტს აქვს შიმშილის შეგრძნება, რომელიც არ გადის ჭამის მერეც კი; კუჭში აქვს სიცარიელისა და სისუსტის შეგრძნება; დაბეჭელია; გულმავიწყის; ნაყიდ ნივთებს ტოვებს მაღაზიაში; უჭირს კონცენტრირება; სწავლა, კითხვა; ეშინია კიბიდან ჩამოვარდნის; ვერ ხელავს ცხოვრების აბრს, კითხვისას ტოვებს სიგყის ბოლო ასოებს.

*ა) ლაკ კანინუბ

ბ) ბორაქსია

გ) ანაკარდიუბ

დ) ნაფრიუმ მურიატიკუმ

ე) გრაფიტი

1623. პაციენტი ვერ ხელავს ცხოვრების აბრს; ყელის ანთება და ხველა ეწყება მენსტრუაციის დაწყებისას და მთავრდება უმაღ მისი დამთავრებისთანავე; საშობან გამოვყოფა გაბები

ა) სეპია

ბ) ლილიუმ ტიგრინუბ

*გ) ლაკ კანინუბ

დ) პლატინა

ე) ნუქს ვომიკა

1624. პაციენტს აწეუბს მზებე ყოფნით გამოწვეული თავის ტყივილები; ვარესდება მუსიკისგან, გონების გადაძაბვისგან; ეჩვენება, რომ თავი ძალიან დიდი აქვს; რძისგან ემლება კუჭი, აღგბნება ჭექა-ჭეხილის ღროს.

ა) საბალილა

ბ) ლაბების

გ) ფოსფორი

*დ) ნაფრიუმ კარბონიკუმ

ე) სანგვინარია

1625. პაციენტს აქვს შეგრძნება, რომ მცირე მენჯის შიგთავსი გამოუვარდება; უმჯობესდება მოძრაობისას, უმძაფრდება ჯდომისას; ცუდად ხდება მზისგან, სიცხისგან, ჭექა-ჭეხილის ღროს; ცხვირილის გამონალენი უჩერდება ჭამის შემდეგ

ა) სეპია

ბ) აგარიკუს

გ) ლილიუმ ტიგრინუბ

დ) ლახების

* გ) ნატრიუმ კარბონიკუმ

1626. პაციენტს სურვილი აქვს თავი მოიკლას იარაღით; ვერ იტანს სიცოცხლეს, მხიარული მუსიკა იწვევს სევდას, მენსტრუაციის ლრის აქვს სისხლდენა ცხვირიდან.

ა) ჰელსატილა

* ბ) ნატრიუმ სულფურიკუმ

გ) ბრიონია

დ) აურუმ

ე) ნუქს ვომიკა

1627. ბავშვი იღვიძებს ყვირილით და ებლაჟებება ლოგინის კიდეებს; აშინებს ნებისმიერი ხმაური; ტირის, როცა აწვენენ ლოგინში, უნდა ხელში ძილი; პირში აქვს რძიანა, სდის ნერწყვი.

ა) სარსაპარილა

* ბ) ბორაქსი

გ) სანიკულა

დ) ქინა

ე) ლიკოპოდიუმი

1628. მოჩარლი, რომელსაც ებმება ენა, ვერ იტანს ქამარს წელზე; აქვს სქელი გამონადენი ცხვირიდან; იღლიებში თფლიანობს; ოფლს ხახვის სუნი აქვს.

ა) კალი ბიქრომი

ბ) ლიკოპოდიუმი

* გ) ბოვისფი

დ) ჰელსატილა

ე) ლახებისი

1629. პაციენტს აწუხებს მონაცელეობით ხან თავის ტკიფილი, ხან ლუმბაგო; თავის ტკიფილს აძლიერებს ნებისმიერი ნაბიჯი, ეწყება დეფეკაციის შემდეგ.

* ა) ალოე

ბ) ლიკოპოდიუმი

გ) ჰელსატილა

დ) პოდოფილუმი

ე) ალიუმ ცეპა

1630. ფალარათი პაციენტს აღვიძებს დილით; ეწყება ჭამის ან დალევის შემდეგ; მჭრელი, მოვლითი ხასიათის ტკიფილი მუცლის ქვედა ნაწილში მარჯვნივ; განსაკუთრებით დეფეკაციის წინ და დროს.

ა) ბაპტიზია

* ბ) ალოე

გ) ირისი

დ) კოლოცინტი

ე) კარბო ვეგეფაბილის

1631. ნერვული, მოქსვენარი პაციენტი ვერ იტანს ქაღალდის შრაშენს, ქსოვილის შრიალს; ვერ იტანს ქარს და მზის სინათლეს.

* ა) აგარუმ

ბ) სანგვინარია

გ) სტრამონიუმი

დ) პოდოფილუმი

ე) ცინკუმ მეტალიკუმი

1632. პაციენტი არის ფერმკრთალი, სანთლისებური, ცხიმიანი კანით; ნებისმიერ საჭმელს აქვს ტკბილი გემო.

ა) სტანუმი

ბ) სოლანიუმ ნიგრა

გ) ცინკუმ მეტალიკუმი

* დ) პლუმბუმ

ე) ეტება

1633. პაციენტს აქვს მუდმივი გულისრევის შეგრძნება, რომელიც გასდის ჭამის შემდეგ; აქვს ალკოჰოლის ძლიერი სურვილი.

ა) რემეს კრიპტუს

ბ) იპეკაკუანა

* გ) ასტერიას რებენს

დ) სელენიუმი

ე) რეჟმ

1634. ბაეშვის, რომელსაც ამოსლის კბილები, დაეწყო კრუნჩხები; დამე შემინებულს ეღვიძება ყვირილით, სიცხე არ აქვს; ძილში კრთის, ფეხის ტერფები თფლიანია, სულ ამოძრავებს, ლოგინშიც კი.

- ა) ბელადონა
- ბ) ხამომილა
- გ) კუპრუმ მეტალიკუმ
- დ) ჰიოციამუსი
- *ე) ცინკუმ მეტალიკუმი

1635. ნერვულ პაციენტს აღენიშნება მგლის მაღა დილით 11-12 სთ-ბე. ტკივილები აქვს ზურგში, განსაკუთრებით ჯდომისას; უმსუბუქდება სიარულის დროს; აქვს წვის შეგრძება ხერხემლის გასწვრივ.

- *ა) ცინკუმ მეტალიკუმ
- ბ) რუს ტოქსი
- გ) გელბემინი
- დ) სულფური
- ე) არსენიკუმ ალბუმი

1636. ბაეშვის, რომელსაც ჰქონდა გამონაყარი მთელ ტანჩე, მისი მორჩენის მერე დაეწყო ძილში კრთომები, აგზნება, განვითარდა ქორეა; ძილში კბილებს აქრაჭუნებს, კრთის; სიცხე არ აქვს, სახე ხან ფერმურთალი აქვს, ხან უწითლდება.

- *ა) ცინკუმ მეტალიკუმ
- ბ) სულფური
- გ) აპისი
- დ) ფსორინუმი
- ე) გელბემინი

1637. პაციენტი ნაღვდიანია; სულ ამთქნარებს და იმმორება; ძალიან მცივანაა; აწებებს ძლიერი ყაბბობა, რამდენიმე დღე ვერ გადის კუჭში, განავალი თხის კურკლს გაეს; მუდმივად აწებებს უკანა ტანის ნახეთქები.

- ა) ალუმინია
- ბ) ფსორინუმ
- *გ) გრაფიტი
- დ) სეპია
- ე) რანუნკულუს ბულბოტუს

1638. პაციენტს, რომელიც ეწევა “ბოპემურ ცხოვრებას”, უჭირს საჭმლის მონელება; აქვს ძლიერი წვა კუჭში, რომელიც გადაეცემა ზურგში, კუჭის და ნაწლავების ძლიერი შებერილობა, ხშირი ბოყინით, რომელიც დროებით შვებას აძლევს; შებერილობის ფონზე ხშირად ეწყება ქოშინი; ნაყრლება მცირე საკებით.

- ა) ლიკოპონიუმი
- ბ) ალუმინია
- გ) ბრიონია
- *დ) კარბო ვეგეტაბილის
- ე) პოლოფილუმი

1639. ქრონიკული რინიფის გამო მოსულ პაციენტს აქვს წყალწყალა გამონადენი, რომელიც “წვაფს” კანს; სურდო კლებულობს თბილ თოახში შესვლისას და ძლიერდება მაშინვე, როცა პაციენტი გადის სიცივეში.

- *ა) არსენიკუმ ალბუმ
- ბ) ჰეპარ სულფურის
- გ) ნექს ვომიკა
- დ) ფსორინუმ
- ე) რანუნკულუს ბულბოტუს

1640. მომართვის მიზებია სურდო, რომელიც პაციენტს დაეწყო ნესფიან ამინდში; აქვს ცემინება, ცხვირის დახშობის შეგრძნება და სიმშრალე; გამონადენი მცირება; მდგომარეობა უარესდება თბილ თოახში და უძრობესდება ჰაერზე გასვლისას.

- ა) სულფური
- ბ) იპეკაკუანა
- გ) არსენიკუმ ალბუმ
- *დ) ნექს ვომიკა
- ე) მერკურ კორობივეს

1641. ბავშვი ვერ იტანს მიკარებას; ძილში ყვირის და იღვიძების შემინებული, კრთის, იმეორებს ყველაფერს, რასაც ეუბნებიან; ჭამს ნელა, დამინებაში ხელს უშლის ფეხის ტერფების გამუდმებული მოძრაობა.

- *ა) ცინკუმ მეტალიკუმ
- ბ) ხამომილა
- გ) ბელადონა
- დ) ჰიოციამუსი
- ე) სტრამონიუმ

1642. პაციენტი უჩივის სისუსტის შეგრძნების და ტკივილებს კუჭის არეში, მუავე ბოყინს, იტულებულია ჭამოს; ტკივილების დროს უჩნდება კუჭში გასვლის სერვილი, რომელიც გასდის ტუალეტში შესვლისთანავე; სწორ ნაწლავში აქვს საცობის შეგრძნება.

ა) ბრიონია

ბ) ჟელსატილა

*გ) ანაკარდუებ

დ) ალემინა

ე) ოპიუმ

1643. პაციენტს აწუხებს ფალარათი დილათით; განავალი წყალწყალა ყვითელი; მოღის როგორც თნკანიდან, უმტკიფნეულო, ფალარათი იწყება გულისრევის შეგრძნებით, რომელიც ზოგჯერ დებინებით მთაცრდება; ფალარათის შემდეგ აქვს სისუსტის შეგრძნება მუცელსა და სწორ ნაწლავში.

*ა) პოლოფილუმი

ბ) სელფური

გ) კალი ბიქრომი

დ) იოდი

ე) ვერატრუმ ალბუმ

1644. პაციენტს აქვს საჭმლის გიბდი, მასზე ფიქრიც კი არ შეუძლია, ენა ყავისფერია; თუ გრძნობს საჭმლის სუნს როცა ის კეთვება, გულისწავლამდეც კი მიღის.

ა) ბრიონია

ბ) ვერატრუმ ალბუმ

*გ) კოლხიკუებ

დ) ნექს მოშაგა

ე) ნექს ვომიკა

1645. პაციენტს აქვს ძალიან მგრძნობიარე პოლაგრული კვანძები სიწითლით; ტკივილები ძლიერდება საღამოს და მოძრაობისგან, აგრეთვე უჩივის ჭრით ტკივილებს გულის არეში და გულმკერდში მოჭერის შეგრძნებას; ვერ იტანს ნებისმიერ დაბაგას, მათ შორის გონებრივისაც.

ა) ამონიუმ კარბონიკუმ

ბ) ანტიმონიუმ ტარტარიკუმ

გ) რუს ტოქსი

*დ) კოლხიკუმი

ე) ლულკამარა

1646. პაციენტი დიდი დროის განმავლობაში იღებდა კუჭში გამხსნელ წამლებს; აქვს ეპიგასტრიუმის არეში სისუსტისა და სიცარიელის შეგრძნება; ღვიძლის არე ძალიან მგრძნობიარეა, განავალი სუსტად შეფერილი, გულისრევა, მუავე ბოყინი, კუჭში შეგრძნება, თითქოს “ჩაკიდულია”; კანი ყვითელი, სულ უნდა წოლა, ამთქნარებს, იშმორება.

ა) ჟელსატილა

*ბ) ჰილრასტის

გ) ჰერი

დ) იპეკაკუანა

ე) კარბო ვეგეტაბილის

1647. პაციენტს თავის ტკივილი ეწყება კეფიდან, გაივლის მთელ თავს და კონცენტრირდება მარჯვენა თვალი ბუდის ზევით; ვერ იტანს შუქს და ხმაურს, ჭირდება სრული სიმშევიდე, სიბერელე, წოლა; თავს რგავს ბალიშმი, უმჯობესდება მოჭერით, აღებინებს და ამოაქს კუჭის მთელი შიგთავსი. ხშირად თან ახლავს გასტრალგია.

ა) იგნაცია

ბ) იპეკაკუანა

გ) ირის

*დ) სანგვინარია

ე) კოკულეს

1648. პაციენტს აწუხებს მუცელის ძლიერი შებერილობა, ბოყინი გაზებით, ლაყე კვერცხის სუნით; მურალი განავალით; ჭამის მერე სისუსტე, თავის ტკივილი, სიცხის აქვს ცხელი თავი და ცივი ტბი.

*ა) არნიკა

ბ) ჰელებორუს

გ) კამფორა

დ) კარბო ვეგეტაბილის

ე) ლიკოპოდიუმი

1649. ბავშვს აქვს ხელება; ლორწოვანი ნახველი ისე იწელება, რომ ეკიდება გრძელ ძაფებად, მოთეთრო ფერის გამჭვირვალე, გაგს კვერცხის ცილას.

ა) რუს ტოქსი

- ბ) იპეკაცუანა
- გ) დრობერა
- *დ) კოქტეს კაპტი
- ე) კორალიუმ რუბრუმ

1650. ბავშვს აქვს შეტევითი ხასიათის ხველება ისეთი სიხშირით, რომ პაერის ჩასუნთქვას ძლივს ასწრებს; ხველა ყეფს მოგვაგონებს; ნახველს ამოღება ისე უჭირს, რომ დებინებამდე მიღის. ეწყება საღამოს, როგორც კი თავს ბალიშებ დებს.

- ა) სამბუკუს
- ბ) ჰიოსციამუს
- *გ) დრობერა
- დ) კორალიუმ რუბრუმ
- ე) ცინა

1651. ბავშვს აქვს მშრალი სპაზმური ხველა ცემინებით; უარესდება მოძრაობისას, ამიტომ ცდილობს არ გაინძრეს, ეწყება დოლით, სახე ფერმკრთალი, ტენის გარშემო აქვს მოღურჯაო-თეთრი ფერის ორიონი, ერთი ლოყა ფერმკრთალი, მეორე წითელი.

- *ა) ცინა
- ბ) ხამომილა
- გ) კუპრუმი
- დ) ჰიოსციამუსი
- ე) დრობერა

1652. დამის ძიძს აქვს ისეთი სისუსტე ფეხებში, რომ ძლივს დგას ფეხბე მყარად; თავში აქვს სიცარიელის და ხახუნის შეგრძნება-თითქოს წვეტიანი ქვები ერთმანეთს ეხატენება; თავის ტკივილი გულის რევის შეგრძნებით მანქანაში მგზავრობისას.

- ა) კოკუს კაკტი
- ბ) აგნეს კასტეს
- *გ) კოკულუს
- დ) იგნაცია
- ე) კოფეა

1653. პაციენტი აღნიშნავს, რომ აქვს საჭმლის “სუსტი მონელება”, შეგრძნებას, რომ კუჭი დაწყლულებულია; ძლიერი მეტეორიზმი და აშლილობა ჭამიღინ 2 სო-ის მერვ; ტკივილები მეტეორიზმისაგან, რომლებიც სულ იცვლიან ლოკალიზაციას; განსაკუთრებით რეაგირებს ნამცხვარზე, ცომეულ და ცხიმიან საკვებზე, ყველაფერი ძალიან მარილიანი ეჩვენება.

- *ა) პულსაგილა
- ბ) ბრიონია
- გ) ტუია
- დ) ლიკოპოლიუმი
- ე) ლაკ კანინუმი

1654. პაციენტს აწებებს მყრალი, ყვითელი ფერის განაცვალი, ტკივილი კუნთებში, მაღალი სიცხე, შეგრძნება, თითქოს თავი და ტანი გადიდებულია ბომებში; ნერველი აგგნება ძლიერი ძილიანობის ფონზე, უქსისრემალური სისუსტე, დაღლილობა.

- ა) არიკა
- *ბ) ბაპტიზია
- გ) ნექს ვომიკა
- დ) პულსაგილა
- ე) სტრამონიუმი

1655. პაციენტს აწებებს ხველა, რომელიც მისი თქმით “კუჭიდან მოდის”. ნახველი მღამე; ხველებისას ტკივა მკერდის ძვალი.

- ა) ბრიონია
- ბ) იპეკაცუანა
- გ) რუს ტოქსი
- *დ) სეპია
- ე) სელენიუმი

1656. პაციენტს საჭმლის სუნგე გულის რევის შეგრძნება ეწყება; პირში მქავე გემო აქვს, მაგრამ სულ უნდა მქავე საჭმელი;

კუჭში აქვს სიცარიელის შეგრძნება, რომელიც არ გისდის ჭამის შემდეგ.

- *ა) სეპია
- ბ) პულსაგილა
- გ) კარბო ვეგეტაბილის
- დ) ანაკარდიუმი
- ე) ეტება.

1657. პერპესტისტერი; პაციენტს, რომელიც მოვიდა ამ დიაგნოზით, ახასიათებს ერითემა კანგე მზის მოხვედრისას; გამონაფარი ეწვის, თითქოს ცეცხლისგან; მკვეთრად გამოხატული აქვს სექსუალური აგგნება.

ა) პლატინა

*ბ) კანტარის

გ) ნუქს ვომიკა

დ) არსენიკუმ ალბუმ

ე) ციკუტა

1658. პაციენტს, რომელსაც გადაფანილი აქვს ჰონორეა, აქვს შარლტე გასვლის გამუდმებული სურვილი, მაგრამ შარლი გამოიყოფა ძალიან მცირე რაოდენობით- მხოლოდ რამდენიმე წვეთი, ხანდახან სისხლნარევი; თან ახლავს მჭრელი, მწველი ტკივილები ურეთრაში. წყლის დაღვევა იწვევს ტკივილს შარლის ბუშტში.

ა) მედორინუმ

*ბ) კანტარისი

გ) კაუსტიკუმი

დ) აპისი

ე) არსენიკუმ ალბუმ

1659. მემკურ ქალს აქვს ტკივილები ძუძუში ირადიაციით მთელ ფანტი, როცა ბაგშის აწოვებს; ფანტი ამზერევს, მთელი კუნთები ტკივა, განსაკუთრებით სინესტეში, დამე.

*ა) ფიგოლაკა

ბ) კროგონ ტიგლიუმ

გ) ჟელსაფილდ

დ) სილიცებ

ე) რუს ტოქსი